



教辅图书



功能学具



学生之家

基础教育行业专研品牌

30⁺年创始人专注教育行业

全品学练考

AI智慧升级版

主编 肖德好

导学案

高中数学

选择性必修第二册 RJA

本书为智慧教辅升级版

“讲课智能体”支持学生聊着学，扫码后哪里不会选哪里；随时随地想聊就聊，想问就问。



长江出版传媒
崇文书局

CONTENTS

目录 | 导学案

04 第四章 数列

PART FOUR

4.1 数列的概念	107
第1课时 数列的概念与表示	107
第2课时 数列的递推公式与前 n 项和	110
4.2 等差数列	112
4.2.1 等差数列的概念	112
第1课时 等差数列的概念与通项公式	112
第2课时 等差数列的性质与应用	114
4.2.2 等差数列的前 n 项和公式	117
第1课时 等差数列的前 n 项和公式及性质	117
第2课时 等差数列的前 n 项和的最值与应用	119
4.3 等比数列	121
4.3.1 等比数列的概念	121
第1课时 等比数列的概念与通项公式	121
第2课时 等比数列的性质与应用	124
第3课时 等比数列与等差数列的综合应用	126
4.3.2 等比数列的前 n 项和公式	128
第1课时 等比数列的前 n 项和公式及其应用	128
第2课时 等比数列的前 n 项和的性质和应用	130
拓展微课(一) 求数列的通项公式常用方法	132
拓展微课(二) 数列求和常用方法	133
4.4* 数学归纳法	135
🎯 本章总结提升	137

05 第五章 一元函数的导数及其应用

PART FIVE

5.1 导数的概念及其意义	143
5.1.1 变化率问题	143
5.1.2 导数的概念及其几何意义	145
第1课时 导数的概念	145
第2课时 导数的几何意义	147
5.2 导数的运算	149
5.2.1 基本初等函数的导数	149
5.2.2 导数的四则运算法则	152
5.2.3 简单复合函数的导数	154
5.3 导数在研究函数中的应用	155
5.3.1 函数的单调性	155
第1课时 函数的单调性与导数	155
第2课时 利用导数解决函数单调性综合问题	158
5.3.2 函数的极值与最大(小)值	160
第1课时 函数的极值与导数	160
第2课时 函数的最大(小)值与导数	162
第3课时 含参函数的最大(小)值问题	164
第4课时 导数与函数的零点与实际应用	166
拓展微课(三) 三次函数的图象与性质及应用	169
拓展微课(四) 导数与六大经典函数模型	170
① 本章总结提升	172
◆ 参考答案	177



第四章 数列

4.1 数列的概念

第1课时 数列的概念与表示

【学习目标】

- 1. 了解数列的概念,知道什么是数列,能说出数列的项.
- 2. 了解数列的表示方法,会用表格、图象、通项公式表示数列,能用通项公式求任意项或根据数列的前几项写出数列的一个通项公式.
- 3. 了解数列与函数的关系,能用函数的观点看待数列,并能说出数列与函数的共性与差异.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 数列及其有关概念

1. 数列

按照确定的_____排列的一列数称为数列.

2. 数列的项

数列中的_____叫作这个数列的项. 数列的第一个位置上的数叫作这个数列的第1项,常用符号_____表示,第二个位置上的数叫作这个数列的第2项,用_____表示……第 n 个位置上的数叫作这个数列的第 n 项,用_____表示. 其中第1项也叫作_____.


3. 数列的表示

(1)数列的一般形式是 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 简记为_____.

(2)表格表示,如下表.

n	1	2	3	...
a_n	a_1	a_2	a_3	...

(3)图象表示,如图.



4. 数列的分类

(1)按项的个数分类

类别	含义
有穷数列	项数_____的数列
无穷数列	项数_____的数列

(2)按项的变化趋势分类

类别	含义
递增数列	从第2项起,每一项都_____它的前一项的数列
递减数列	从第2项起,每一项都_____它的前一项的数列
常数列	各项都_____的数列

【诊断分析】 判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

(1)李萍从6岁到18岁,每年生日那天测量体重,依次排成一列数,可以构成数列. ()

(2)数列 $-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{16}, \dots$ 是递减数列且是无穷数列. ()

(3)数列 $1, 3, 5, 7, 9$ 与数列 $9, 7, 5, 3, 1$ 是同一个数列. ()

◆ 知识点二 数列的通项公式

1. 定义:如果数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与它的序号_____之间的对应关系可以用一个式子来表示,那么这个式子叫作这个数列的_____.

2. 作用:①求数列的任意一项;②检验某数是否是该数列中的一项.

3. 数列的通项公式与函数解析式的关系比较

	函数	数列
定义域	$\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{R}$ 的子集	正整数集 $\mathbf{N}^*$ (或它的有限子集 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$)
解析式	$y = f(x)$	$a_n = f(n)$
值域	y 的取值范围	由自变量从小到大依次取值时对应的一系列函数值构成
表示方法	解析法、列表法、图象法	通项公式(解析法)、列表法、图象法

【诊断分析】判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = \begin{cases} 3 \times 2^{n-1} (n \text{ 是偶数}), \\ 3n-2 (n \text{ 是奇数}), \end{cases}$ 则 $a_3 > a_4$. ()

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n-1$, 则数列 $\{a_n\}$ 的图象与函数 $y = 2x-1$ 的图象相同. ()

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = 2^n + 3$, 则 11 是数列中的项. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 数列的概念与分类

例 1 已知下列数列: ① $1, 0, 84, 0.84^2, 0.84^3$; ② $2, 4, 6, 8, 10, \dots, 2n, \dots$; ③ $7, 7, 7, 7, \dots$; ④ $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots, \frac{1}{3^n}, \dots$; ⑤ $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$; ⑥ $0, -1, 2, -3, 4, -5, \dots$.

其中, 有穷数列是 _____, 无穷数列是 _____, 递增数列是 _____, 递减数列是 _____, 常数列是 _____. (填序号)

【素养小结】

判断数列的类型应注意的几个方面: (1) 判断一个数列是有穷数列还是无穷数列的关键是判断数列的项数是有限的还是无限的; (2) 判断一个数列的单调性一般是根据数列中的 a_{n+1} 与 a_n 的大小来判断, 即①若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n < a_{n+1}$, 则是递增数列, ②若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > a_{n+1}$, 则是递减数列.

◆ 探究点二 已知通项公式写数列的项

例 2 [教材 P4 例 1 改编] 根据数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 写出数列的前 5 项, 并用图象表示出来.

(1) $a_n = \frac{1}{2}n - 1$;

(2) $a_n = \sin \frac{(n+2)\pi}{2}$.

【素养小结】

数列 $\{a_n\}$ 的通项公式给出了第 n 项 a_n 与它的位置序号 n 之间的关系, 只要用序号代替公式中的 n , 就可以求出数列中相应的项.

◆ 探究点三 已知数列的项写通项公式

例 3 写出下列数列的一个通项公式.

(1) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \dots$;

(2) $\frac{1}{1 \times 2}, -\frac{1}{2 \times 3}, \frac{1}{3 \times 4}, -\frac{1}{4 \times 5}, \dots$;

(3) $\frac{3}{2}, 1, \frac{7}{10}, \frac{9}{17}, \dots$.

变式 1 根据数列的前几项,写出下列各数列的一个通项公式:

(1) 5, 55, 555, 5555, ...;

(2) $\sqrt{3}, 3, \sqrt{15}, \sqrt{21}, \dots$.

变式 2 (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项分别为 $-1 + \frac{1}{2^2}, 2 - \frac{3}{4^2}, -3 + \frac{5}{6^2}, 4 - \frac{7}{8^2}$, 则该数列的一个通项公式为 ()

A. $a_n = (-1)^n n + (-1)^n \frac{2n-1}{4n^2}$

B. $a_n = (-1)^n n - (-1)^n \frac{2n+1}{4n^2}$

C. $a_n = (-1)^n n - (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{2n^2}$

D. $a_n = (-1)^n n + (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{4n^2}$

(2) 请写出数列 1, 0, 1, 0, ... 的至少 3 个通项公式.

[素养小结]

根据数列的前几项猜想数列的通项公式,若所给前几项为分数,则可分别观察分子组成的数列特征与分母组成的数列特征.若所给前几项为正负相间的项,则可用 -1 的幂进行符号调节.当猜想的难度较大,不易猜出时,可尝试以下方法将数列转化为易于猜想的数列:对数列的各项同时进行加、减、乘、除同一数;对数列各项分别加、减、乘、除该项的项数;将各项分解为若干项的和、差、积、商等形式.如猜想 2, 5, 9, 17 的通项公式,可采取各项减 1 变化为 1, 4, 8, 16.

◆ 探究点四 数列通项公式的简单应用

例 4 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3n^2 - 28n$.

(1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的第 4 项和第 6 项.

(2) -49 和 68 是否为该数列的项?

(3) 数列 $\{a_n\}$ 中有多少个负数项?

变式 (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{1}{n(n+2)}$, 则 $a_{10} =$ _____, 若 $a_m = \frac{1}{168}$, 则 $m =$ _____.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + 2n$, 若第 $2m$ 项是第 m 项的 3 倍, 则 $m =$ _____.

[素养小结]

判断某个数是否为数列中的项,需先假设它是数列中的项,然后列方程求解.若方程有正整数解,则该数是数列中的项;若方程无解或解均不是正整数,则该数不是数列中的项.

拓展 (1) [2025 · 沧州高二阶段练] 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n-2}{2n-7}$, 则 $\{a_n\}$ 中的最大项为 ()

A. $\frac{1}{5}$ B. 0 C. -1 D. 2

(2) 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = -2n^2 + \lambda n$ ($n \in \mathbf{N}^*, \lambda \in \mathbf{R}$), 若 $\{a_n\}$ 是递减数列, 则 λ 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 4)$ B. $(-\infty, 4]$
C. $(-\infty, 6)$ D. $(-\infty, 6]$

第2课时 数列的递推公式与前 n 项和

【学习目标】

1. 会用递推公式表示数列, 能根据数列的递推公式写出数列的前几项.
2. 了解数列的前 n 项和, 并能利用 S_n 与 a_n 的关系解决一些简单问题.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 数列的递推公式

概念: 如果一个数列的相邻两项或多项之间的关系可以用一个式子来表示, 那么这个式子叫作这个数列的_____.

作用: 知道了首项或前几项, 以及递推公式, 就能求出数列的每一项.

【诊断分析】1. 判断正误. (请在括号中打“√”或“×”)

- (1) 所有的数列都有递推公式. ()
- (2) 数列的递推公式是关于 n 的函数关系式. ()
- (3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = 2a_n - 2$, 则 $a_2 = 4$. ()

2. 仅由数列 $\{a_n\}$ 的递推公式 $a_n = 3a_{n-1} (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$ 能否确定这个数列? 若再已知 $a_2 = 3$ 呢?

◆ 知识点二 数列的前 n 项和

1. 概念及表示

我们把数列 $\{a_n\}$ 从第 1 项起到第 n 项止的各项之和, 称为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 记作 S_n , 即 $S_n =$ _____.

2. 数列的前 n 项和公式

如果数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 与它的序号 n 之间的对应关系可以用一个_____来表示, 那么这个_____叫作这个数列的前 n 项和公式.

3. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式与前 n 项和 S_n 的关系
在数列 $\{a_n\}$ 中, S_n 为其前 n 项和, 显然 $S_1 = a_1$, 而 $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} (n \geq 2)$, 于是 $a_n =$
$$\begin{cases} \text{_____, } n=1, \\ \text{_____, } n \geq 2. \end{cases}$$

【诊断分析】判断正误. (请在括号中打“√”或“×”)

- (1) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n + 1$, 则 $a_1 = 4, a_4 = 3$. ()

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2 + 1$, 则 $a_n = 2n - 1$. ()

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = S_6 - S_2$. ()

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 递推公式

例 1 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2a_n}{2+a_n}$, 写出它的前 5 项, 并归纳出数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式.

变式 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{a_n}{n+1}$.

- (1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项;
- (2) 猜想数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

[素养小结]

(1)递推公式的作用:已知数列的某一项,利用递推公式可以写出数列的每一项.对于具有周期性的数列,一般利用递推公式写出几项就能发现其周期变化规律.

(2)递推公式与通项公式的区别:递推公式揭示了数列的相邻项之间的关系,已知前面的项可以递推出后面的项;通项公式揭示了项与其序号之间的关系,把序号代入通项公式可以直接求出该项.

(3)某些用递推公式给出的数列,写出数列的前几项后,由前几项分析其特点、规律,即可归纳总结出数列的一个通项公式.

(4)形如 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 或 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)$ 的递推关系,可以利用累加法或累乘法求出通项公式.

拓展 (1)已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)^2}{n^2}$, 且

$$a_1=\frac{1}{3}, \text{ 则 } a_3= \quad (\quad)$$

A. 1 B. 3

C. 9 D. $\frac{1}{3}$

(2)[2025·厦门双十中学高二月考] 在数列 $\{a_n\}$

中, $a_1=-\frac{1}{4}$, $a_n=1-\frac{1}{a_{n-1}}(n \geq 2)$, 则 a_{2025} 的值为

()

A. $-\frac{1}{4}$ B. $\frac{5}{4}$

C. 5 D. $\frac{4}{5}$

◆ 探究点二 数列的前 n 项和

例 2 (1)[2025·蚌埠高二联考] 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2+1$, 则 a_8 的值为 ()

A. 15 B. 16 C. 49 D. 64

(2)已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$, 则

数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和 $S_3=$ _____.

变式 (1)记正整数 m, n 的最大公约数为 (m, n) , 例如, $(2, 5)=1$, $(6, 15)=3$. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_n=(n, n+2)$, 则 $S_{50}=$ ()

A. 50 B. 75 C. 100 D. 1275

(2)已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n=an^2$, 若 $S_{10}=600$, 则 $a_3-a_5-a_6=$ _____.

[素养小结]

对于已知数列的前 n 项和公式求数列的某一项问题, 主要利用定义解决.

◆ 探究点三 利用数列的前 n 项和求通项

例 3 下面给出了数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

$$(1) S_n=2n^2-3n;$$

$$(2) S_n=4-\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

变式 (1)[2025·榆林高二调研] 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_n=3n^2-6n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 ()

$$A. a_n=3n-6$$

$$B. a_n=6n-9$$

$$C. a_n=\begin{cases} -3, & n=1, \\ 3n+6, & n \geq 2 \end{cases}$$

$$D. a_n=\begin{cases} -3, & n=1, \\ 6n+6, & n \geq 2 \end{cases}$$

(2)已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3^n-2$ (n 为正整数), 则此数列的通项公式为 $a_n=$ _____.

[素养小结]

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 求解通项公式时, 一般先根据 $a_1=S_1$ 求出 a_1 , 再根据 $a_n=S_n-S_{n-1}(n \geq 2)$ 计算出当 $n \geq 2$ 时的通项公式, 然后验证 a_1 是否满足上式, 由此决定数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是否需要分段书写.

4.2 等差数列

4.2.1 等差数列的概念

第1课时 等差数列的概念与通项公式

【学习目标】

1. 理解等差数列的概念,能用文字语言、符号语言、图形语言描述等差数列的概念,能根据等差数列的定义判断或证明已知数列是否是等差数列.
2. 理解等差数列的通项公式,能根据定义归纳出等差数列的通项公式,会用通项公式解决一些简单问题.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 等差数列的有关概念与表示

1. 等差数列与公差:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差都等于同一个常数,那么这个数列就叫作_____数列,这个常数叫作等差数列的_____,公差通常用字母 d 表示.

以上定义用符号表示为_____ (d 为常数, $n \in \mathbf{N}^*$). 等差数列的定义用符号语言表示,其本质是等差数列的递推公式.

2. 等差中项:由三个数 a, A, b 组成的等差数列可以看成是最简单的等差数列,这时, A 叫作 a 与 b 的_____,并且 $2A = a + b$.

【诊断分析】 判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

(1) 若一个无穷数列 $\{a_n\}$ 的前4项分别是1,2,3,4,则它一定是等差数列. ()

(2) 若一个数列从第2项起每一项与它前一项的差都是常数,则这个数列一定是等差数列.

(3) 任意两个实数都存在等差中项. ()

(4) 若 a, b, c 是等差数列,则 $c + a = 2b$. ()

(5) 当数列 $\{a_n\}$ 为常数列时,数列 $\{a_n\}$ 不是等差数列. ()

◆ 知识点二 等差数列的通项公式及应用

1. 通项公式:若等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ,公差为 d ,则其通项公式为 $a_n =$ _____.

2. 等差数列的图象:等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式可写成 $a_n = dn + (a_1 - d)$. 点 (n, a_n) 分布在一条以 d 为斜率的直线上,是这条直线上一列_____.

3. 等差数列的单调性:在等差数列 $\{a_n\}$ 中,若公差 $d > 0$,则数列 $\{a_n\}$ 为_____数列;若公差 $d < 0$,则数列 $\{a_n\}$ 为_____数列.

【诊断分析】 1. 判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = kn + b$ (k, b 为常数),则数列 $\{a_n\}$ 一定是等差数列. ()

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \begin{cases} 1, & n=1, \\ n+1, & n \geq 2, \end{cases}$ 则 $\{a_n\}$ 是等差数列. ()

(3) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = 3n + 8$,则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是3. ()

(4) 各项都为正数的等差数列的公差一定大于0. ()

2. (1) 若已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和第二项 a_2 ,可以求其通项公式吗?

(2) 等差数列的通项公式一定是关于 n 的一次函数吗?

◆ 探究点一 用定义判断等差数列

例 1 判断下列数列是否为等差数列,如果是,指出它的公差.

- (1)在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = 4n + 2$;
 (2)在数列 $\{b_n\}$ 中, $b_n = n^2 + n$;
 (3)在数列 $\{c_n\}$ 中, $c_n = 8$.

变式 (1)(多选题)下列数列中为等差数列的是()

- A. 9, 9, 9, 9, 9
 B. 4, 7, 10, 13, 16
 C. $\ln 3, \ln 9, \ln 27, \ln 81$
 D. $2^5, 2^4, 2^3, 2^2$

(2)数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, \frac{1}{2a_{n+1}} = \frac{1}{2a_n} + 1 (n \in \mathbf{N}^*)$.

- ①求证:数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 是等差数列;
 ②求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

[素养小结]

利用定义法判断是否为等差数列时,从第 2 项起检验每一项与它的前一项的差是否都等于同一个常数,若是同一个常数,则是等差数列,否则不是等差数列.

◆ 探究点二 等差中项及其应用

例 2 (1)若 $a = \frac{1}{\sqrt{2}+1}, b = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$, 则 a, b 的等差中项为 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{2}$
 C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(2)已知 A 为 $a+5$ 和 $a+11$ 的等差中项,则 $A =$ _____.

变式 (1)已知 $2m$ 和 n 的等差中项是 5, m 和 $2n$ 的等差中项是 4, 则 m 和 n 的等差中项是 _____.

(2)一个等差数列的前 4 项是 $1, x, a, 2x$, 则 $x =$ _____, $a =$ _____.

[素养小结]

三个数 a, b, c 成等差数列的条件是 $b = \frac{a+c}{2}$ (或 $2b = a+c$), 利用该条件可进行等差数列的判定或求解有关等差中项的计算问题. 若需证明 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则可通过证明 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} (n \in \mathbf{N}^*)$ 来实现.

◆ 探究点三 等差数列的通项公式及应用

例 3 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d .

- (1)若 $a_1 = 2, d = 3$, 求 a_{10} ;
 (2)若 $a_1 = 3, a_n = 21, d = 2$, 求 n ;
 (3)若 $a_1 = 12, a_6 = 27$, 求 d ;
 (4)若 $d = -\frac{1}{3}, a_7 = 8$, 求 a_1 和 a_n .

变式 (1) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_5 - a_3 = 12$, $a_{12} = 20$, 则 $a_1 =$ _____, 公差 $d =$ _____.

(2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 9$, 公差 $d = -2$, $a_n = -15$, 则 $n =$ _____.

(3) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_3 = 9, a_9 = 3$, 则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 _____.

[素养小结]

等差数列通项公式的求法与应用技巧

- (1) 等差数列的通项公式可由首项与公差确定, 所以要求等差数列的通项公式, 只需求出首项与公差.
- (2) 等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 中共含有四个参数, 即 a_1, d, n, a_n , 如果知道了其中的任意三个数, 那么就可以由通项公式求出第四个数, 这一求未知量的过程, 我们通常称之为“知三求一”.

例 4 (多选题) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 则下列说法中正确的是 ()

- 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
- 数列 $\{na_n\}$ 是递增数列

C. 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递减数列

D. 数列 $\{a_n + 3nd\}$ 是递增数列

变式 (1) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 为递增数列, 若 $a_1 = \frac{1}{25}$, 且从第 10 项开始每项都大于 1, 则此等差数列的公差 d 的取值范围是 _____.

(2) 写出一个同时满足①②③的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式: $a_n =$ _____.

- ① 数列 $\{a_n\}$ 是无穷等差数列;
- ② 数列 $\{a_n\}$ 为递减数列;
- ③ 数列 $\{|a_n|\}$ 的第 5 项为最小项.

第 2 课时 等差数列的性质与应用

【学习目标】

1. 理解等差数列的通项公式, 能说出等差数列通项公式的特征, 并能灵活求解等差数列的基本量.
2. 能得出等差数列的一些性质, 并利用其解决一些简单问题.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 等差数列通项公式的推广与运算性质

两项关系	多项关系 (性质)
通项公式的推广: $a_n = a_m + \frac{n-m}{d}$ (d 为公差, $m, n \in \mathbf{N}^*$)	项的运算性质: 若 $m+n=p+q$ ($m, n, p, q \in \mathbf{N}^*$), 则 $a_m + a_n = a_p + a_q$. 简记: 若下标和相等, 则对应项的和相等. 特别地, 若 $m+n=2k$ ($m, n, k \in \mathbf{N}^*$), 则 $a_m + a_n = 2a_k$

【诊断分析】 判断正误. (请在括号中打“√”或“×”)

- (1) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$. ()
- (2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, a_k 为 a_{k-m}, a_{k+m} ($m < k, m, k \in \mathbf{N}^*$) 的等差中项. ()
- (3) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 + a_4 = a_6$. ()
- (4) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_4 + a_8 + a_{12} = 120$, 则 $a_8 = 40$. ()

◆ 知识点二 由等差数列构造新数列

1. 构造新数列的基本类型

- (1) 若 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 则 $\{c + a_n\}$ (c 为任意常数) 是公差为 _____ 的等差数列;
- (2) 若 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 则 $\{c \cdot a_n\}$ (c 为任意常数) 是公差为 _____ 的等差数列;
- (3) 若 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别是公差为 d_1, d_2 的等差数列, 且它们的项数相同, 则数列 $\{pa_n + qb_n\}$ (p, q 是常数) 是公差为 $pd_1 + qd_2$ 的等差数列.

2. 等差数列部分项的性质

若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $a_m, a_{m+k}, a_{m+2k}, a_{m+3k}, \dots$ ($m, k \in \mathbf{N}^*$) 仍为等差数列.

【诊断分析】 判断正误. (请在括号中打“√”或“×”)

- (1) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 取其奇数项组成一个新数列, 则此数列是公差为 $2d$ 的等差数列. ()
- (2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则数列 $\{a_n + 3\}$ 的公差为 $d + 3$. ()

(3)若 $\{a_n\}$ 是等差数列,则数列 $\{2a_n\}$ 也是等差数列. ()

(4)若数列 $a_1, a_3, a_5, \dots$ 和 $a_2, a_4, a_6, \dots$ 都是公差为 d 的等差数列,则 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 也是等差数列. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 等差数列性质的应用

例 1 (1)在等差数列 $\{a_n\}$ 中,已知 $a_3 + a_9 = 12$,
 $a_2 = 4$,则 $a_{10} =$ ()

- A. 4 B. 8
C. 3 D. 6

(2)在等差数列 $\{a_n\}$ 中,若 $a_3 + a_6 + a_{20} + a_{23} = 36$,
则 $a_{13} =$ _____.

(3)在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{15} = 8$, $a_{60} = 20$,则 $a_{75} =$ _____.

变式 (1)[2025·苏州高二阶段练] 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数,若 $a_3 + a_7 - a_5^2 = 0$,则 a_5 的值为 ()

- A. 6 B. 4
C. 2 D. 1

(2)已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1 + a_2 + a_3 = 6$,
 $a_4 + a_6 = -20$,则 $a_8 =$ ()

- A. -12 B. -13
C. -22 D. -23

(3)公差不为0的等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_4 - a_x = a_y - a_7$,则 xy 的值不可能是 ()

- A. 10 B. 24
C. 22 D. 30

[素养小结]

(1)灵活利用等差数列的性质,可以减少运算. 令 $m = 1$, $a_n = a_m + (n - m)d$ 即变为 $a_n = a_1 + (n - 1)d$,可以减少记忆负担.

(2)等差数列运算的两种常用思路

①基本量法:根据已知条件,列出关于 a_1, d 的方程(组),确定 a_1, d ,然后求其他量.

②巧用性质法:观察等差数列中项的序号,若满足 $m + n = p + q = 2r$ ($m, n, p, q, r \in \mathbb{N}^+$),则 $a_m + a_n = a_p + a_q = 2a_r$.

◆ 探究点二 由等差数列构造新等差数列

例 2 在无穷等差数列 $\{a_n\}$ 中,首项 $a_1 = 3$,公差 $d = -5$,依次取出序号能被4除余3的项组成数列 $\{b_n\}$.

(1)求 b_1 和 b_2 .

(2)求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(3)数列 $\{b_n\}$ 中的第506项是 $\{a_n\}$ 中的第几项?

变式 (1)已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是等差数列,且 $a_1 = 25, b_1 = 75, a_2 + b_2 = 100$,那么数列 $\{a_n + b_n\}$ 的第37项为_____.

(2)已知等差数列 $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$,现在其每相邻两项之间插入一个数,使之成为一个新的等差数列 $\{a_n\}$.

①求新数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

②16是新数列 $\{a_n\}$ 中的项吗?若是,求出是第几项;若不是,说明理由.


[素养小结]

对于任何形式的构造数列,判断其是否为等差数列,一般从两个方面进行:(1)定义,即 $a_n - a_{n-1} (n \geq 2)$ 是否为常数;(2)通项公式是否为关于 n 的一次函数.

拓展 [教材 P25T8 改编] 已知两个等差数列 2, 5, 8, $\dots$, 197 与 2, 7, 12, $\dots$, 197, 将它们的公共项从小到大依次排列构成数列 $\{c_n\}$, 则数列 $\{c_n\}$ 的通项公式为 $c_n =$ _____, $\{c_n\}$ 的项数是 _____.

◆ 探究点三 等差数列的实际应用

例 3 甲、乙两人连续 6 年对某县养鸡业规模进行调查,提供两个不同的信息图如图所示. 甲调查表明:每个养鸡场平均出产鸡的只数从第 1 年的 1 万只增加到第 6 年的 2 万只. 乙调查表明:养鸡场个数从第 1 年的 30 个减少到第 6 年的 10 个.



请根据提供的信息回答下列问题:

- (1) 求第 2 年该县养鸡场的个数及出产鸡的总只数.
- (2) 到第 6 年该县的养鸡业规模(出产鸡的总只数越多,规模越大)比第 1 年是扩大了还是缩小了? 请说明理由.
- (3) 该县这 6 年中哪一年的养鸡业规模最大? 哪一年的养鸡业规模最小? 请说明理由.

变式 (1)(多选题) 已知冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种这十二个节气的日影长依次成等差数列,若冬至、立春、春分的日影长的和是 37.5 尺,芒种的日影长为 4.5 尺,则 ()

- A. 冬至的日影长最长,为 15.5 尺
- B. 立夏比谷雨的日影长多 1 尺
- C. 大寒、雨水、春分的日影长成等差数列
- D. 清明的日影长为 8.5 尺

(2) 某公司经销一种数码产品,第 1 年可获利 200 万元. 从第 2 年起,由于市场竞争等方面的原因,其利润每年比上一年减少 20 万元,按照这一规律,如果公司不开发新产品,也不调整经营策略,从哪一年起,该公司经销这一产品将亏损?

[素养小结]

求解等差数列实际应用问题的关键是认真审题,挖掘出“等差”变化的含义,进一步明确首项、公差、项数等基本量.

4.2.2 等差数列的前 n 项和公式

第 1 课时 等差数列的前 n 项和公式及性质

【学习目标】

1. 能推导等差数列的前 n 项和公式,能说出“倒序相加法”的特点、适用条件及操作步骤.
2. 能说明等差数列前 n 项和公式的特征,能灵活运用求和公式解决一些简单问题.


课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 倒序相加法

如果一个数列 $\{a_n\}$ 中,与首末项等“距离”的两项之和等于首末两项之和,那么求和时可采用把正着写与倒着写的两个和式相加,这样就得到了一个常数列的和,进而求得数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,这一求和方法称为_____.

【诊断分析】如图所示,某仓库堆放了一堆钢管,最上面的一层有 4 根钢管,下面的每一层都比上一层多 1 根,最下面的一层有 9 根,共有 6 层.



- (1)假设在这堆钢管旁边倒放上同样的一堆钢管,其截面如图所示,则这样共有_____根钢管.
- (2)原来有_____根钢管.

◆ 知识点二 等差数列的前 n 项和公式

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式

已知量	首项、末项与项数	首项、公差与项数
求和公式	$S_n = \underline{\hspace{2cm}}$	$S_n = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 两个公式的关系:把 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 代入 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$,就可以得到 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$.

【诊断分析】判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

- (1)已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ,则当 $n \geq 2$ 时,等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n-1$ 项的和 $S_{n-1} = (n-1)a_1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}d$. ()
- (2)等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式是关于整数 n 的二次函数. ()

(3)等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式的常数项为 0. ()

(4)设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,则 S_n 与 a_n 不可能相等. ()

◆ 知识点三 等差数列的前 n 项和的性质

1. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, $k \in \mathbb{N}^*$,那么_____,_____,_____成等差数列,如图所示.

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \cdots + a_k}_{S_k} + \underbrace{a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{2k}}_{S_{2k} - S_k} + \underbrace{a_{2k+1} + a_{2k+2} + \cdots + a_{3k}}_{S_{3k} - S_{2k}} = S_{3k}$$

2. 若 S_n, T_n 分别为等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和,则 $\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{a_n}{b_n}$.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列,则数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 也是等差数列,且公差为 $\frac{d}{2}$.

4. 设数列 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $S_{奇}$ 是前 n 项中奇数项的和, $S_{偶}$ 是前 n 项中偶数项的和,则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = S_{奇} + S_{偶}$.当等差数列的项数 n 为奇数时,中间一项记为 $a_{中}$.有如下性质:

- (1)当 n 为偶数时, $S_{偶} - S_{奇} = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (2)当 n 为奇数时, $S_{奇} - S_{偶} = \underline{\hspace{2cm}}$, $S_{奇} = \underline{\hspace{2cm}}$, $S_{偶} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{S_{奇}}{S_{偶}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【诊断分析】判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

- (1)若 $\{a_n\}$ 是等差数列,则 $a_1 + a_2 + a_3, a_4 + a_5 + a_6, a_7 + a_8 + a_9$ 也是等差数列. ()
- (2)若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,则 S_4, S_8, S_{12} 成等差数列. ()
- (3)等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n ,若 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n}{3n+1}$,则 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \frac{21}{32}$. ()

◆ 探究点一 等差数列的前 n 项和的基本运算

例 1 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n .

- (1) 若 $a_1=7, a_{50}=101$, 则 $S_{50} =$ _____;
- (2) 若 $a_1=1, a_4=7$, 则 $S_9 =$ _____;
- (3) 若 $a_1=\frac{3}{2}, d=-\frac{1}{2}, S_n=-15$, 则 $n =$ _____, $a_n =$ _____;
- (4) 若 $a_1=1, a_n=-512, S_n=-1022$, 则 $n =$ _____, $d =$ _____.

变式 (1) [2025 · 宜春一中高二月考] 已知 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_4 - a_2 = 12$, 则 $2S_6 - 3S_4 =$ ()

- A. 24 B. 36
C. 48 D. 72

(2) [2025 · 西安高二检测] 记 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_5 = S_3, a_2 - a_1 = 2$.

- ① 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
② 求使 $S_n > 2a_n - 1$ 成立的 n 的最小值.

[素养小结]

1. 等差数列的五个基本量 a_1, a_n, d, n, S_n 中知三可求其二.
2. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_{2n-1} = (2n-1)a_n$.

拓展 [2025 · 武汉高二期末] 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, S_n 为其前 n 项和, 且 $a_2^2 + a_3^2 = a_4^2 + a_5^2, S_7 = 7$.

- (1) 求 a_n 和 S_n ;
(2) 求 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n .

◆ 探究点二 等差数列的前 n 项和的性质及应用

例 2 (1) 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_6}{S_3} = 4$, 求 $\frac{S_9}{S_6}$.

(2) 已知 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为等差数列, 其前 n 项和分别为 S_n, T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{2n+2}{n+3}$, 求 $\frac{a_5}{b_5}$.

(3) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = -2024, \frac{S_{2021}}{2021} - \frac{S_{2025}}{2025} = -4$, 求 S_{2025} .

变式 (1)[2025·晋中高二期中考] 已知一个等差数列的项数为奇数,其中所有奇数项的和为 290,所有偶数项的和为 261,则此数列的项数为 ()

- A. 15 B. 17
C. 19 D. 21

(2)在等差数列 $\{a_n\}$ 中,其前 n 项和为 S_n ,已知 $S_4=1, S_8=4$,则 $a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}=\underline{\hspace{2cm}}$.

[素养小结]

(1)涉及一个有限的等差数列的奇数项和与偶数项和之比的问题,宜用等差数列前 n 项和的性质求解.

(2)涉及两个等差数列有限项和之比的问题,通常是将其转化为两个等差数列前 n 项和之比来处理.

(3)涉及等差数列中与 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 有关的问题,可利用 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列解决.

第2课时 等差数列的前 n 项和的最值与应用

【学习目标】

1. 理解等差数列前 n 项和的性质.
2. 会求等差数列前 n 项和的最值.
3. 能在具体的问题情境中发现数列的等差关系,抽象出等差数列模型,并应用该模型解决相关问题.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点 等差数列的前 n 项和的最值

1. 从二次函数的角度理解等差数列的前 n 项和

公式 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)d}{2}$ 可化成关于 n 的表达式: $S_n=\underline{\hspace{2cm}}$.

当 $d \neq 0$ 时, S_n 关于 n 的表达式是一个常数项为零的二次表达式,即点 (n, S_n) 在其相应的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数的图象上,这就是说等差数列的前 n 项和公式是关于 n

的二次函数,它的图象是抛物线 $y=\frac{d}{2}x^2+(a_1-\frac{d}{2})x$

上横坐标为正整数的一群孤立的点.

2. 等差数列前 n 项和的最值

(1)利用邻项变号法:

当 $a_1>0, d<0$ 时, S_n 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值,使 S_n 取到最值的 n 可由不等式组 $\underline{\hspace{2cm}}$ 确定;

当 $a_1<0, d>0$ 时, S_n 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值,使 S_n 取到最值的 n 可由不等式组 $\underline{\hspace{2cm}}$ 确定.

(2)利用二次函数的最值:

$S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n, n \in \mathbf{N}^*$,若 $d \neq 0$,则从二

次函数的角度看:当 $d>0$ 时, S_n 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值;当

$d<0$ 时, S_n 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 值.当 n 取最接近对称轴的正整数时, S_n 取到最值.

【诊断分析】判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

(1)若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9>0, a_7+a_{10}<0$,则当 $n=7$ 时,数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和最大. ()

(2)若 $a_1>0, d<0$,则等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 有最大值,且最大值就是所有正项之和,也是所有非负项之和. ()

(3)在数列 $\{a_n\}$ 中,若 $a_1=32, a_{n+1}=a_n-4$,则前 n 项和 S_n 取得最大值时 n 的值有两个. ()

课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 等差数列的前 n 项和的最值

例 1 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ,若 $a_1=25, S_{17}=S_9$,求 S_n 的最大值.

变式 (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_n + a_{n+2} = 2a_{n+1}$, 且 $a_1 = 13, a_2 = 11$, 则当 S_n 取得最大值时, $n =$ ()

- A. 7 B. 8
C. 9 D. 10

(2) (多选题) [2025 · 西南大学附中高二月考] 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 公差为 d , 若 $S_{14} < 0, a_8 > 0$, 则下列说法正确的是 ()

- A. $d > 0$
B. $a_7 > 0$
C. 当 $S_n > 0$ 时, n 的最小值为 15
D. 当 S_n 最小时, $n = 8$

[素养小结]

求等差数列前 n 项和最值的常用思路:

- (1) 利用等差数列的增减性, 求出其正、负转折项, 便可求得前 n 项和的最值;
(2) 利用性质求出其正、负转折项, 便可求得前 n 项和的最值;
(3) 利用等差数列的前 n 项和 $S_n = An^2 + Bn$ (A, B 为常数, 且 $A \neq 0$) 为关于 n 的二次函数, 结合二次函数的性质求最值.

◆ 探究点二 等差数列前 n 项和的实际应用

例 2 为鼓励应届毕业大学生自主创业, 国家对应届毕业大学生创业贷款有贴息优惠政策. 现有应届毕业大学生甲贷款开小型超市, 初期投入为 72 万元, 经营后每年的总收入为 50 万元, 并且第 n 年的超市维护和工人工资等费用为 a_n 万元, 其中 $\{a_n\}$ 是首项为 12, 公差为 4 的等差数列.

(1) 该超市第几年开始盈利?

(2) 该超市经营多少年时年平均盈利最大? 最大是多少?

变式 (1) [2025 · 合肥一中高二期末] 我国古代一部杰出的数学著作中有如下问题: “今有大夫、不更、簪袅、上造、公士, 凡五人, 共出百钱, 欲令高爵出少, 以次渐多, 问各几何?” 意思是: 有大夫、不更、簪袅、上造、公士 (爵位依次降低) 5 个人共出 100 钱, 按照爵位从高到低每人所出钱数构成递增的等差数列, 这 5 个人各出多少钱? 在这个问题中, 若上造与公士共出 52 钱, 则簪袅出的钱比大夫多 ()

- A. 4 钱 B. 8 钱
C. 10 钱 D. 12 钱

(2) [2025 · 南阳六校高二联考] 摄影胶片绕在盘上, 空盘时直径为 80 mm, 满盘时直径为 120 mm, 已知胶片厚度是 0.1 mm, 则满盘时, 一盘胶片的总长度大约是 _____ m. (以胶片外侧为半径计算, π 取 3.14, 结果精确到 1 m)

[素养小结]

- (1) 解决与等差数列前 n 项和有关的应用题的关键是构造合适的等差数列.
(2) 遇到与正整数有关的应用题时, 可以考虑与数列知识联系, 抽象出数列的模型, 并用有关知识解决相关的问题, 是数学建模的核心素养的体现.

4.3 等比数列

4.3.1 等比数列的概念

第1课时 等比数列的概念与通项公式

【学习目标】

1. 理解等比数列的概念,能用文字语言、符号语言、图形语言描述等比数列的概念,能根据等比数列的定义判断或证明已知数列是否是等比数列.
2. 理解等比数列的通项公式,能根据定义归纳出等比数列的通项公式,会用通项公式解决一些简单问题.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 等比数列的相关概念

1. 等比数列与公比

一般地,如果一个数列从_____起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数,那么这个数列叫作_____数列,这个常数叫作等比数列的_____,公比通常用字母 q 表示(显然 $q \neq 0$).

以上定义用符号表示为 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ 或 $a_{n+1} = qa_n$ (q 为常数, $n \in \mathbf{N}^*$). 等比数列的定义用符号语言表示,其本质是等比数列的递推公式.

2. 等比中项

(1)定义:如果在 a 与 b 中间插入一个数 G ,使 a, G, b 成等比数列,那么 G 叫作 a 与 b 的_____,此时, $G^2 =$ _____.

(2)推广:在等比数列 $\{a_n\}$ 中,从第 2 项起,每一项都是相邻两项的等比中项.

特别地,等比数列 $\{a_n\}$ 中的某一项 a_k 是与该项等距离的两项 a_{k-m}, a_{k+m} ($k > m$) 的等比中项,即 $a_k^2 = a_{k-m} \cdot a_{k+m}$.

【诊断分析】 判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

- (1)数列 $1, -1, 1, -1$ 是等比数列. ()
- (2)若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 2a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$),那么 $\{a_n\}$ 是等比数列. ()
- (3)若一个数列从第 2 项起每一项与前一项的比为常数,则该数列为等比数列. ()

(4)等比数列的首项、公比均不能为零. ()

(5) $G^2 = ab$ 是 a, G, b 成等比数列的充要条件. ()

◆ 知识点二 等比数列的通项公式

1. 通项公式

首项为 a_1 ,公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为_____.

2. 等比数列的通项公式与指数型函数的关系

(1)在公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n = a_1 q^{n-1}$ 可改写成 $a_n = \frac{a_1}{q} \cdot q^n$,当 $q > 0$ 且 $q \neq 1$ 时, $y = q^x$ 是一个_____函数,此时等比数列 $\{a_n\}$ 的图象是函数 $y = \frac{a_1}{q} \cdot q^x$ 的图象上_____.

(2)任给函数 $f(x) = ka^x$ (k, a 为常数, $k \neq 0, a > 0$ 且 $a \neq 1$),则 $f(1) = ka, f(2) = ka^2, \dots, f(n) = ka^n, \dots$ 构成一个等比数列 $\{ka^n\}$,其首项为_____,公比为_____.

3. 等比数列的单调性

由指数函数的性质可知,

当 $a_1 > 0, q > 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列;

当 $a_1 < 0, 0 < q < 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列;

当 $a_1 > 0, 0 < q < 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 是递减数列;

当 $a_1 < 0, q > 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 是递减数列;

当 $q < 0$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 是摆动数列;

当 $q = 1$ 时,等比数列 $\{a_n\}$ 是常数数列.

【诊断分析】1. 判断正误.(请在括号中打“√”或“×”)

(1)若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_1=2, a_5=8$,则 $a_3=\pm 4$. ()

(2)等比数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ 中,第10项为 $\frac{1}{2^9}$. ()

(3)已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1>0, 8a_2-a_5=0$,则数列 $\{a_n\}$ 为递增数列. ()

(4)如果在等比数列 $\{a_n\}$ 中,公比为 q ,且 $q<1$,那么等比数列 $\{a_n\}$ 是递减数列. ()

2. 如何推导等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式?

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 等比数列通项公式的基本运算

例1 (1)已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n=128, a_1=4, q=2$,则 $n=$ _____.

(2)已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1, a_4=27$,则 $a_n=$ _____.

(3)已知等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1+b_2=3, b_1+b_4=9$,则 $q=$ _____.

(4)已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n=625, n=4, q=5$,则 $a_1=$ _____.

变式 (1)已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3=3, a_7=27$,则 $a_5=$ ()

- A. 15 B. 9
C. -9 D. ± 9

(2)已知数列 $\{a_n+2^n\}$ 是等比数列,且 $a_1=0, a_2=4$,则 $a_6=$ ()

- A. 1984 B. 1920
C. 992 D. 960

(3)三个数成等比数列,它们的和等于14,它们的积等于64,则这三个数所成的等比数列为_____.

[素养小结]

1. 等比数列的通项公式涉及4个量 a_1, a_n, n, q ,只要知道其中任意三个就能求出另外一个,在这四个量中, a_1 和 q 是等比数列的基本量,只要求出这两个基本量,问题便迎刃而解.

2. 求等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式通常有以下两种方法:

(1)根据已知条件,建立关于 a_1, q 的方程组,求出 a_1, q 后再求 a_n ,这是常规方法.

(2)充分利用各项之间的关系,直接求出 q 后,再求 a_1 ,最后求 a_n ,这种方法带有一定的技巧性,能简化运算.

◆ 探究点二 等比数列的函数特征

例2 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ,则 $\{a_n\}$ 为递减数列的充要条件是 ()

- A. $|q|<1$ 且 $q\neq 0$
B. $a_1>0, 0<q<1$
C. $a_1<0, q>1$
D. $a_1>0, 0<q<1$ 或 $a_1<0, q>1$

变式 (1)[2025·温州高二质检]若各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 是等比数列,则“ $a_9>a_7$ ”是“数列 $\{a_n\}$ 为递增数列”的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

(2)已知 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列,且 $a_2<0$,则其公比 q 满足 ()

- A. $q<-1$ B. $-1<q<0$
C. $q>1$ D. $0<q<1$

◆ 探究点三 等比中项及其应用

例3 (1)[2025·潍坊高二检测]等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数,且 $a_1=\frac{1}{4}$,公比 $q=2$,则 a_4 与 a_6 的等比中项是 ()

- A. 2 B. ± 4
C. 4 D. -4

(2)[2025·阜阳高二检测]已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n+6$,若 a_m 是 a_1 与 a_{2m} 的等比中项,则 $m=$ _____.

变式 (1) $\sqrt{5}-2$ 和 $\sqrt{5}+2$ 的等差中项与等比中项分别为 ()

- A. $\sqrt{5}, \pm 2$ B. $2, \pm\sqrt{5}$
C. $\sqrt{5}, \pm 1$ D. $1, \pm\sqrt{5}$

(2) 若 a, b, c 成等比数列, x 是 a, b 的等比中项, y 是 b, c 的等比中项, 则 ()

- A. $x > y$ B. $x < y$
C. a, b, c 同号 D. x 与 y 同号

(3) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中的前三项为 $a, 2a+2, 3a+3$, 则实数 a 的值为 _____.

[素养小结]

(1) 首项 a_1 和公比 q 是等比数列的基本量, 从基本量入手可以解决等比数列相关的基本量问题; (2) 若没有特殊说明, 则 a 与 $b (ab > 0)$ 的等比中项一般有 2 个, 需要根据已知条件判断.

◆ 探究点四 等比数列的证明

例 4 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = 3a_{n-1} + 4 (n \geq 2)$.

- (1) 求证: 数列 $\{a_n + 2\}$ 是等比数列;
(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

变式 已知 a, b, c 成等比数列, 求证: $a^2 + b^2, ab + bc, b^2 + c^2$ 成等比数列.

[素养小结]

证明一个数列是等比数列的常用方法

(1) 定义法: 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q (n \in \mathbf{N}^*, q \text{ 为常数且不为零})$ 或 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q (n \geq 2 \text{ 且 } n \in \mathbf{N}^*, q \text{ 为常数且不为零})$, 则数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

(2) 通项公式法: 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1} (a_1 \neq 0, q \neq 0)$, 则数列 $\{a_n\}$ 是等比数列.

(3) 等比中项法: 若 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} (n \in \mathbf{N}^* \text{ 且 } a_n \neq 0)$, 则数列 $\{a_n\}$ 为等比数列.

拓展 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_n a_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 证明: 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 和数列 $\{a_{2n}\}$ 都是等比数列.