



教育图书



功能学具



学生之家

基础教育行业专研品牌

30⁺年专注教育行业

全品学练考

主编 肖德好

导学案

高中数学1

必修第一册 RJA

北京
专版

数智教辅

索取二维码
贴此处
激活享受服务

— 全品AI学伴 —
7×24小时有问必答
高效预复习，吃透每一课

天津出版传媒集团
天津人民出版社

CONTENTS

目录 | 导学案

01 第一章 集合与常用逻辑用语

PART ONE

1.1 集合的概念	213
1.2 集合间的基本关系	216
1.3 集合的基本运算	219
第1课时 集合的并集、交集	219
第2课时 集合的全集、补集	221
1.4 充分条件与必要条件	223
1.4.1 充分条件与必要条件	223
1.4.2 充要条件	225
1.5 全称量词与存在量词	227
1.5.1 全称量词与存在量词	227
1.5.2 全称量词命题和存在量词命题的否定	229
本章总结提升	232

02 第二章 一元二次函数、方程和不等式

PART TWO

2.1 等式性质与不等式性质	234
第1课时 不等关系与不等式	234
第2课时 等式性质与不等式性质	236
2.2 基本不等式	238
第1课时 利用基本不等式求最值	238
第2课时 基本不等式的简单应用	240
2.3 二次函数与一元二次方程、不等式	243
第1课时 二次函数与一元二次方程、不等式	243

第2课时 一元二次不等式的简单应用

246

 本章总结提升 248

03 第三章 函数的概念与性质

PART THREE

3.1 函数的概念及其表示	251
3.1.1 函数的概念	251
第1课时 函数的概念(一)	251
第2课时 函数的概念(二)	254
3.1.2 函数的表示法	256
第1课时 函数的表示法	256
第2课时 分段函数	260
3.2 函数的基本性质	263
3.2.1 单调性与最大(小)值	263
第1课时 函数的单调性	263
第2课时 利用单调性求最值	266
3.2.2 奇偶性	268
第1课时 奇偶性的概念	268
第2课时 奇偶性的应用	270
3.3 幂函数	273
3.4 函数的应用(一)	275
本章总结提升	278

04 第四章 指数函数与对数函数

PART FOUR

4.1 指数	281
4.1.1 n 次方根与分数指数幂	281

4.1.2 无理数指数幂及其运算性质	281
4.2 指数函数	284
4.2.1 指数函数的概念	284
4.2.2 指数函数的图象和性质	286
第1课时 指数函数的图象和性质	286
第2课时 指数函数的图象及其性质的应用	289
4.3 对数	291
4.3.1 对数的概念	291
4.3.2 对数的运算	293
4.4 对数函数	296
4.4.1 对数函数的概念	296
4.4.2 对数函数的图象和性质	298
第1课时 对数函数的图象和性质	298
第2课时 对数函数的图象及其性质的应用	300
4.4.3 不同函数增长的差异	302
4.5 函数的应用(二)	305
4.5.1 函数的零点与方程的解	305
4.5.2 用二分法求方程的近似解	307
4.5.3 函数模型的应用	310
④ 本章总结提升	314

05 第五章 三角函数

PART FIVE

5.1 任意角和弧度制	317
5.1.1 任意角	317
5.1.2 弧度制	320
5.2 三角函数的概念	323
5.2.1 三角函数的概念	323
5.2.2 同角三角函数的基本关系	326
5.3 诱导公式	330

第1课时 诱导公式(一)	330
第2课时 诱导公式(二)	331
5.4 三角函数的图象与性质	334
5.4.1 正弦函数、余弦函数的图象	334
5.4.2 正弦函数、余弦函数的性质	336
第1课时 周期性与奇偶性	336
第2课时 单调性、最大值与最小值	339
5.4.3 正切函数的性质与图象	341
5.5 三角恒等变换	343
5.5.1 两角和与差的正弦、余弦和正切公式	343
第1课时 两角差的余弦公式	343
第2课时 两角和与差的正弦、余弦、正切公式	345
第3课时 二倍角的正弦、余弦、正切公式	348
5.5.2 简单的三角恒等变换	350
第1课时 三角函数式的化简与求值	350
第2课时 三角函数公式的应用	352
5.6 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$	354
5.6.1 匀速圆周运动的数学模型	354
5.6.2 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象	354
第1课时 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象	354
第2课时 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象与性质的应用	358
5.7 三角函数的应用	361
④ 本章总结提升	365

◆ 参考答案(单独成册)	371
--------------	-----



第一章 集合与常用逻辑用语



讲课智能体

1.1 集合的概念

【学习目标】

- 1. 了解集合的含义,理解元素与集合的属于关系.
- 2. 能在自然语言和图形语言的基础上,用符号语言刻画集合.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 元素与集合的含义

- 1. 元素与集合的含义:一般地,我们把研究对象统称为_____,把一些元素_____叫作集合(简称为集).
- 2. 集合相等:只要构成两个集合的_____是一样的,我们就称这两个集合是相等的.
- 3. 符号表示:常用大写拉丁字母 $A, B, C, \dots$ 表示集合,用小写拉丁字母 $a, b, c, \dots$ 表示集合中的元素.
- 4. 元素与集合的关系:如果 a 是集合 A 的元素,就说 a _____ 集合 A , 记作 _____; 如果 _____, 就说 a 不属于集合 A , 记作 _____.
- 5. 常用数集及其记法:

常用的数集	符号表示
自然数集	_____
正整数集	_____或_____
整数集	_____
有理数集	_____
实数集	_____

- 6. 集合中元素的三个性质为: _____、 _____、无序性.

【诊断分析】

- 1. 下列对象可以组成集合的是 ()
A. 人口密度大的国家 B. 所有美丽的城市
C. 地球上的四大洋 D. 优秀的高中生

2. 某中学高一年级共 8 个班,这 8 个班组成一个集合 A .

- (1)高一(2)班、高二(8)班是集合 A 中的元素吗?
- (2)若 $a \in A, b \in A$, 则元素 a, b 有什么关系? 为什么?

◆ 知识点二 集合的表示法

- 1. 列举法:把集合的所有元素一一列举出来,并用 _____ 括起来表示集合的方法叫作列举法(注意元素间要用“,”隔开,如 $\{-1, 0, 1, 2\}$).
- 2. 描述法:设 A 是一个集合,把集合 A 中所有具有 _____ 特征 $P(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为 _____, 这种表示集合的方法称为描述法.

【诊断分析】

- 1. 方程 $(x+1)(x-2)=0$ 的实数根组成的集合中有多少个元素? 并用适当的方法表示这个集合.
- 2. 由抛物线 $y=x^2$ 上的点组成的集合中有多少个元素? 并用适当的方法表示这个集合.

◆ 探究点一 元素与集合的含义

例 1 下列各组对象不可以组成集合的是 ()

- A. 二十四节气
B. 2026 年高考数学难题
C. 中国科学院院士(截至 2026 年 8 月)
D. 所有的质数

变式 下列对象能构成集合的是 ()

①所有很高的山峰;②方程 $x^2 + 3x - 4 = 0$ 的实根;③小于 10 的自然数;④接近于 0 的数.

- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

例 2 用符号“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”填空: 0 _____ $\mathbf{N}$;
 $\frac{1}{3}$ _____ $\mathbf{Q}$; 2.4 _____ $\mathbf{Z}$; $\sqrt{3}$ _____ $\mathbf{Q}$;
 4 _____ $\mathbf{Z}$.
变式 下列说法中不正确的是 ()

- A. $0 \in \mathbf{N}^*$ B. $0 \in \mathbf{N}$
C. $0.1 \notin \mathbf{Z}$ D. $2 \in \mathbf{Q}$

拓展 (1)已知集合 A 是由形如 $m + \sqrt{3}n$ (其中 $m, n \in \mathbf{Z}$) 的数组成的,则下列数中属于集合 A 的是 _____ . (填序号)

① $2 - \sqrt{3}$; ② 5 ; ③ $\frac{1}{\sqrt{3} + 4}$; ④ $\frac{\sqrt{3}\pi}{2} + 1$.

(2)已知集合 A 中的元素是实数,且满足条件:

①若 $a \in A, a \neq 1$, 则 $\frac{1}{1-a} \in A$; ② $2 \in A$. 判断集合

A 中至少有几个元素.

[素养小结]

(1)判断元素能否组成集合,关键是集合中元素的确定性,即能否找到一个明确的评判标准来衡量元素是否为集合中的元素,若标准明确,则可以组成集合,否则不可以.

(2)判断一个元素是否属于某一集合,就是判断这个元素是否满足该集合元素的条件.若满足,就是“属于”关系;若不满足,就是“不属于”关系.特别注意,符号“ $\in$ ”与“ $\notin$ ”只表示元素与集合的关系.

(3)元素与集合的关系是集合这部分内容最根本的知识.

◆ 探究点二 集合中元素的特性

例 3 (1)英文单词 excellent 的所有字母组成的集合中共有 ()

- A. 6 个元素 B. 7 个元素
C. 8 个元素 D. 9 个元素

(2)已知集合 $A = \{12, a^2 + 4a, a - 2\}$, 且 $-3 \in A$, 则 $a =$ ()

- A. -1 B. -3 或 -1
C. 3 D. -3

变式 (1)已知集合 A 中含有三个元素 $x, x+1, 1$, 集合 B 中含有三个元素 x, x^2+x, x^2 , 且 A 与 B 中的元素相同,则实数 x 的值为 _____.

(2)[2025 · 北京师大附中测试] 如果集合 $A = \{x | ax^2 + 2x + 1 = 0\}$ 中只有一个元素,则 a 的值是 _____.

[素养小结]

(1)对于求集合中字母参数的问题,常根据集合中元素的确定性得出字母的所有可能取值,再利用集合中元素的互异性进行检验.

(2)在利用集合中元素的特性解题时常用分类讨论思想,注意分类的标准要明确.

◆ 探究点三 集合的表示

角度一 列举法表示集合

例 4 用列举法表示下列集合.

- (1)中国的直辖市组成的集合;
(2)15 的正约数组成的集合;

- (3) 方程 $x^2=x$ 的所有实数解组成的集合；
 (4) 直线 $y=x$ 与 $y=2x-1$ 的交点组成的集合；
 (5) 满足 $-2 \leq x \leq 3$ 且 $x \in \mathbf{Z}$ 的 x 组成的集合.

变式 用列举法表示下列集合.

- (1) 从正方形 $ABCD$ 的四个顶点中任取三个为顶点作三角形, 由这些三角形组成的集合;
 (2) 方程组 $\begin{cases} 2x-3y=14, \\ 3x+2y=8 \end{cases}$ 的解集;
 (3) 所有正整数组成的集合.

[素养小结]

用列举法表示集合应注意的三点:

- (1) 弄清集合中的元素是什么, 是数、点、方程, 还是其他元素;
 (2) 集合中的元素一定要写全, 但不能重复;
 (3) 若集合中的元素是点, 则应将有序实数对用小括号括起来表示一个元素.


角度二 描述法表示集合

例 5 用描述法表示下列集合.

- (1) 二次函数 $y=x^2+1$ 的函数值组成的集合 A ;
 (2) 被 3 除余 2 的正整数组成的集合 B ;
 (3) 平面直角坐标系中第四象限内的点组成的集合 C .

变式 用描述法表示下列集合.

- (1) 在自然数集内, 小于 1000 的奇数组成的集合;
 (2) 一次函数 $y=x-3$ 与 $y=-2x$ 的图象的交点组成的集合 C .
 (3) 图中阴影部分内(含边界)的点组成的集合.



[素养小结]

- (1) 用描述法表示集合, 应先弄清集合的属性, 是数集、点集还是其他类型的集合. 一般地, 数集用一个字母代表其元素, 而点集则用一个有序实数对来代表其元素.
 (2) 若描述部分出现元素记号以外的字母, 则要对新字母说明其含义或指出其取值范围.

课堂评价

知识评价 素养形成

- 下列所给的对象不能组成集合的是 ()
 A. 某班年龄较小的同学
 B. 二元一次方程 $x+y=1$ 的解
 C. 我国古代的四大发明
 D. 平面内到定点的距离等于定长的点
- 给出下列关系, 其中正确的个数为 ()
 ① $\frac{1}{2} \in \mathbf{R}$; ② $2 \in \mathbf{Z}$; ③ $|-3| \notin \mathbf{N}^*$; ④ $|\sqrt{3}| \in \mathbf{Q}$.
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- [2026·延庆期中] 方程 $x^2-5x-6=0$ 的解集为 ()
 A. $x=-1$ 或 $x=6$ B. $\{-1, 6\}$
 C. $\{-2, -3\}$ D. $\{1, -6\}$
- [2026·北京人大附中朝阳学校测试] “函数 $y=x^2-1$ 的图象”用集合可以表示为 ()
 A. $\{y=x^2-1\}$ B. $\{y|y=x^2-1\}$
 C. $\{(x, y)|y=x^2-1\}$ D. $\{y|y \geq -1\}$
- [2026·北京第二十中学测试] 已知集合 $A = \{-4, 2a-1, a^2\}$, 如果 $1 \in A$, 则 a 的取值集合为 ()
 A. $\{0\}$ B. $\{1\}$
 C. $\{1, -1\}$ D. $\{-1\}$

1.2 集合间的基本关系

【学习目标】

- 1. 理解集合之间包含与相等的含义,能识别给定集合的子集.
- 2. 能使用 Venn 图表达集合的基本关系,体会图形对理解抽象概念的作用.
- 3. 在具体情境中,了解空集的含义.


课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 子集

定义	一般地,对于两个集合 A, B ,如果集合 A 中_____元素都是集合 B 中的元素,就称集合 A 为集合 B 的子集
记法与读法	记作_____(或_____),读作“ A 包含于 B ”(或“ B 包含 A ”)
Venn 图	在数学中,经常用平面上封闭曲线的_____代表集合,这种图称为 Venn 图
图示	
结论	(1)反身性:任何一个集合是它本身的子集,即 $A \subseteq A$; (2)传递性:对于集合 A, B, C ,若 $A \subseteq B$,且 $B \subseteq C$,则 $A \subseteq C$

◆ 知识点二 集合的相等关系

定义	一般地,如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素,同时集合 B 的任何一个元素都是集合 A 的元素,那么集合 A 与集合 B 相等
记法	记作_____
符号表示	若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$,则 $A = B$
图示	

◆ 知识点三 真子集

定义	如果集合 $A \subseteq B$,但存在元素_____,且_____,就称集合 A 是集合 B 的真子集
记法与读法	记作 $A \subsetneq B$ (或 $B \supsetneq A$),读作“ A 真包含于 B ”(或“ B 真包含 A ”)

(续表)

图示	
结论	(1) $A \subsetneq B$ 且 $B \subsetneq C$,则 $A \subseteq C$; (2) $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$,则 $A \subsetneq B$

◆ 知识点四 空集

定义	一般地,我们把_____的集合叫作空集
记法	记为 $\emptyset$
规定	空集是任何集合的_____,即 $\emptyset \subseteq A$
特性	(1)空集只有一个子集,即它的本身, $\emptyset \subseteq \emptyset$; (2)空集是任何非空集合的真子集,即若 $A \neq \emptyset$,则 $\emptyset \subsetneq A$


【诊断分析】

1. 下列各式中正确的是_____.(填序号)
① $\{0\} \in \{0, 1, 2\}$; ② $\{0, 1, 2\} \supseteq \{2, 1, 0\}$; ③ $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$; ④ $\emptyset = \{0\}$; ⑤ $\{0, 1\} = \{(0, 1)\}$; ⑥ $0 \subset \{0\}$.
2. (1)已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$,则集合 A 的子集为_____.
- (2)已知集合 $B = \{(1, 2), (3, 4)\}$,则集合 B 的真子集为_____.
3. 正整数集 $\mathbf{N}^*$ 与自然数集 $\mathbf{N}$ 之间是什么关系?
自然数集 $\mathbf{N}$ 与有理数集 $\mathbf{Q}$ 之间是什么关系?

◆ 探究点一 集合间关系的判断

例 1 判断下列每对集合之间的关系.(1)若 $A = \{x | x \text{ 是四边形}\}$, $B = \{x | x \text{ 是梯形}\}$, 则 A _____ B . (填“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”)(2)若 $A = \{x | x = 2k, k \in \mathbf{N}\}$, $B = \{y | y = 4m, m \in \mathbf{N}\}$, 则 A _____ B . (填“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”)(3)若 $M = \{(x, y) | x > 0, y < 0\}$, $N = \{(x, y) | xy < 0\}$, 则 M _____ N . (填“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”)(4)若集合 $A = \{x | x < 1\}$, $B = \{x | -1 < x < 1\}$, 则 A _____ B . (填“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”)**变式 (1)** [2026 · 丰台期中] 已知集合 $A = \{x | x^2 + x = 0\}$, 则下列说法正确的是 ()

- A. $\emptyset \in A$
 B. $-1 \in A$
 C. $\{1\} \subseteq A$
 D. $A = \{0, 1\}$

(2)已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x | x^2 = x\}$, 则能表述集合 A, B 关系的 Venn 图是 ()

[素养小结]

判断集合间关系的方法:

(1)用定义判断.

首先,判断一个集合 A 中的任意元素是否属于另一个集合 B ,若是,则 $A \subseteq B$,否则 A 不包含于 B ;其次,判断集合 B 中的任意元素是否属于集合 A ,若是,则 $B \subseteq A$,否则 B 不包含于 A .若既有 $A \subseteq B$,又有 $B \subseteq A$,则 $A = B$.

(2)数形结合判断.

对于不等式表示的数集,可在数轴上表示出集合的元素,直观地进行判断,但要注意端点值的取舍.

◆ 探究点二 集合的子集、真子集


例 2 写出集合 $\{a, b, c\}$ 的所有子集和真子集,并写出子集和真子集的个数.试猜想含 n 个元素的集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的所有子集的个数、真子集的个数及非空真子集的个数分别是多少?

变式 (1) [2026 · 北京第十一中学测试] 集合 $A = \{x \in \mathbf{N} | -1 < x < 3\}$ 的子集的个数为 _____.

(2)已知集合 M 满足 $\{1, 2\} \subsetneq M \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 写出所有满足条件的集合 M .

[素养小结]

(1)求集合子集、真子集的步骤

注意:要注意两个特殊的子集, $\emptyset$ 和自身.(2)已知集合 A 中有 $n (n \in \mathbf{N}^*)$ 个元素,则有下列结论:

- ① A 的子集的个数为 2^n ;
 ② A 的非空子集的个数为 $2^n - 1$;
 ③ A 的真子集的个数为 $2^n - 1$;
 ④ A 的非空真子集的个数为 $2^n - 2$.

◆ 探究点三 由集合间的关系求参数

例 3 [2026·西城期中] 已知关于 x 的不等式组

$$\begin{cases} x-a-2 \leq 0, \\ x-a+2 \geq 0 \end{cases} \text{ 的解集是 } A = \{x \mid 0 \leq x \leq 4\}, \text{ 集合}$$

$$B = \{x \mid m-3 \leq x \leq m+3\}.$$

(1) 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值范围.

变式 (1) 设集合 $M = \{x \mid |x-2| = 1\}$, $N = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $N \subseteq M$, 则实数 a 的值是_____.

(2) 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$, $B = \{x \mid a-1 \leq x \leq 2a-3\}$.

① 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围;

② 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, 没有元素 x 使 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 a 的取值范围.

[素养小结]

由集合间的关系求参数问题的注意点及常用方法:

(1) 注意点: ① 不能忽视集合为 $\emptyset$ 的情形; ② 当集合中含有字母参数时, 一般需要分类讨论.

(2) 常用方法: 对于用不等式给出的集合, 已知集合的包含关系求相关参数的范围(值)时, 常采用数形结合的思想, 借助数轴解答.

课堂评价

知识评价 素养形成

1. [2026·北京广渠门中学测试] 若集合 $M = \{x \mid x \leq 6\}$, $a = 3\sqrt{2}$, 则下列结论正确的是 ()

A. $\{a\} \subseteq M$ B. $a \subseteq M$

C. $\{a\} \in M$ D. $a \notin M$

2. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid a \leq x < 3\}$. 若 $A \subseteq B$, 则 a 的最大值为 ()

A. 2 B. 0

C. -1 D. -2

3. 满足条件 $\{2, 4\} \subseteq M \subsetneq \{1, 2, 3, 4\}$ 的集合 M 的个数为 ()

A. 4 B. 3

C. 2 D. 0

4. 集合 $A = \{x \mid 0 \leq x < 2 \text{ 且 } x \in \mathbf{N}\}$ 的真子集的个数是_____.

5. 已知集合 $A = \{x \mid 1 < x \leq 4\}$, $B = \{x \mid 6-a < x < 2a-1\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

1.3 集合的基本运算

第1课时 集合的并集、交集

【学习目标】

1. 理解并集、交集的概念,会用文字语言、符号语言及图形语言来描述这些概念.
2. 了解并集、交集的一些简单性质,会求两个简单集合的并集与交集.
3. 能使用 Venn 图表达集合的并集与交集.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 集合的并集

1. 并集的三种语言表示:

文字语言	一般地,由所有_____的元素组成的集合,称为集合 A 与 B 的并集,记作_____ (读作“ A 并 B ”)
符号语言	$A \cup B = \{x \mid \underline{\hspace{2cm}}\}$
图形语言	

2. 并集的运算性质

- (1) $A \cup A = A$; (2) $A \cup \emptyset = A$; (3) $A \cup B = B \cup A$;
 (4) 若 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B$, 反之也成立.

◆ 知识点二 集合的交集

1. 交集的三种语言表示:

文字语言	一般地,由所有属于_____的元素组成的集合,称为集合 A 与 B 的交集,记作_____ (读作“ A 交 B ”)
符号语言	$A \cap B = \{x \mid \underline{\hspace{2cm}}\}$
图形语言	

2. 交集的运算性质

- (1) $A \cap A = A$; (2) $A \cap \emptyset = \emptyset$; (3) $A \cap B = B \cap A$;
 (4) 若 $A \subseteq B$, 则 $A \cap B = A$, 反之也成立.

【诊断分析】

- (1) 若集合 $A = \{4, 5, 6, 8\}$, $B = \{3, 5, 7, 8\}$, 则集合 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 若 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 若 $A = \{x \in \mathbf{N} \mid x < 5\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 并集及其运算

例1 (1) [2026 · 北京清华附中测试] 若集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4\}$, $B = \{x \mid x - 1 \geq 8 - 2x\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{x \mid 2 \leq x < 4\}$ B. $\{x \mid 3 \leq x < 4\}$
 C. $\{x \mid x \geq 2\}$ D. $\{x \mid x \geq 3\}$

(2) 满足条件 $M \cup \{2\} = \{1, 2, 4\}$ 的集合 M 的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

变式 (1) 若 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{y \mid y = 2x, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{0, 2, 4, 6\}$ B. $\{0, 2\}$
 C. $\{0, 1, 2, 3, 4, 6\}$ D. $\{0, 1, 2, 3, 0, 2, 4, 6\}$

(2) [2026 · 北京第三十五中学测试] 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{x \mid -2 \leq x < -1\}$ B. $\{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 4\}$
 C. $\{x \mid -2 \leq x < 4\}$ D. $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$

【素养小结】

并集运算应注意的问题:

- (1) 对于用描述法表示的集合, 应先看集合的代表元素是什么, 然后将集合化简, 再按定义求解.
- (2) 求两个集合的并集时要注意利用集合中元素的互异性, 重复的元素只能算一个;
- (3) 对于元素个数无限的集合进行并集运算时, 可借助数轴, 利用数轴分析法求解, 但要注意端点的值能否取到.

◆ 探究点二 交集及其运算

例 2 (1)[2025·东城期末] 已知集合 $M=\{x|-3<x<0\}$, $N=\{x|-1\leq x<4\}$, 则 $M\cap N=$ ()

- A. $\{x|-1\leq x<0\}$ B. $\{x|x>-3\}$
C. $\{x|-3<x<4\}$ D. $\{x|x<4\}$

(2) 设集合 $A=\{-2,2\}$, $B=\{x|x^2-5x-m=0\}$. 若 $A\cap B=\{2\}$, 则 $B=$ ()

- A. $\{-2,3\}$ B. $\{2\}$
C. $\{-2,2\}$ D. $\{2,3\}$


变式 (1) 已知集合 $A=\{x|x=3n+2, n\in\mathbf{N}\}$, $B=\{6,8,10,12,14\}$, 则集合 $A\cap B$ 中元素的个数为 ()

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

(2) 已知集合 $A=\{(x,y)|y=x\}$, $B=\{(x,y)|y=5-4x\}$, 则 $A\cap B=$ ()

- A. $(1,1)$ B. $\{(1,1)\}$
C. $(-1,-1)$ D. $\{(-1,-1),(1,1)\}$

(3) 已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}|1\leq x\leq 10\}$, $B=\{x\in\mathbf{R}|x^2+x-6=0\}$, 则



图中阴影部分表示的集合为 ()

- A. $\{2\}$ B. $\{3\}$
C. $\{-3,2\}$ D. $\{-2,3\}$

[素养小结]

求集合 $A\cap B$ 的常见类型:

- ① 若 A, B 中的元素是方程的根, 则应先解方程求出方程的根, 再求两集合的交集;
- ② 若 A, B 中的元素是有序实数对, 则 $A\cap B$ 是指两个方程组成的方程组的解集, 交集是点集;
- ③ 若 A, B 是无限数集, 则可以利用数轴来求解, 但要注意利用数轴表示不等式时, 含有端点的值用实心点表示, 不含有端点的值用空心圈表示.

◆ 探究点三 根据并集与交集运算求参

例 3 [2026·北京理工附中测试] 已知集合 $A=\{x||x-2|\leq 3\}$, $B=\{x|a+1\leq x\leq 2a-1\}$.

(1) 当 $a=4$ 时, 求 $A\cup B$;

(2) 若 $A\cap B=B$, 求实数 a 的取值范围.

变式 [2026·石景山期末] 已知集合 $A=\{x|a\leq x\leq a+3\}$, $B=\{x|x<-2 \text{ 或 } x>6\}$.

(1) 若 $A\cap B=\emptyset$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A\cup B=B$, 求实数 a 的取值范围.

[素养小结]

(1) 在利用交集、并集的性质解题时, 常常会遇到 $A\cap B=A$, $A\cup B=B$ 这类问题, 解答时常借助于交、并集的定义以及集合间的关系去分析, 如由 $A\cap B=A$ 得 $A\subseteq B$, 由 $A\cup B=B$ 得 $A\subseteq B$ 等.

(2) 当集合 $B\subseteq A$ 时, 如果集合 A 是一个确定的集合, 而集合 B 不确定, 那么运算时要考虑 $B=\emptyset$ 的情况.

课堂评价

知识评价 素养形成

1. [2025·丰台期末] 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{3,4,5\}$, 则 $A\cup B=$ ()

- A. $\{3,4\}$ B. $\{1,2,4,5\}$
C. $\{1,2,3,5\}$ D. $\{1,2,3,4,5\}$

2. [2026·北京汇文中学测试] 已知集合 $A=\{x|-1\leq x\leq 3\}$, $B=\{x|x\leq 0, x\in\mathbf{Z}\}$, 则 $A\cap B=$ ()

- A. $\{x|-1\leq x\leq 0\}$ B. $\{0,1,2,3\}$
C. $\{x|0\leq x\leq 3\}$ D. $\{-1,0\}$

3. 已知集合 $A=\{-1,0,m\}$, $B=\{1,2\}$, 若 $A\cup B=\{-1,0,1,2\}$, 则实数 m 的值为 ()

- A. -1 或 0 B. 0 或 1
C. -1 或 2 D. 1 或 2

4. 设集合 $A = \{x | 1 < x < 3\}$, $B = \{x | x < a\}$, 若 $A \cap B = A$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a \geq 1$ B. $a \geq 3$
C. $a \leq 1$ D. $a \leq 3$

5. [2025 · 北京第九中学测试] 已知集合 $A = \{x | -3 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x | 2 - a \leq x \leq 2a - 1\}$.

(1) 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

第2课时 集合的全集、补集

【学习目标】

- 在具体情境中, 了解全集的含义.
- 理解在给定集合中一个子集的补集的含义, 能求给定子集的补集.
- 能使用 Venn 图表示集合的基本运算, 体会图形对理解抽象概念的作用.

课 前 预 习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 全集

(1) 定义: 一般地, 如果一个集合含有所研究问题中涉及的 _____, 那么就称这个集合为全集.

(2) 记法: 全集通常记作 _____.

◆ 知识点二 补集的概念及性质


定义	文字语言	对于一个集合 A , 由全集 U 中 _____ 的所有元素组成的集合称为集合 A 相对于全集 U 的补集, 简称为集合 A 的补集, 记作 _____
	符号语言	$\complement_U A = \{x \text{_____}\}$
	图形语言	
性质	(1) $\complement_U A \subseteq U$; (2) $\complement_U U = \text{_____}$, $\complement_U \emptyset = \text{_____}$; (3) $\complement_U (\complement_U A) = \text{_____}$; (4) $A \cup (\complement_U A) = \text{_____}$, $A \cap (\complement_U A) = \text{_____}$	

【诊断分析】

1. 若集合 $A = \{x \in \mathbf{N} | 0 \leq x < 5\}$, $B = \{x | (x - 4)(x - 1) = 0\}$, 则 $\complement_A B =$ ()
- A. $\{2, 3\}$ B. $\{1, 2, 3\}$
C. $\{0, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{1, 4\}$, 则 $\complement_U A =$ _____.

3. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x | \frac{1}{x} < 2\}$, 则图中阴影部分表示的集合为 _____.



课 中 探 究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 补集的简单运算

例 1 (1) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $\complement_U M =$ ()

- A. 5 B. $\{5\}$
C. $\{3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

(2) 已知集合 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x | x \leq -1 \text{ 或 } x > 2\}$, 则 $\complement_U A =$ ()

- A. $\{x | x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$
B. $\{x | -1 < x \leq 2\}$
C. $\{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 2\}$
D. $\{x | -1 < x < 2\}$

变式 (1) [2026 · 北京清华附中测试] 已知全集 $U = \{x | -2 < x < 5\}$, 集合 A 满足 $\complement_U A = \{x | 0 \leq x < 4\}$, 则 ()

- A. $-1 \notin A$ B. $0 \in A$
C. $2 \in A$ D. $4 \in A$

(2) 已知全集 U , 集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $\complement_U A = \{2, 4, 6\}$, $\complement_U B = \{1, 4, 6\}$, 则集合 $B =$ _____.

[素养小结]

求集合的补集的方法:


(1)定义法:当集合中的元素较少时,可利用定义直接求解.

(2)Venn 图法:借助 Venn 图可直观地求出补集.

(3)数轴法:当集合中的元素连续且无限时,可借助数轴求解,此时需注意端点的取值.

◆ 探究点二 并集、交集、补集的综合运算

例 2 (1)已知全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $P=\{x|-1<x\leq 8, x\in \mathbf{Z}\}$, $M=\{x\in \mathbf{R}|x\leq -2 \text{ 或 } x>5\}$, 则图中阴影部分表示的集合中的元素共有



()

A. 8 个 B. 6 个

C. 5 个 D. 4 个

(2)已知集合 $U=\{x|1<x\leq 7\}$, $A=\{x|2\leq x<5\}$, $B=\{x|3\leq x<7\}$.

求:① $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$; ② $\complement_U (A \cap B)$.


变式 (1)设集合 $U=\mathbf{R}$, 集合 $M=\{x|x<1\}$, $N=\{x|-1<x<2\}$, 则 $\{x|x\geq 2\} =$ ()

A. $\complement_U (M \cup N)$ B. $N \cup (\complement_U M)$

C. $\complement_U (M \cap N)$ D. $M \cup (\complement_U N)$

(2)已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $M=\{1,3,6\}$, $P=\{3,4,5\}$, 则图中阴影部分表示的集合是

_____.



[素养小结]

(1)解决与集合的交、并、补集运算有关的综合问题时,一般先运算括号内的部分,如求 $(\complement_U A) \cap B$ 时,可先求出 $\complement_U A$,再求交集;求 $\complement_U (A \cup B)$ 时,可先求出 $A \cup B$,再求补集.

(2)不等式中的等号在补集中能否取到,要引起重视,还要注意补集是全集的子集.

◆ 探究点三 利用集合间的关系求参

例 3 已知集合 $A=\{x|a<x<a+1\}$, $B=\{x|-2\leq x\leq 0\}$.

(1)若 $a=1$,求 $A \cup B$;

(2)在① $A \cup B = B$, ② $(\complement_{\mathbf{R}} B) \cap A = \emptyset$, ③ $B \cup (\complement_{\mathbf{R}} A) = \mathbf{R}$ 这三个条件中任选一个作为已知条件,求实数 a 的取值范围.

变式 (1)设全集 $U=\{1,3,m^2+m-9\}$, 集合 $A=\{1,m\}$, $\complement_U A=\{3\}$, 则实数 $m =$ _____.

(2)已知全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $A=\{x|-2\leq x\leq 5\}$, $B=\{x|a+1\leq x\leq 2a-1\}$, 且 $A \subseteq \complement_U B$, 求实数 a 的取值范围.

[素养小结]

由集合的补集求解参数的方法:

(1)当集合中元素个数有限时,可利用补集定义并结合集合知识求解;

(2)当集合中元素个数无限时,一般利用数轴分析法求解.

课堂评价

知识评价 素养形成

1. 已知集合 $A=\{x|-1<x<1\}$, 则 $\complement_{\mathbf{R}} A =$ ()

A. $\{x|x\leq -1\}$


B. $\{x|x\geq 1\}$

C. $\{x|x\leq -1 \text{ 或 } x\geq 1\}$

D. $\{x|x<-1 \text{ 或 } x>1\}$

2. [2026·北京朝阳外国语学校测试] 已知全集 $U=\mathbf{Z}$, 集合 $A=\{x\in\mathbf{Z}|-2<x<2\}$, $B=\{-1,0,1,2\}$, 则 $(\complement_U A)\cap B=$ ()
- A. $\{-1,2\}$ B. $\{1\}$
C. $\{0,1\}$ D. $\{2\}$

3. [2025·北京师大附中测试] 如图, 已知全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $M=\{x|0\leq x\leq 2\}$, $N=\{x|1\leq x\leq 3\}$, 则阴影部分所表示的集合为_____.



4. [2025·通州期中] 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$, 集合 A, B 为 U 的两个非空子集, 且 $B=\{2,3,5\}$, 则 $\complement_U B=$ _____; 满足 $A\subseteq\complement_U B$ 的一个集合 A 为_____.

5. 已知全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $A=\{x|-5<x<5\}$, $B=\{x|0\leq x<7\}$.
求: (1) $A\cap B$; (2) $A\cup B$; (3) $A\cup(\complement_U B)$;
(4) $B\cap(\complement_U A)$; (5) $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$.

1.4 充分条件与必要条件

1.4.1 充分条件与必要条件

【学习目标】

- 通过对典型数学命题的梳理, 理解充分条件的意义, 理解判定定理与充分条件的关系.
- 通过对典型数学命题的梳理, 理解必要条件的意义, 理解性质定理与必要条件的关系.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点 充分条件与必要条件

	“若 p , 则 q ”为真命题	“若 p , 则 q ”为假命题
推出关系	p _____ q	p _____ q
条件关系	p 是 q 的 _____ 条件 q 是 p 的 _____ 条件	p 不是 q 的 _____ 条件 q 不是 p 的 _____ 条件
定理关系	判定定理给出了相应数学结论成立的充分条件; 性质定理给出了相应数学结论成立的必要条件	

【诊断分析】 1. 判断正误. (请在括号内打“√”或“×”)

- (1) “ $x^2=y^2$ ”是“ $x=y$ ”的充分条件. ()
(2) “ $ab=0$ ”是“ $b=0$ ”的必要条件. ()
(3) “内错角相等”是“两直线平行”的充分条件. ()

2. 写出 $2x>3$ 成立的一个充分不必要条件_____.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 充分条件、必要条件的判断

例1 下列“若 p , 则 q ”形式的命题中, 哪些命题中 p 是 q 的充分条件?

- (1) 若 $4x^2-mx+9$ 是完全平方式, 则 $m=12$;
(2) 若 $(x-1)^2+(y-2)^2=0$, 则 $(x-1)(y-2)=0$;
(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A+B=90^\circ$, 则 $C=90^\circ$.

例2 下列各题中,哪些 q 是 p 的必要条件?

- (1) $p: x=1, q: x-1=\sqrt{x-1}$;
- (2) $p: -2 \leq x \leq 5, q: -1 \leq x \leq 5$;
- (3) $p: a$ 是自然数, $q: a$ 是正整数;
- (4) p : 三角形是等边三角形, q : 三角形是等腰三角形.

变式 下列各题中,哪些 p 是 q 的充分条件? 哪些 p 是 q 的必要条件?

- (1) $p: a=b, q: ac=bc$;
- (2) $p: A \cap B = A, q: A \subsetneq B$;
- (3) p : 四边形是矩形, q : 四边形的对角线相等.

[素养小结]

充分条件、必要条件的几种判定方法:

- (1) 定义法: 根据 $p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$ 进行判断, 适用于定义、定理的判断性问题.
- (2) 集合法: 根据 p, q 成立的对象组成的集合之间的包含关系进行判断, 多适用于命题中涉及参数范围的推断问题.

◆ 探究点二 充分条件、必要条件的应用

例3 设全集 $U=\mathbf{R}$, 集合 $A=\{x|1 \leq x \leq 5\}$, 非空集合 $B=\{x|2-a \leq x \leq 1+2a\}$.

- (1) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 求实数 a 的取值范围.

变式 (1) [2025 · 北京第三十五中学测试] 若“ $0 < x < 4$ ”是“ $|x| < a$ ”的充分条件, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $a \geq 1$
- B. $a \geq 4$
- C. $a \leq 1$
- D. $a \leq 4$

(2) [2026 · 北京京源学校测试] 已知集合 $A=\{x|a-2 < x < a+2\}, B=\{x|-1 < x < 2\}$, “ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

[素养小结]

根据充分条件、必要条件求参数的取值范围时, 主要根据充分条件、必要条件与集合间的关系, 将问题转化为相应的两个集合之间的包含关系, 然后建立关于参数的不等式(组)进行求解, 有时还需要借助数轴解决问题.

1. “ $\frac{a}{3} > \frac{a}{2}$ ”的一个充分不必要条件是 ()

- A. $a > 0$ B. $a < 0$
C. $a < -1$ D. $a < 1$

2. [2026 · 房山期中] 设 $p: a > 2, q: \frac{1}{a} < 1$, 则 p 是 q 的 _____. (从“充分不必要条件”“必要不充分条件”中选填)

3. [2026 · 北京清华附中测试] “ $x < 2$ ”是“ $-2 < x < 2$ ”的 _____. (从“充分不必要条件”“必要不充分条件”中选填)

4. [2026 · 北京师大附中测试] 若 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $(x-1)(x+2)=0$ ”是“ $x=1$ ”的 _____. (从“必要不充分”“充分不必要”中选填)

5. 已知集合 $A = \{x \mid -3 \leq x \leq 4\}, B = \{x \mid 1 - m < x \leq 3m - 2\}$, 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件, 则 m 的取值范围为 _____.

1.4.2 充要条件

【学习目标】

通过对典型数学命题的梳理, 理解充要条件的意义, 理解数学定义与充要条件的关系.

◆ 知识点 充要条件的概念

1. 逆命题

将命题“若 p , 则 q ”中的条件 p 和结论 q 互换, 就得到一个新的命题“若 q , 则 p ”, 称这个命题为原命题的逆命题.

2. 充要条件

如果“若 p , 则 q ”和它的逆命题“若 q , 则 p ”均是真命题, 即既有 $p \Rightarrow q$, 又有 $q \Rightarrow p$, 就记作 _____. 此时, p 既是 q 的充分条件, 也是 q 的必要条件, 我们说 p 是 q 的 _____, 简称为 _____. 显然, 如果 p 是 q 的充要条件, 那么 q 也是 p 的充要条件. 概括地说, 如果 $p \Leftrightarrow q$, 那么 p 与 q _____.

【诊断分析】

- (1) 已知 p : 两个角是对顶角, q : 两个角相等, 则 p 是 q 的 _____ 条件.
(2) 已知 $p: x = 2, q: x^2 - 4x + 4 = 0$, 则 p 是 q 的 _____ 条件.
(3) $a = 0$ 且 $b = 0$ 是 $ab = 0$ 的 _____ 条件.
(4) 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $x^2 + y^2 = 0$ 的充要条件为 _____.

◆ 探究点一 充要条件的判断

例 1 下列各题中, 试分别指出 p 是 q 的什么条件.

- (1) $p: ab = 0, q: a = 0$;
(2) p : 四边形的对角线相等, q : 四边形是正方形;
(3) $p: a + 5$ 是无理数, $q: a$ 是无理数;
(4) $p: A \subseteq B, q: A \cup B = B$.

[素养小结]

判断 p 是 q 的充要条件的两种思路:

(1)命题角度:判断 p 是 q 的充要条件,主要是判断 $p \Rightarrow q$ 及 $q \Rightarrow p$ 是否成立.若 $p \Rightarrow q$ 成立,则 p 是 q 的充分条件,同时 q 是 p 的必要条件;若 $q \Rightarrow p$ 成立,则 p 是 q 的必要条件,同时 q 是 p 的充分条件.若二者都成立,则 p 与 q 互为充要条件.

(2)集合角度:关于充分条件、必要条件、充要条件,当不容易判断 $p \Rightarrow q$ 及 $q \Rightarrow p$ 是否成立时,也可以从集合角度去判断,结合集合中“小集合 $\Rightarrow$ 大集合”的关系来理解,这对解决与逻辑有关的问题大有益处.

此外,对于较复杂的关系,常用 $\Rightarrow, \Leftarrow, \Leftrightarrow$ 等符号进行传递,画出它们的综合结构图,可降低解题难度.

◆ 探究点二 充要条件的证明

例 2 已知 $\triangle ABC$ 的三边长为 a, b, c , 其中 $a = 2$. 求证: $\triangle ABC$ 为等边三角形的充要条件是 $b^2 + c^2 - 2(b + c) = bc - 4$.

变式 求证:关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一个根为 1 的充要条件是 $a + b + c = 0$.

[素养小结]

证明充要条件时要从充分性和必要性两个方面分别证明,首先分清哪个是条件,哪个是结论,然后确定推出方向,即充分性需要证明“条件” $\Rightarrow$ “结论”,必要性需要证明“结论” $\Rightarrow$ “条件”.

◆ 探究点三 充分条件、必要条件、充要条件的应用

例 3 已知集合 $A = \{x \mid 2m \leq x \leq m + 3\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 1\}$. 若 $p: x \in B, q: x \in A$, 且 p 是 q 的充分不必要条件,求 m 的取值范围.

变式 已知集合 $A = \{x \mid 4 < x \leq 8\}$, $B = \{x \mid 5 - m^2 \leq x \leq 5 + m^2\}$. 设 $p: x \in A, q: x \in B$, 若 p 是 q 的必要不充分条件,求实数 m 的取值范围.

[素养小结]

应用充分不必要条件、必要不充分条件及充要条件求参数值(范围)的一般步骤:

(1)根据已知将充分不必要条件、必要不充分条件或充要条件转化为集合间的关系;

(2)根据集合间的关系构建关于参数的方程(组)或不等式(组)求解.



1. “四边形的对角线互相垂直”是“四边形是菱形”的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件
2. [2025·西城期末] 已知集合 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 4m + 6n, m, n \in \mathbf{Z}\}$, 则“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件
3. 若集合 $A = \{x \mid x > 2\}$, $B = \{x \mid x < b, b \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cup B = \mathbf{R}$ 的一个必要不充分条件是_____.

4. 不等式 $0 < \frac{1}{x} < 1$ 成立的一个充分不必要条件是_____.
5. 证明:“ $a > 0$ 且 $b > 0$ ”是“ $a + b > 0$ 且 $ab > 0$ ”的充要条件.

1.5 全称量词与存在量词

1.5.1 全称量词与存在量词

【学习目标】

通过已知的数学实例,理解全称量词与存在量词的意义.

◆ 知识点一 全称量词与全称量词命题

1. 全称量词的定义与表示:短语“所有的”“任意一个”在逻辑中通常叫作全称量词,并用符号“_____”表示.
常见的全称量词:所有的、任意一个、一切、每一个、任给.
2. 全称量词命题的定义及表示:含有_____的命题叫作全称量词命题.“对 M 中任意一个 x , $p(x)$ 成立”可用符号简记为 $\forall x \in M, p(x)$.

◆ 知识点二 存在量词与存在量词命题

1. 存在量词的定义与表示:短语“存在一个”“至少有一个”在逻辑中通常叫作存在量词,并用符号“_____”表示.
常见的存在量词:存在一个、至少有一个、有一个、有些、有的.

2. 存在量词命题的定义及表示:含有_____的命题叫作存在量词命题.“存在 M 中的元素 x , $p(x)$ 成立”可用符号简记为_____.

【诊断分析】写出下列命题是全称量词命题,还是全称量词命题,并判断真假.

- (1)对每一个无理数 x , x^2 也是无理数.
- (2)至少存在一个 $x \in \mathbf{Z}$, x 能被 2 和 3 整除.
- (3)任给 $x \in \mathbf{Z}$, $2x + 1$ 为奇数.
- (4)存在一个四边形,它的两条对角线互相垂直.

◆ 探究点一 全称量词命题与存在量词命题的判断

例 1 判断下列命题是全称量词命题,还是存在量词命题.

- (1)凸多边形的外角和等于 360° ;
- (2)有的三角形没有中线;
- (3)三个连续整数的乘积是 6 的倍数;
- (4)存在一个二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象与 x 轴无交点.

变式 将下列命题用“ $\forall$ ”或“ $\exists$ ”表示.

- (1)实数的平方是非负数;
- (2)方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0 (a < 0)$ 至少存在一个负根.

[素养小结]

(1)判断一个命题是否为全称量词命题,主要看命题中是否有“所有的”“任意一个”“一切”“每一个”“任给”等全称量词,有些命题的全称量词是隐藏的,要仔细辨别.

(2)判断一个命题是否为存在量词命题,主要看命题中是否有“存在一个”“至少有一个”“有些”“有一个”“有的”等存在量词,有些命题的存在量词是隐藏的,要仔细辨别.

◆ 探究点二 全称量词命题与存在量词命题真假的判断

例 2 判断下列全称量词命题的真假.

- (1)在平面直角坐标系中,任意有序实数对 (x, y) 都对应一点 P ;
- (2) $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 > \frac{1}{2}$;
- (3)所有二次函数图象的开口都向上.

变式 判断下列存在量词命题的真假.

- (1)有的集合中不含有任何元素;
- (2)有的平行四边形的四个角都相等;
- (3)存在一个实数 x , 使 $x^2 + 2x + 4 = 0$;
- (4)有些整数只有两个正因数.

[素养小结]

判断全称量词命题和存在量词命题的真假时,一定要结合生活中的实例,运用相关的数学知识进行判断.有些命题没有直接给出量词,需要自己“破译”,找出其中隐含的量词,判断其是全称量词命题还是存在量词命题,进而再判断其真假.