

考卷 I 小题·每题练

小题 1 集合与简易逻辑

1. A [解析] 集合 $M = \left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}\right\}$, $N = \{x \mid x^2 \leq x\} = \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$, 则 $M \cap N = \left\{x \mid 0 \leq x < \frac{1}{2}\right\}$, 故选 A.
2. D [解析] 图中阴影部分表示的集合为 $B \cap (\complement_U A)$, 解一元二次方程 $x^2 + x - 2 = 0$ 得 $x = -2$ 或 $x = 1$, 即 $A = \{-2, 1\}$, 则 $\complement_U A = \{-1, 0, 2\}$, 又 $B = \{0, -2\}$, 则 $B \cap (\complement_U A) = \{0\}$, 故选 D.
3. B [解析] $\because A \cap B$ 有 4 个子集, $\therefore A \cap B$ 中有 2 个不同的元素, $\therefore a \in A$, $\therefore a^2 - 3a < 0$, 解得 $0 < a < 3$, 又 $a \neq 1$, 故实数 a 的取值范围是 $(0, 1) \cup (1, 3)$, 故选 B.
4. A [解析] 若 $a > b + 1$ 成立, 则 $|a| > b + 1$ 必成立; 反过来, 若 $|a| > b + 1$ 成立, 则不一定有 $a > b + 1$, 如 $|-5| > 3 + 1$, 但 $-5 > 3 + 1$ 不成立. 故“ $a > b + 1$ ”是“ $|a| > b + 1$ ”的充分不必要条件.
5. B [解析] 若 $a \perp b, b \perp l$, 但 $a \parallel l$, 则 b 与 a 不一定垂直, 即 α, β 不一定垂直. 若 $a \perp \beta$, 因为平面 α 与平面 β 相交于直线 l , 直线 b 在平面 β 内, 且 $b \perp l$, 所以 $b \perp \alpha$, 又直线 a 在平面 α 内, 所以 $a \perp b$, 故“ $a \perp b$ ”是“ $a \perp \beta$ ”的必要不充分条件. 故选 B.
6. C [解析] 因为函数 $y = 3^x$ 在 \mathbf{R} 上单调递增, 所以“ $3^a > 3^b$ ”与“ $a > b$ ”等价. 因为函数 $y = x^3$ 在 \mathbf{R} 上单调递增, 所以“ $a^3 > b^3$ ”与“ $a > b$ ”等价. 故“ $3^a > 3^b$ ”是“ $a^3 > b^3$ ”的充要条件, 故选 C.
7. C [解析] 由题意可知 $a_n > 0, q > 0$. 由 $S_{2016} + S_{2018} > 2S_{2017}$ 可得 $S_{2018} - S_{2017} > S_{2017} - S_{2016}$, 即 $a_{2018} > a_{2017}$, 即 $q > 1$, 故“ $q > 1$ ”是“ $S_{2016} + S_{2018} > 2S_{2017}$ ”的充要条件.
8. D [解析] 若 $f(x) = \begin{cases} x, & x \notin \mathbf{Z} \\ 1, & x \in \mathbf{Z} \end{cases}$, 则 $a_n = 1$, 数列 $\{a_n\}$ 为周期数列, 而函数 $f(x)$ 不是周期函数. 若 $f(x) = \sin x$, 则 $a_n = f(n) = \sin n$, $f(x) = \sin x$ 为周期函数, 而数列 $\{a_n\}$ 不是周期数列. 故选 D.
9. (0, 4] [解析] 因为 $A = \{y \mid y = 3^x, x \leq 1\} = \{y \mid 0 < y \leq 3\}$, $B = \{x \mid x^2 - 6x + 8 \leq 0\} = \{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$, 所以 $A \cup B = (0, 4]$. 又因为 $\complement_{\mathbf{R}} B = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$, 所以 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (0, 2)$.
10. 3 [解析] \because 函数 $y = x^3$ 的图像与直线 $y = x$ 有 3 个交点, 且这 3 个交点的坐标分别为 $(-1, -1), (0, 0), (1, 1)$, \therefore 集合 $A \cap B$ 中有 3 个元素.
11. $\{0, 2, 4, 6\}$ [解析] 由题意知 $U = A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 由 $A \cap (\complement_U B) = \{1, 3, 5\}$, 得元素 1, 3, 5 不在集合 B 内. 若元素 0 不在集合 B 内, 则由 $A \cup B = U$, 得元素 0 在集合 A 内, 则 $0 \in A \cap (\complement_U B)$, 与题意不符, 所以元素 0 在集合 B 内, 同理可得元素 2, 4, 6 也在集合 B 内, 所以 $B = \{0, 2, 4, 6\}$.
12. 充要 [解析] 由 $2^a > 2^b > 2 \Leftrightarrow a > b > 1, \log_{\frac{1}{2}}(a-1) < \log_{\frac{1}{2}}(b-1) \Leftrightarrow a-1 > b-1 > 0 \Leftrightarrow a > b > 1$, 得“ $2^a > 2^b > 2$ ”是“ $\log_{\frac{1}{2}}(a-1) < \log_{\frac{1}{2}}(b-1)$ ”的充要条件.
13. $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ [解析] 由 $|3-2x| \leq 1$ 得 $1 \leq x \leq 2$, 故 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 由题意可知, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $a > \frac{1}{x+1}$ 恒成立, 则 $a > \left(\frac{1}{x+1}\right)_{\max}$, 故 $a > \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$, 即实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

小题 2 函数的概念与性质

1. B [解析] 由 $\begin{cases} 2-x \geq 0, \\ x-1 > 0 \end{cases}$ 得 $1 < x \leq 2$, 故 $f(x)$ 的定义域为 $(1, 2]$, 令 $1 < \frac{x}{2} \leq 2$, 得 $2 < x \leq 4$, 故 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 的定义域为 $(2, 4]$. 故选 B.
2. C [解析] $y = \cos x$ 是偶函数, 但在 $(0, +\infty)$ 上不具有单调性, 所以选项 A 不满足题意; $y = 1 - x^2$ 是偶函数, 但在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 所以选项 B 不满足题意; $y = \log_2 |x|$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以选项 C 满足题意; 令 $f(x) = e^x - e^{-x}$, 则

$f(-x) = e^{-x} - e^x = -(e^x - e^{-x}) = -f(x)$, 所以 $y = e^x - e^{-x}$ 是奇函数, 所以选项 D 不满足题意. 故选 C.

3. D [解析] 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x - \frac{1}{x}$, 此时 $f(x)$ 为增函数, 排除 A, B; 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -x - \frac{1}{x} > 0$ 恒成立, 排除 C. 故选 D.
4. D [解析] 当 $x_1 + x_2 = 2$ 时, $f(x_1) + f(x_2) = \frac{a}{1-x_1} + b \cos \frac{\pi}{2} x_1 + x_1 + \frac{a}{1-x_2} + b \cos \frac{\pi}{2} x_2 + x_2 = \frac{a}{1-x_1} + b \cos \frac{\pi}{2} x_1 + x_1 + \frac{a}{x_1-1} + b \cos \frac{\pi}{2} (2-x_1) + x_2 = x_1 + x_2 = 2$, 因为 $1 - \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 2$, 所以 $f(1 + \sqrt{2}) = 2 - f(1 - \sqrt{2}) = -1$.
5. D [解析] 根据 $f(x)$ 的图像关于坐标原点对称可知该函数为奇函数. 对于 A 选项, $f(-x) = (-x)^2 \ln |-x| = f(x)$, 故 $f(x)$ 为偶函数, 不符合题意; 对于 B 选项, $f(x) = x \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 不符合题意; 对于 C 选项, $f(x)$ 为奇函数, 但当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$ 恒成立, 不符合题意; 对于 D 选项, $f(-x) = \frac{\ln |-x|}{-x} = -f(x)$, 故 $f(x)$ 为奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时, $f(x) > 0$, 符合题意. 故选 D.
6. A [解析] $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} - \left|\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} - \frac{1}{2}\right| = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|-1} - \frac{1}{2}, & |x| > 1, \\ \frac{1}{2}, & |x| \leq 1, \end{cases}$ 故 $f(x) \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 所以 $f[f(x)] = \frac{1}{2}$, 故函数 $y = f[f(x)]$ 既是偶函数也是周期函数, 故选 A.
7. A [解析] $\because a > b > c, a + b + c = 0, \therefore a > 0, c < 0, b = -a - c, \therefore \frac{c}{a} < 0$. 由根与系数的关系可知 $x_1 + x_2 = \frac{a-b}{a} = \frac{2a+c}{a} = 2 + \frac{c}{a}, x_1 x_2 = \frac{c-b}{a} = \frac{a+2c}{a} = 1 + \frac{2c}{a}$, $\therefore (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = \left(2 + \frac{c}{a}\right)^2 - 4\left(1 + \frac{2c}{a}\right) = \left(\frac{c}{a}\right)^2 - \frac{4c}{a} = \left(\frac{c}{a} - 2\right)^2 - 4$. 由 $x_1 + x_2 = \frac{a-b}{a} > 0$ 得 $2 + \frac{c}{a} > 0$, 故 $-2 < \frac{c}{a} < 0$. 由 $x_1 x_2 = \frac{c-b}{a} < 0$ 得 $1 + \frac{2c}{a} < 0$, 即 $\frac{c}{a} < -\frac{1}{2}$, $\therefore -2 < \frac{c}{a} < -\frac{1}{2}, \therefore \left(\frac{c}{a} - 2\right)^2 - 4 \in \left(\frac{9}{4}, 12\right), \therefore |x_1 - x_2| \in \left(\frac{3}{2}, 2\sqrt{3}\right)$. 故选 A.
8. B [解析] 因为对任意的 $x \in (1, a)$, 不等式 $f(x) \geq (a-1)x$ 恒成立, 所以 $f(x) = 2|x^2 - x + a| + |x^2 - 4x + a| \geq (a-1)x$ 对任意的 $x \in (1, a)$ 恒成立, 即 $a-1 \leq 2\left|x + \frac{a}{x} - 1\right| + \left|x + \frac{a}{x} - 4\right|$ 对任意的 $x \in (1, a)$ 恒成立. 令 $g(x) = x + \frac{a}{x}$, 则由对勾函数的性质知, 当 $x \in (1, \sqrt{a})$ 时, $g(x)$ 单调递减; 当 $x \in (\sqrt{a}, a)$ 时, $g(x)$ 单调递增. 故 $g(x)$ 的最小值为 $g(\sqrt{a}) = \sqrt{a} + \frac{a}{\sqrt{a}} = 2\sqrt{a}$. 令 $t = x + \frac{a}{x}$, 则 $t \in [2\sqrt{a}, a+1)$, 其中 $a > 1$. 令 $h(t) = 2|t-1| + |t-4| = 2t-2+|t-4|$, 当 $a \geq 4$ 时, $t \geq 4, h(t) = 3t-6$, 所以 $h(t)$ 的最小值为 $6\sqrt{a}-6$, 由 $a-1 \leq 6\sqrt{a}-6$, 得 $a^2 - 26a + 25 \leq 0$, 解得 $1 \leq a \leq 25$, 此时 $4 \leq$

$a \leq 25$.

当 $3 < a < 4$ 时, $h(t) = \begin{cases} 3t-6, 4 \leq t < a+1, \\ t+2, 2\sqrt{a} \leq t < 4, \end{cases}$ 所以 $h(t)$ 的最小值为

$2\sqrt{a}+2$, 由 $a-1 \leq 2\sqrt{a}+2$, 得 $a^2-10a+9 \leq 0$, 解得 $1 \leq a \leq 9$, 此时 $3 < a < 4$.

当 $1 < a \leq 3$ 时, $t < 4$, $h(t) = t+2$, 所以 $h(t)$ 的最小值为 $2\sqrt{a}+2$, 由 $a-1 \leq 2\sqrt{a}+2$, 得 $a^2-10a+9 \leq 0$, 解得 $1 \leq a \leq 9$, 此时 $1 < a \leq 3$.

综上所述, $1 < a \leq 25$, 故选 B.

9. 2 -1 [解析] 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2+2x, x \leq 0, \\ \log_2(x+1), x > 0, \end{cases}$ 则 $f[f(-3)] =$

$f(9-6) = f(3) = \log_2 4 = 2$.

当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = x^2+2x$, $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, 0]$ 上单调递增, $\therefore f(x) \geq f(-1) = 1-2 = -1$;

当 $x > 0$ 时, $f(x) = \log_2(x+1)$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x) > \log_2 1 = 0$.

综上, 函数 $f(x)$ 的最小值为 -1 .

10. 1 $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{5}]$ [解析] 由题意知, $f(-x) = \ln(e^{-2x}+1) + mx = \ln(e^{2x}+1) - mx$,

$\therefore 2mx = \ln(e^{2x}+1) - \ln(e^{-2x}+1) = 2x$, $\therefore m = 1$.

$\therefore a^2+ab+4b^2 \leq m, a^2+4b^2 \geq 4|ab|$, 当且仅当 $|a| = 2|b|$ 时, 等号成立, $\therefore 4|ab|+ab \leq 1$, 解得 $-\frac{1}{3} \leq ab \leq \frac{1}{5}$.

11. $12-8\sqrt{2}$ [解析] 当 $\frac{a}{2} \leq 0$, 即 $a \leq 0$ 时, $f(x) = x^2 - ax \geq 0$ 在 $[0, 2]$ 上恒成立,

\therefore 当 $x \in [0, 2]$ 时, $|f(x)| = f(x)$, 又 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递增,

$\therefore |f(x)|_{\max} = f(x)_{\max} = f(2) = 2^2 - 2a = 4 - 2a$,

$\therefore k \leq 4 - 2a$ 对任意的 $a \leq 0$ 恒成立, $\therefore k \leq 4$.

当 $\frac{a}{2} \geq 2$, 即 $a \geq 4$ 时, $f(x) = x^2 - ax \leq 0$ 在 $[0, 2]$ 上恒成立,

\therefore 当 $x \in [0, 2]$ 时, $|f(x)| = -f(x)$, 又 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递减,

$\therefore |f(x)|_{\max} = -f(x)_{\min} = -f(2) = -2^2 + 2a = -4 + 2a$, $\therefore k \leq -4 + 2a$ 对任意的 $a \geq 4$ 恒成立, $\therefore k \leq 4$.

当 $0 < \frac{a}{2} < 1$, 即 $0 < a < 2$ 时, $f(x)$ 在 $[0, \frac{a}{2}]$ 上单调递减, 在 $[\frac{a}{2}, 2]$ 上单调递增, 且 $f(x) \leq 0$ 在 $[0, a]$ 上恒成立, $f(x) \geq 0$ 在 $[a, 2]$ 上恒成立,

$\therefore |f(x)|_{\max} = \max\left\{f(2), -f\left(\frac{a}{2}\right)\right\}$.

当 $-f\left(\frac{a}{2}\right) - f(2) = \frac{a^2}{4} + 2a - 4 \geq 0$, 即 $2 > a \geq -4 + 4\sqrt{2}$ 时,

$|f(x)|_{\max} = -f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}$,

$\therefore k \leq \frac{a^2}{4}$ 对任意的 $2 > a \geq -4 + 4\sqrt{2}$ 恒成立, $\therefore k \leq 12 - 8\sqrt{2}$.

当 $-f\left(\frac{a}{2}\right) - f(2) = \frac{a^2}{4} + 2a - 4 < 0$, 即 $0 < a < -4 + 4\sqrt{2}$ 时, $|f(x)|_{\max} = 4 - 2a$,

$\therefore k \leq 4 - 2a$ 对任意的 $0 < a < -4 + 4\sqrt{2}$ 恒成立, $\therefore k \leq 12 - 8\sqrt{2}$.

当 $1 \leq \frac{a}{2} < 2$, 即 $2 \leq a < 4$ 时, $|f(x)|_{\max} = -f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}$,

$\therefore k \leq \frac{a^2}{4}$ 对任意的 $2 \leq a < 4$ 恒成立, $\therefore k \leq 1$.

综上所述, $k \leq 12 - 8\sqrt{2}$, 故实数 k 的最大值为 $12 - 8\sqrt{2}$.

12. $[\frac{15}{8}, \frac{19}{10}] \cup (\frac{13}{5}, \frac{21}{8}]$ [解析] 令 $t = x + \frac{1}{x}$, 因为 $x \in [\frac{1}{2}, 2]$, 所以 $t \in [2, \frac{5}{2}]$. 令 $g(t) = |t-a|$, $t \in [2, \frac{5}{2}]$.

由已知可得 $\begin{cases} g(t)_{\max} \geq 5g(t)_{\min}, \\ g(t)_{\max} < 6g(t)_{\min}, \end{cases}$

当 $2 \leq a \leq \frac{5}{2}$ 时, $g(t)_{\min} = 0$, 不可能有 $g(t)_{\max} < 6g(t)_{\min}$,

所以 $a < 2$ 或 $a > \frac{5}{2}$.

当 $a < 2$ 时, $g(t)_{\max} = g\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2} - a$, $g(t)_{\min} = g(2) = 2 - a$,


所以 $\begin{cases} \frac{5}{2} - a \geq 5(2-a), \\ \frac{5}{2} - a < 6(2-a), \end{cases}$ 解得 $\frac{15}{8} \leq a < \frac{19}{10}$;

当 $a > \frac{5}{2}$ 时, $g(t)_{\max} = g(2) = a - 2$, $g(t)_{\min} = g\left(\frac{5}{2}\right) = a - \frac{5}{2}$,

所以 $\begin{cases} a-2 \geq 5\left(a-\frac{5}{2}\right), \\ a-2 < 6\left(a-\frac{5}{2}\right), \end{cases}$ 解得 $\frac{13}{5} < a \leq \frac{21}{8}$.

综上, $a \in \left[\frac{15}{8}, \frac{19}{10}\right) \cup \left(\frac{13}{5}, \frac{21}{8}\right]$.

13. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ [解析] 设 $y_1 = \sqrt{1-x^2}$, $x \in [0, 1]$, $y_2 = ax+b$, $f(x) = |\sqrt{1-x^2} - (ax+b)| = |y_1 - y_2|$, 作出曲线 $y_1 = \sqrt{1-x^2}$, $x \in [0, 1]$, 如图所示, 设与直线 $x+y=1$ 平行且与曲线 $y_1 = \sqrt{1-x^2}$, $x \in [0, 1]$ 相切的直线为 l , 易得直线 l 的方程为 $x+y = \sqrt{2}$. 由数形结合可知, 当 $M(a, b)$ 取到最小值时, 直线 $y_2 = ax+b$ 与直线 l 平行, 且到直线 l 与直线 $x+y=1$ 的距离相等, 此时 $a = -1$, $b = \frac{\sqrt{2}+1}{2}$, 又直线 l 与直线 $y_2 = ax+b$ 之间的距离为 $\frac{|\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}+1}{2}|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}$, 故 $M(a, b)$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}} \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$.



小题3 基本初等函数

1. C [解析] $f(-2) = \ln|-2| = \ln 2$, $f[f(-2)] = f(\ln 2) = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$.

2. B [解析] $\therefore 2^x = 7^{2y} = A$, $\therefore x = \log_2 A$, $y = \log_7 A$, 又 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$, $\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \log_A 2 + \log_A 49 = \log_A 98 = 2$, $\therefore A^2 = 98$, 又 $\therefore A > 0$, $\therefore A = 7\sqrt{2}$. 故选 B.

3. C [解析] 因为 $\log_3 3 = p$, 所以 $\lg 3 = 3p \lg 2$, 因为 $\log_5 5 = q$, 所以 $\lg 5 = q \lg 3$, 所以 $\lg 5 = 3pq \lg 2 = 3pq(1 - \lg 5)$, 所以 $\lg 5 = \frac{3pq}{1+3pq}$, 故选 C.

4. B [解析] 由 $\log_a 2 < 0$, $\log_b 2 < 0$ 得 $0 < a < 1$, $0 < b < 1$, 由 $\log_a 2 < \log_b 2$ 得 $a > b$, 所以 $0 < b < a < 1$, 故选 B.

5. B [解析] 由函数 $f(x) = \log_a x$ 是增函数知 $a > 1$. $f(|x|+1) = \log_a(|x|+1) = \begin{cases} \log_a(x+1), x \geq 0, \\ \log_a[-(x-1)], x < 0, \end{cases}$ 结合对数函数的图像知选 B.

6. A [解析] $f_3(x) = \log_2 x^2$ 是偶函数, 而其他函数的图像无论怎样平移都得不到偶函数的图像, 故其他函数的图像经过平移后不可能与 $f_3(x)$ 的图像重合, 故排除选项 B, D; $f_4(x) = \log_2(2x) = 1 + \log_2 x$, 将 $f_2(x) = \log_2(x+2)$ 的图像沿 x 轴向右平移 2 个单位长度, 得到 $y = \log_2 x$ 的图像, 再沿 y 轴向上平移 1 个单位长度, 即可得到 $f_4(x) = \log_2(2x) = 1 + \log_2 x$ 的图像, 根据“同形”函数的定义可知选项 A 正确.

7. C [解析] 显然有 $a > 0$, $b > 0$, 排除 A, D; 设 $\frac{a}{b} = t$, 则 $a = bt$. 若 $\ln a - \ln b = a - 3b$, 则 $\ln t = bt - 3b$, 故 $b = \frac{\ln t}{t-3}$, 由 $b = \frac{\ln t}{t-3} > 0$, 得 $0 < t < 1$ 或 $t > 3$, 不能确定 $a < b$, 排除 B; 若 $\ln a - \ln b = 3b - a$, 则 $\ln t = 3b - bt$, 故 $b = \frac{\ln t}{3-t}$,

由 $b = \frac{\ln t}{3-t} > 0$, 得 $1 < t < 3$, 即 $3 > \frac{a}{b} > 1$, 所以 $a > b$, 故 C 正确. 故选 C.

8. B 【解析】 $\log_{2017} 2018 = \frac{\ln 2018}{\ln 2017}$, $\log_{2018} 2019 = \frac{\ln 2019}{\ln 2018}$, 要比较 $\log_{2017} 2018, \log_{2018} 2019$ 的大小, 只需要比较 $(\ln 2018)^2$ 与 $\ln 2017 \ln 2019$ 的大小. 因为 $\ln 2017 \ln 2019 < \left(\frac{\ln 2017 + \ln 2019}{2}\right)^2 = \left[\frac{\ln (2018^2 - 1)}{2}\right]^2 < \left(\frac{\ln 2018^2}{2}\right)^2 = (\ln 2018)^2$,

所以 $\log_{2017} 2018 = \frac{\ln 2018}{\ln 2017} > \frac{\ln 2019}{\ln 2018} = \log_{2018} 2019$.

要比较 $\frac{2019}{2018}, \log_{2018} 2019 = \frac{\ln 2019}{\ln 2018}$ 的大小, 只需要比较 $\frac{\ln 2018}{2018}, \frac{\ln 2019}{2019}$ 的大小.

构造函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $\frac{\ln 2018}{2018} > \frac{\ln 2019}{2019}$, 即 $\frac{2019}{2018} > \log_{2018} 2019$.

要比较 $\frac{2019}{2018}, \log_{2017} 2018 = \frac{\ln 2018}{\ln 2017}$ 的大小, 只需要比较 $\frac{\ln 2017}{2018}, \frac{\ln 2018}{2019}$ 的大小.

构造函数 $g(x) = \frac{\ln x}{x+1}$, 则 $g'(x) = \frac{1 + \frac{1}{x} - \ln x}{(x+1)^2}$,

令 $h(x) = 1 + \frac{1}{x} - \ln x$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$, 所以 $h(x)$ 在定义域上单调递减,

当 $x \geq 2017$ 时, $h(x) = 1 + \frac{1}{x} - \ln x \leq h(2017) < 0$,

所以 $g(x) = \frac{\ln x}{x+1}$ 在 $[2017, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $\frac{\ln 2017}{2018} > \frac{\ln 2018}{2019}$, 即 $\frac{2019}{2018} > \log_{2017} 2018$.

综上, $\log_{2018} 2019 < \log_{2017} 2018 < \frac{2019}{2018}$, 故选 B.

9. 1 【解析】设 $\log_2 a = \log_5 b = \lg(a+b) = k$, 则 $a = 2^k, b = 5^k, a+b = 10^k$, 所以 $ab = 2^k \times 5^k = 10^k$, 所以 $a+b = ab$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = 1$.

10. 3 1 【解析】因为 $a > b > 1$, 所以 $\log_a a > 1$, 则由 $\log_a b + \log_a a^2 = \frac{1}{\log_a a} + 2 \log_a a = \frac{19}{3}$, 得 $\log_a a = 3$, 即 $b^3 = a$, 则 $\frac{a}{b^3} = 1$.

11. $\left(1, \frac{8}{3}\right)$ 【解析】当 $a > 1$ 时, $f(x) = \log_a(8-ax)$ 在 $[1, 2]$ 上是减函数,

若 $f(x) > 1$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 则 $8-2a > 0$ 且 $f(x)_{\min} = \log_a(8-2a) > 1$, 解得 $1 < a < \frac{8}{3}$.


当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上是增函数,

若 $f(x) > 1$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 则 $8-2a > 0$ 且 $f(x)_{\min} = \log_a(8-a) > 1$, 即 $8-2a > 0$ 且 $8-a < a$, 无解.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\left(1, \frac{8}{3}\right)$.


12. 1 【解析】 $\frac{1}{e^{3y}} - 27y^3 - 3y + 1 = 0$ 等价于 $e^{-3y} + (-3y)^3 + (-3y) + 1 = 0$, 又 $e^x + x^3 + x + 1 = 0$, 所以 $x = -3y$, 即 $x + 3y = 0$, 所以 $e^{x+3y} = e^0 = 1$.

13. $\ln 2 + \frac{9}{2}$ 【解析】由题意可得 $g(x) = f(x-3) + 2 = e^{1-x-3} + 2$, 在同一直角坐标系中分别作出 $g(x), h(x)$ 的图像, 如图所示, 由图可知, 当 $3 \leq x \leq 5$ 时, $h(x) > g(x)$, 当 $x > 5$ 时, 若 $h(x) \geq g(x)$, 则 $4e^{6-x} + 2 \geq e^{x-3} + 2$, 即 $4 \geq e^{2x-9}$, 解得 $x \leq \ln 2 + \frac{9}{2}$, 因此, 若对任意的 $x \in [3, \lambda] (\lambda > 3)$, 都有 $h(x) \geq g(x)$, 则实数 λ 的最大值为 $\ln 2 + \frac{9}{2}$.



小题 4 函数的图像与方程

1. C 【解析】 $f(-x) = |-x| \sin(-2x) = -|x| \sin 2x = -f(x)$, 故 $f(x)$ 是奇函数, 其图像关于原点对称, 排除 B, D; 当 $x = \pi$ 时, $f(\pi) = \pi \sin 2\pi = 0$, 排除 A. 故选 C.
2. C 【解析】当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, 原方程可化为 $x^2 + y^2 = -1$, 无解; 当 $x < 0, y > 0$ 时, 原方程可化为 $x^2 - y^2 = 1$; 当 $x \leq 0, y \leq 0$ 时, 原方程可化为 $x^2 + y^2 = 1$; 当 $x > 0, y < 0$ 时, 原方程可化为 $y^2 - x^2 = 1$. 作出函数 $y=f(x)$ 的图像, 如图所示.



由图像可知, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减, 所以①正确; 由 $F(x) = 0$ 得 $f(x) = -x$, 又直线 $y = -x$ 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 和 $y^2 - x^2 = 1$ 的渐近线, 所以 $F(x)$ 无零点, 所以②错误; $y = f(|x|)$ 为偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $y = f(|x|)$ 的图像与 $y = f(x)$ 的图像重合, 易得 $y = f(|x|)$ 的最大值为 -1 , 所以③错误; 曲线 $h(x, y) = 0$ 关于原点对称的曲线的方程为 $h(-x, -y) = 0$, 又 $y = g(x)$ 与 $y = f(x)$ 的图像关于原点对称, 所以 $y = g(x)$ 的图像由方程 $x|x| + y|y| = 1$ 确定, 所以④正确. 故选 C.


3. A 【解析】记 $g(x) = \frac{1-3^x}{1+3^x}$, 则 $g(-x) = \frac{1-3^{-x}}{1+3^{-x}} = \frac{3^x-1}{3^x+1} = -\frac{1-3^x}{1+3^x} = -g(x)$.

对于 A, B, 图像关于 y 轴对称, 所以 $f(x)$ 是偶函数, 则有 $\alpha = \frac{\pi}{2}$,

$f(x) = -\frac{1-3^x}{1+3^x} \sin 2x$, 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f(x) > 0$, 所以 A 不可能, B 有可能.

对于 C, D, 图像关于原点对称, 所以 $f(x)$ 是奇函数, 则有 $\alpha = 0$ 或 π , $f(x) = \frac{1-3^x}{1+3^x} \cos 2x$ 或 $f(x) = -\frac{1-3^x}{1+3^x} \cos 2x$, 故 C, D 都有可能. 故选 A.

4. D 【解析】 $\because f(x) = xe^{2x}, \therefore f'(x) = (1+2x)e^{2x}$, 令 $f'(x) > 0$ 得 $x > -\frac{1}{2}$, 令 $f'(x) < 0$ 得 $x < -\frac{1}{2}$, 故当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 取得极小值, 也是最小值, 且 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e}$, 作出函数 $f(x)$ 的图像, 如图所示.



结合图像分析, 对于 A, 当 $m \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 的图像与直线 $y =$

m 只有一个交点, 此时函数 $y=f(x)-m$ 只有一个零点, 因此 A 不正确;

对于 B, 存在实数 k , 使得方程 $f(x)=k(x+2)$ 有一正一负两个根, 但不可能有两个负实数根, 因此 B 不正确;


对于 C, 若 $f(a)=f(b)(a \neq b)$, 则 $a+b < -1$, 因此 C 不正确;

对于 D, 若 $f(a)=f(b)(a \neq b)$, 不妨设 $a < -\frac{1}{2} < b < 0$, 则 $e^{2a} + e^{2b} < 1 + e^{-1}$, 因此 D 正确. 故选 D.

5. C [解析] 易知 $a \neq 0$. $\therefore a+b+3c=0, \therefore f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{a}{9}+\frac{b}{3}+c=\frac{1}{9}(a+3b+9c)=-\frac{2}{9}a$. $\therefore f(m)=f(n)=0, f(x)=ax^2+bx+c, \therefore f(x)=a(x-m)(x-n), \therefore f\left(\frac{1}{3}\right)=a\left(\frac{1}{3}-m\right)\left(\frac{1}{3}-n\right)=-\frac{2}{9}a, \therefore \left(\frac{1}{3}-m\right)\left(\frac{1}{3}-n\right)=-\frac{2}{9}$, 不妨设 $m < \frac{1}{3} < n$, 则 $\frac{2}{9}=\left(\frac{1}{3}-m\right)\left(n-\frac{1}{3}\right) \leq \left[\frac{\left(\frac{1}{3}-m\right)+\left(n-\frac{1}{3}\right)}{2}\right]^2=\frac{(m-n)^2}{4}, \therefore |m-n| \geq \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 当且仅当 $m=\frac{1-\sqrt{2}}{3}, n=\frac{1+\sqrt{2}}{3}$ 时, 等号成立, 故 $|m-n|$ 的最小值为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故选 C.

6. D [解析] 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $-\ln x < 0, f(x)=\min\left\{x^2+ax-\frac{1}{4}, -\ln x\right\} \leq -\ln x < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上无零点. 当 $x=1$ 时, $f(1)=\min\left\{a+\frac{3}{4}, 0\right\}$, 若 $a \geq -\frac{3}{4}$, 则 $f(1)=0, x=1$ 是 $f(x)$ 的零点; 若 $a < -\frac{3}{4}$, 则 $f(1)=a+\frac{3}{4} < 0, x=1$ 不是 $f(x)$ 的零点. 当 $x \in (0, 1)$ 时, $-\ln x > 0$. 令 $g(x)=x^2+ax-\frac{1}{4}$, 只需考虑 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上的零点个数. 当 $-\frac{a}{2} \leq 0$, 即 $a \geq 0$ 时, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 故 $-\frac{1}{4} < g(x) < a+\frac{3}{4}$, 故 $g(x)$ 有 1 个零点; 当 $0 < -\frac{a}{2} < 1$, 即 $-2 < a < 0$ 时, $g(x)$ 在 $\left(0, -\frac{a}{2}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(-\frac{a}{2}, 1\right)$ 上单调递增, 故在 $(0, 1)$ 上, $g(x)_{\min}=g\left(-\frac{a}{2}\right)=-\frac{a^2}{4}-\frac{1}{4} < 0, g(0)=-\frac{1}{4} < 0, g(1)=a+\frac{3}{4}$, 令 $g(1) > 0$ 得 $a > -\frac{3}{4}$, 故当 $-\frac{3}{4} < a < 0$ 时, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有 1 个零点, 当 $-2 < a \leq -\frac{3}{4}$ 时, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上无零点; 当 $-\frac{a}{2} \geq 1$, 即 $a \leq -2$ 时, $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $g(x) < g(0)=-\frac{1}{4}$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立, 此时 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上无零点. 综上, 当 $a > -\frac{3}{4}$ 时, $f(x)$ 有 2 个零点; 当 $a = -\frac{3}{4}$ 时, $f(x)$ 有 1 个零点; 当 $a < -\frac{3}{4}$ 时, $f(x)$ 无零点. 故选 D.

7. B [解析] 若 $f(x)=x^2+ax+b$ 在 $(0, 2)$ 上有两个不同的零点, 则 $\begin{cases} f(0) > 0, \\ f(2) > 0, \\ \Delta > 0, \\ 0 < -\frac{a}{2} < 2, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} b > 0, \\ 2a+b+4 > 0, \\ a^2-4b > 0, \\ -4 < a < 0, \end{cases}$ 作出不等式组表示的平面区域, 如图中阴影部分所示, 易知直线 $2a+b+4=0$ 与曲线 $a^2-4b=0$ 相切于点 $(-4, 4)$, 令 $z=3a+b$, 由图可知 $-8 < z < 0$, 故 $3a+b$ 的取值范围为 $(-8, 0)$.



8. D [解析] $f(x)=x^2-\frac{\ln|x|}{x}=\begin{cases} x^2-\frac{\ln x}{x}, & x>0, \\ x^2-\frac{\ln(-x)}{x}, & x<0. \end{cases}$

当 $x < 0$ 时, $f'(x)=2x-\frac{1-\ln(-x)}{x^2}=\frac{2x^3-1+\ln(-x)}{x^2}$.

令 $g(x)=2x^3-1+\ln(-x)$,

由 $g'(x)=6x^2+\frac{1}{x}=\frac{6x^3+1}{x}=0$, 得 $x=-\sqrt[3]{\frac{1}{6}}$,

当 $x \in \left(-\infty, -\sqrt[3]{\frac{1}{6}}\right)$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $x \in \left(-\sqrt[3]{\frac{1}{6}}, 0\right)$ 时, $g'(x) < 0$,

所以 $g(x)$ 有极大值 $g\left(-\sqrt[3]{\frac{1}{6}}\right)=2 \times \left(-\sqrt[3]{\frac{1}{6}}\right)^3-1+\ln\sqrt[3]{\frac{1}{6}}=-\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\ln 6 < 0$,

又 $x^2 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 恒成立,

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上为减函数.

当 $x > 0$ 时, $f'(x)=2x-\frac{1-\ln x}{x^2}=\frac{2x^3-1+\ln x}{x^2}$.

令 $h(x)=2x^3-1+\ln x$, 则 $h'(x)=6x^2+\frac{1}{x} > 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 又 $h(1)=1 > 0, h\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{4}-\ln 2 < 0, x^2 > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点, 则

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个极值点.

综上, 函数 $f(x)$ 的大致图像为 D 中的图像. 故选 D.

9. 0 e [解析] 因为 $f(x)=\begin{cases} \tan \frac{\pi}{2}(x-1), & 0 < x \leq 1, \\ \ln x, & x > 1, \end{cases}$ 所以 $f(e)=\ln e=1$, 则 $f[f(e)]=f(1)=\tan 0=0$.

若 $0 < x \leq 1$, 由 $f(x)=1$ 得 $\tan \frac{\pi}{2}(x-1)=1$, 无解;

若 $x > 1$, 由 $f(x)=1$ 得 $\ln x=1$, 解得 $x=e$.

10. 4 [2, 4] [解析] $f[f(-1)]=f(2)=-4+8=4$.

由 $a < b < c$, 且 $f(a)=f(b)=f(c)$, 结合函数 $f(x)$ 的图像(图略)知 $-2 < a \leq 0 < b < 2 < c$, 且 $b+c=4$,


所以 $a+b+c=a+4 \in (2, 4]$.

11. (1, 3] [解析] 当 $0 < x \leq 2$ 时, $-2 < x-2 \leq 0$,

$\therefore f(x)=\frac{1}{2}f(x-2)=\frac{1}{2}(2+x-2)=\frac{1}{2}x$.

当 $2 < x \leq 4$ 时, $0 < x-2 \leq 2, \therefore f(x)=\frac{1}{2}f(x-2)=\frac{1}{4}(x-2)$.

作出函数 $y=f(x)$ 的图像, 如图所示.



\therefore 函数 $y=f(x)-\log_2(a-x)$ 恰有两个零点,

$\therefore y=f(x)$ 与 $y=\log_2(a-x)$ 的图像在 $[-2, 4]$ 上有两个交点.


又 $y=\log_2(a-x)$ 是减函数, 且 $y=\log_2(a-x)$ 的图像与 x 轴的交点的横坐标为 $a-1$,

$\therefore \begin{cases} 0 < \log_2 a \leq 2, \\ \log_2(a-2) > 1, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \log_2 a > 2, \\ 0 < \log_2(a-2) \leq 1, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 0 < a-1 \leq 2 \\ \log_2(a-4) \leq \frac{1}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \log_2(a-4) \leq \frac{1}{2} \\ \log_2(a-4) \leq \frac{1}{2} \end{cases}$,


解得 $1 < a \leq 3$.

12. $a < -1$ 或 $a > 1$ [解析] 函数 $f(x)=|x^3-4x|+ax-2$ 恰有 2 个零点, 等价于函数 $y=|x^3-4x|$ 与 $y=2-ax$ 的图像有 2 个不同的交点. 易知直线 $y=2-ax$ 过定点 $(0, 2)$. 作出函数 $y=|x^3-4x|$ 的图像与直线 $y=2-ax$, 如图所示, 当直线 $y=2-ax$ 与曲线 $y=-x^3+4x, x \in [0, 2]$ 相切时, 设切点坐标为 $(x_0, -x_0^3+4x_0)$, 则切线方程为 $y-(-x_0^3+4x_0)=(-3x_0^2+4)(x-x_0)$, 又该直线经过点 $(0, 2)$, 代入上式, 解得 $x_0=1$, 故切点坐标为 $(1, 3)$, 由 $3=2-a$ 得 $a=-1$. 同理, 当直线 $y=2-ax$ 与曲线 $y=$

$x^3-4x, x \in [-2, 0]$ 相切时, 可得 $a=1$. 由图可知, 若直线 $y=2-ax$ 与 $y=|x^3-4x|$ 的图像有 2 个不同的交点, 则实数 a 的取值范围为 $a < -1$ 或 $a > 1$.



13. $\left(\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right)$ [解析] 令 $t = |2^x - 1| (x \neq 0)$, 则方程 $f(|2^x - 1|) - k\left(\frac{2}{|2^x - 1|} - 3\right) = 0$ 可化为方程 $f(t) - k\left(\frac{2}{t} - 3\right) = 0$, 作出函数 $y = |2^x - 1| (x \neq 0)$ 的大致图像如图所示, 结合图像分析可知, 关于 x 的方程 $f(|2^x - 1|) - k\left(\frac{2}{|2^x - 1|} - 3\right) = 0$ 有四个不同的实数解等价于关于 t 的方程 $f(t) - k\left(\frac{2}{t} - 3\right) = 0$ 在 $(0, 1)$ 上有两个不同的实数解. $f(t) - k\left(\frac{2}{t} - 3\right) = 0$ 可化为 $t^2 + (3k-2)t + 1 - 2k = 0$, 记 $g(x) = x^2 + (3k-2)x + 1 - 2k$, 则原问题等价于 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有两个不同的零点,
- $$\Delta = (3k-2)^2 - 4(1-2k) = 9k^2 - 4k > 0,$$
- 所以 $\begin{cases} 0 < -\frac{3k-2}{2} < 1, \\ g(0) = 1-2k > 0, \\ g(1) = 1+3k-2+1-2k = k > 0, \end{cases}$
- 解得 $\frac{4}{9} < k < \frac{1}{2}$,
- 所以实数 k 的取值范围为 $\left(\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right)$.



小题 5 导数的几何意义与运算

1. C [解析] 依题意得 $f'(x) = 2x(x-t) + (x^2-4) = 3x^2 - 2tx - 4$, 所以 $f'(-1) = 3+2t-4=0$, 得 $t = \frac{1}{2}$, 故选 C.
2. C [解析] 因为 $f(x) = e^x + 2\sin x$, 所以 $f'(x) = e^x + 2\cos x$, 所以 $f'(0) = 3, f(0) = 1$. 由导数的几何意义可知, 函数 $f(x)$ 的图像在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y-1=3x$, 即 $3x-y+1=0$, 故选 C.
3. C [解析] 函数 $y = \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $y' = \frac{1}{x}$, 设切点坐标为 $(x_0, \ln x_0)$, 则 $y'|_{x=x_0} = \frac{1}{x_0}$, 切线方程为 $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$, 因为切线过点 $(0, 0)$, 所以 $-\ln x_0 = -1$, 解得 $x_0 = e$, 故此切线的斜率为 $\frac{1}{e}$.
4. C [解析] 由 $y = x^3 - x$ 得 $y' = 3x^2 - 1$. 设切点坐标为 (x_0, y_0) , 则由题意得 $\begin{cases} 3x_0^2 - 1 = a \text{ ①,} \\ x_0^3 - x_0 = ax_0 + 2 \text{ ②,} \end{cases}$ 将①代入②, 消去 a 得 $x_0^3 - x_0 = (3x_0^2 - 1)x_0 + 2$, 解得 $x_0 = -1$, 则 $a = 2$, 故选 C.
5. C [解析] 由题图可知, 当 $0 < x < 1$ 时, $xf'(x) < 0$, 所以 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x > 1$ 时, $xf'(x) > 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增, 所以当 $x=1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极小值. 当 $x < -1$ 时, $xf'(x) < 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增; 当 $-1 < x < 0$ 时, $xf'(x) > 0$, 所以 $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减. 所以当 $x = -1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极大值. 故选 C.
6. D [解析] 因为 $f'(x) = ax^2 + ax + 1$, 所以当 $a < 0$ 时, 判别式 $\Delta = a^2 - 4a > 0$, $f(x)$ 的图像可能是选项 C 中图像. 当 $a > 0$ 时, 若

- 判别式 $\Delta = a^2 - 4a > 0$, 则 $f(x)$ 的图像可能是选项 B 中图像; 若判别式 $\Delta = a^2 - 4a \leq 0$, 则 $f(x)$ 的图像可能是选项 A 中图像. 当 $a = 0$ 时, $f(x) = x$, 所以 $f(x)$ 的图像不可能是选项 D 中图像. 故选 D.
7. D [解析] 令 $f(x) = x^2$, 则 $f'(x) = 2x$, 所以直线 l 的方程为 $y = 2x_0(x - x_0) + x_0^2 = 2x_0x - x_0^2$. 因为 l 也与函数 $y = \ln x, x \in (0, 1)$ 的图像相切, $y' = \frac{1}{x}$, 设切点坐标为 $(x_1, \ln x_1)$, $0 < x_1 < 1$, 所以 l 的方程为 $y = \frac{1}{x_1}x + \ln x_1 - 1$, 故有 $\begin{cases} 2x_0 = \frac{1}{x_1}, \\ 1 - \ln x_1 = x_0^2, \end{cases}$ 所以 $1 + \ln(2x_0) = x_0^2$, 因为 $0 < x_1 < 1$, 所以 $2x_0 > 1$ 且 $x_0^2 > 1$, 所以 $x_0 \in (1, +\infty)$. 令 $g(x) = x^2 - \ln(2x) - 1, x \in (1, +\infty)$, 则该函数的零点就是 x_0 , 因为 $g'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 又 $g(1) = -\ln 2 < 0, g(\sqrt{2}) = 1 - \ln 2\sqrt{2} < 0, g(\sqrt{3}) = 2 - \ln 2\sqrt{3} > 0$, 所以 $\sqrt{2} < x_0 < \sqrt{3}$. 故选 D.
8. D [解析] 对于 A, 若 $f(x) = \sin x$, 则 $f'(x) = \cos x$, 所以 $|f(x) + f'(x)| = |\sin x + \cos x| = \sqrt{2} \left| \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \right| \leq \sqrt{2} < 2$; 对于 B, 若 $f(x) = e^{-x}$, 则 $f'(x) = -e^{-x}$, 所以 $|f(x) + f'(x)| = |e^{-x} + (-e^{-x})| = 0 < 2$; 对于 C, 若 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, 则 $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$, 所以 $|f(x) + f'(x)| = \left| \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} \right| = \left| \frac{(x-1)^2}{(x^2 + 1)^2} \right| = \left(\frac{x-1}{x^2 + 1} \right)^2$, 设 $y = \frac{x-1}{x^2 + 1}$, 则 $yx^2 - x + y + 1 = 0$, 所以 $\Delta = 1 - 4y(y+1) \geq 0$, 解得 $-\frac{1+\sqrt{2}}{2} \leq y \leq \frac{-1+\sqrt{2}}{2}$, 所以 $0 \leq y^2 \leq \frac{3+2\sqrt{2}}{4} < 2$, 即 $|f(x) + f'(x)| < 2$; 对于 D, 若 $f(x) = \frac{5x}{x^2 + 1}$, 则 $f'(x) = \frac{5(x^2 + 1) - 5x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{5(1-x^2)}{(x^2 + 1)^2}$, 所以 $|f(x) + f'(x)| = \left| \frac{5x}{x^2 + 1} + \frac{5(1-x^2)}{(x^2 + 1)^2} \right|$, 当 $x = 0$ 时, $|f(0) + f'(0)| = |0 + 5| = 5 > 2$, 故 $f(x)$ 的解析式不可能是 D 中解析式. 故选 D.
9. 2 [解析] 设切点坐标为 $(m, n) (m > 0)$, 由 $y = \frac{1}{4}x^2 - 3\ln x$ 得 $y' = \frac{1}{2}x - \frac{3}{x}$, 可得切线的斜率为 $\frac{1}{2}m - \frac{3}{m} = -\frac{1}{2}$, 故 $m = 2$.
10. $(-\infty, 0)$ $x + y - 1 = 0$ [解析] 由题意得 $y' = -e^{-x} \in (-\infty, 0)$, 即曲线 $y = e^{-x}$ 上各点处的切线斜率的取值范围为 $(-\infty, 0)$. 当 $x = 0$ 时, $y' = -e^{-0} = -1$, 则曲线 $y = e^{-x}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -1 , 所以切线的方程为 $y - 1 = -1 \cdot (x - 0)$, 即 $x + y - 1 = 0$.
11. ①②③ [解析] ①中, $f'(x) = \cos x - \sin x, f''(x) = -\sin x - \cos x = -\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) < 0$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立, 故①中函数在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上是凸函数; ②中, $f'(x) = \frac{1}{x} - 2(x > 0), f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立, 故②中函数在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上是凸函数; ③中, $f'(x) = -3x^2 + 2, f''(x) = -6x < 0$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立, 故③中函数在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上是凸函数; ④中, $f'(x) = e^x + xe^x, f''(x) = 2e^x + xe^x = e^x(x+2) > 0$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒成立, 故④中函数不是凸函数. 故填①②③.
12. -2 $-2x + y + 1 = 0$ [解析] $f'(x) = ae^x + 2x, g'(x) = -\pi \sin \pi x + b, f(0) = a, g(1) = \cos \pi + b = b - 1, f'(0) = a, g'(1) = b$, 由题意可得 $f'(0) = g'(1)$, 则 $a = b$, 又 $f'(0) = \frac{b-1-a}{1-0} = a$, 所以 $a = b = -1$, 所以 $a + b = -2$, 所以直线 l 的方程为 $x + y + 1 = 0$.
13. 2 [解析] 方法一: 设 $x_2 = \ln x_3, x_3 > 0$, 则 $(x_1 - e^{x_3})^2 + (x_2 - e^{x_3})^2 = (x_1 - x_3)^2 + (e^{x_3} - \ln x_3)^2$, 其几何意义为动点 (x_1, e^{x_3}) 与 $(x_3, \ln x_3)$ 之间的距离的平方, 原问题转化为求曲线 $y = e^x$ 上的点与曲线 $y = \ln x (x > 0)$ 上的点的最小距离的平方. 因为两曲线关于直线 $y = x$ 对称, 曲线 $y = e^x$ 上平行于直线 $y = x$ 的切线的方程为 $y = x + 1$, 曲线 $y = \ln x (x > 0)$ 上平行于直线 $y = x$ 的切线

的方程为 $y=x-1$, 两条切线之间的距离为 $\sqrt{2}$, 故 $(x_1 - e^x)^2 + (x_2 - e^x)^2$ 的最小值是 2.

方法二: 由基本不等式得 $(x_1 - e^x)^2 + (x_2 - e^x)^2 \geq 2\left(\frac{x_1 - e^x + x_2 - e^x}{2}\right)^2 = \frac{(e^x - x_1 + e^x - x_2)^2}{2}$ (当且仅当 $x_1 - e^x = x_2 - e^x$, 即 $x_1 = x_2$ 时等号成立). 令 $f(x) = e^x - x - 1$, 则 $f'(x) = e^x - 1$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)_{\min} = f(0) = 0$, 则 $e^x - x \geq 1 (x \in \mathbf{R})$, 即 $\frac{(e^x - x_1 + e^x - x_2)^2}{2} \geq \frac{(1+1)^2}{2} = 2$, 当且仅当 $x_1 = x_2 = 0$ 时取等号, 故 $(x_1 - e^x)^2 + (x_2 - e^x)^2$ 的最小值是 2.

小题 6 函数与导数、导数的简单应用

1. D [解析] 由题意得 $f'(x) = (x+1)e^x$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = -1$, 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (-1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $x = -1$ 为 $f(x)$ 的极小值点, $f(x)$ 无极大值点. 故选 D.

2. D [解析] 根据 $0 < x < 1$ 得到 $0 < x^2 < x < 1$, 而 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $0 < x < 1$ 时, 由 $1 - \ln x > 0$, 可得 $f'(x) > 0$, 即函数 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(x^2) < f(x) < f(1) = 0$, 又 $[f(x)]^2 = \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2 > 0$, 所以 $f(x^2) < f(x) < [f(x)]^2$, 故选 D.

3. B [解析] 由题可知, 当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0$; 当 $x = 0$ 时, $f(x) = 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x = 1$ 时, $f(x) = 0$; 当 $1 < x < 2$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x = 2$ 时, $f(x) = 0$; 当 $2 < x < 3$ 时, $f(x) > 0$; 当 $x = 3$ 时, $f(x) = 0$; 当 $x > 3$ 时, $f(x) > 0$. 故易知函数 $f(x)$ 的一个极大值点为 $x = 1$.

4. A [解析] 因为关于 x 的不等式 $x^3 - 3x^2 - ax + a + 2 \leq 0$ 在 $(-\infty, 1]$ 上恒成立, 所以 $a(x-1) \geq x^3 - 3x^2 + 2 = (x-1)(x^2 - 2x - 2)$ 在 $(-\infty, 1]$ 上恒成立.

当 $x = 1$ 时, $1 - 3 - a + a + 2 = 0 \leq 0$ 成立;

当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, 所以 $a \leq x^2 - 2x - 2$ 恒成立,

因为 $y = x^2 - 2x - 2 = (x-1)^2 - 3 > -3$, $x \in (-\infty, 1)$, 所以 $a \leq -3$. 故选 A.

5. A [解析] 因为函数 $f(x) = (2x-1)e^x + ax^2 - 3a$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

所以 $f'(x) = 2e^x + (2x-1)e^x + 2ax = (2x+1)e^x + 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $a \geq \frac{-(2x+1)e^x}{2x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

设 $g(x) = \frac{-(2x+1)e^x}{2x} (x > 0)$,

则 $g'(x) = \frac{-[2e^x + (2x+1)e^x] \cdot 2x - [- (2x+1)e^x] \cdot 2}{(2x)^2} = \frac{(-2x^2 - x + 1)e^x}{2x^2}$,

令 $g'(x) > 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{2}$, 可知函数 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上单调递增,

令 $g'(x) < 0$, 得 $x > \frac{1}{2}$, 可知函数 $g(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递减, 则 $g(x)_{\max} = g(\frac{1}{2}) = -2e^{\frac{1}{2}}$, 即 a 的取值范围是 $[-2\sqrt{e}, +\infty)$, 故选 A.

6. A [解析] $\because \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{\lambda}{x}} \leq \frac{1}{27}, \therefore x^{\frac{\lambda}{x}} \geq 27, \therefore \frac{\lambda}{x} \ln x \geq 3 \ln 3$,

$\because x \in \mathbf{N}^*, \therefore \lambda > 0$, 由题意知 $\frac{\ln x}{x} \geq \frac{3 \ln 3}{\lambda}$ 有正整数解.

令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减.

$\because f(2) = \frac{\ln 2}{2} = \frac{\ln 8}{6}, f(3) = \frac{\ln 3}{3} = \frac{\ln 9}{6}, \therefore f(2) < f(3)$,

$\therefore \frac{3 \ln 3}{\lambda} \leq f(3)$, 得 $\lambda \geq 9$, 故 λ 的最小值为 9.

7. C [解析] 令函数 $f(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x, x > 0$, 则 $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2} \geq 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增,

由 $f(1) = 0$, 可得 $f(x) < 0$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立, $f(x) > 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立.

上恒成立.

取 $x = \sqrt{a}$, 则 $f(\sqrt{a}) = \sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} - 2 \ln \sqrt{a} = \sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} - \ln a = \ln b - \ln a$.

当 $0 < \sqrt{a} < 1$ 时, $f(\sqrt{a}) < 0$, 即 $\ln b - \ln a < 0$, 所以 $b < a$;

当 $\sqrt{a} > 1$ 时, $f(\sqrt{a}) > 0$, 即 $\ln b - \ln a > 0$, 所以 $b > a$.

又当 $0 < \sqrt{a} < 1$ 时, $\ln b < \ln a < 0$, 所以 $\frac{\ln b}{\ln a} > 1$, 由换底公式可得 $\log_a b > 1$;

当 $\sqrt{a} > 1$ 时, $\ln b > \ln a > 0$, 所以 $\frac{\ln b}{\ln a} > 1$, 由换底公式可得 $\log_a b > 1$.

1. 故选 C.

8. A [解析] 由题意知 $f(-x) = f(x)$.

因为当 $x \geq 0$ 时, 恒有 $\frac{x}{2} f'(x) + f(-x) \leq 0$ 成立, 所以 $x^2 f'(x) + 2xf(x) \leq 0$,

又因为 $g(x) = x^2 f(x)$, 所以 $g'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x) \leq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为减函数.

因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $g(x)$ 为偶函数, 所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上为增函数,

又因为 $g(x) < g(1-2x)$, 所以 $|x| > |1-2x|$, 所以 $x^2 > (1-2x)^2$, 整理得 $(x-1)(3x-1) < 0$, 解得 $\frac{1}{3} < x < 1$, 故选 A.

9. $(-3, -2) \cup (-1, 0)$ [解析] 由 $f(x) = x^2 e^x$ 得 $f'(x) = 2xe^x + x^2 e^x = xe^x(x+2)$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$ 或 $x = -2$.

\therefore 函数 $f(x)$ 在 $(-2, 0)$ 上单调递减, 在 $(-\infty, -2), (0, +\infty)$ 上单调递增.

\therefore 函数 $f(x) = x^2 e^x$ 在区间 $[t, t+1]$ 上不单调,

$\therefore t < -2 < t+1$ 或 $t < 0 < t+1$, $\therefore -3 < t < -2$ 或 $-1 < t < 0$, 故实数 t 的取值范围是 $(-3, -2) \cup (-1, 0)$.

10. $(-\infty, 2 \ln 2 - 2)$ [解析] \because 函数 $f(x) = x^2 - e^x - ax$ 在 \mathbf{R} 上存在单调递增区间,

$\therefore f'(x) = 2x - e^x - a > 0$ 有解, 即 $a < 2x - e^x$ 有解.

设 $g(x) = 2x - e^x$, 则 $g'(x) = 2 - e^x$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \ln 2$, 则当 $x < \ln 2$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 当 $x > \ln 2$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

\therefore 当 $x = \ln 2$ 时, $g(x)$ 取得最大值, 且 $g(x)_{\max} = g(\ln 2) = 2 \ln 2 - 2$, $\therefore a < 2 \ln 2 - 2$.

11. $(0, \frac{1}{2e})$ [解析] 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax = \frac{1-2ax^2}{x}$.

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则函数 $f(x)$ 不可能有两个不同的零点.

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = \sqrt{\frac{1}{2a}}$, 当 $0 < x < \sqrt{\frac{1}{2a}}$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增, 当 $x > \sqrt{\frac{1}{2a}}$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $f(\sqrt{\frac{1}{2a}}) = \ln \sqrt{\frac{1}{2a}} - a \left(\sqrt{\frac{1}{2a}}\right)^2 = -\frac{1}{2} \ln 2a - \frac{1}{2}$.

因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 所以要使函数 $f(x)$ 恰有两个不同的零点, 只需满足 $-\frac{1}{2} \ln 2a - \frac{1}{2} > 0$, 即 $\ln 2a < -1$, 所以 $0 < 2a < \frac{1}{e}$, 即 $0 < a < \frac{1}{2e}$, 所以实数 a 的取值范围为 $(0, \frac{1}{2e})$.

12. $0 \quad (-1, 0) \cup (0, 1)$ [解析] $\because f(x)$ 为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的偶函数, $\therefore f(-1) = f(1) = 0$.

\because 当 $x < 0$ 时, $f'(x) + \frac{f(x)}{x} = \frac{xf'(x) + f(x)}{x} > 0$, $\therefore xf'(x) + f(x) < 0$, 令 $g(x) = xf(x)$, 则 $g'(x) = f(x) + xf'(x)$, 可知 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 且 $g(-1) = -f(-1) = 0$, $\therefore g(-x) = -xf(-x) = -xf(x) = -g(x)$, $\therefore g(x)$ 为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的奇函数. 当 $x < -1$ 时, $\because xf(x) > 0$, $\therefore f(x) < 0$; 当 $-1 < x < 0$ 时, $\because xf(x) < 0$, $\therefore f(x) > 0$. 由 $f(x)$ 为偶函数知, 使得 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$.

13. 1 3 【解析】对任意 $x \in [-1, 1]$, 恒有 $|4x^3 - ax| \leq b$ 成立等价于 $b \geq |4x^3 - ax|_{\max}, x \in [-1, 1]$.
 设 $f(x) = 4x^3 - ax, x \in [-1, 1]$, 易得 $f(x)$ 为奇函数, 则只需讨论 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的情况. $f'(x) = 12x^2 - a$,
 当 $a < 0$ 时, $f'(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 又 $f(0) = 0$, 所以 $|4x^3 - ax|_{\max} = f(1) = 4 - a > 4$;
 当 $a > 12$ 时, $f'(x) < 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 又 $f(0) = 0$, 所以 $|4x^3 - ax|_{\max} = |f(1)| = a - 4 > 8$;
 当 $0 \leq a \leq 12$ 时, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \frac{\sqrt{3a}}{6}$, 则函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\sqrt{3a}}{6}\right)$ 上单调递减, 在 $\left(\frac{\sqrt{3a}}{6}, 1\right]$ 上单调递增, 又 $f(0) = 0$, 所以 $|4x^3 - ax|_{\max} = \max\left\{|f(1)|, \left|f\left(\frac{\sqrt{3a}}{6}\right)\right|\right\} = \max\left\{|4-a|, \frac{\sqrt{3}}{9}a^{\frac{3}{2}}\right\}$,
 令 $|4-a| = \frac{\sqrt{3}}{9}a^{\frac{3}{2}}$, 得 $(a-3)(a-12)^2 = 0$, 解得 $a=3$ 或 $a=12$,
 当 $a=12$ 时, $|4x^3 - ax|_{\max} = 8$,
 当 $a=3$ 时, $|4x^3 - ax|_{\max} = 1$,
 当 $|4-a| > \frac{\sqrt{3}}{9}a^{\frac{3}{2}}$, 即 $0 \leq a < 3$ 时, $|4x^3 - ax|_{\max} = |4-a| > 1$,
 当 $|4-a| < \frac{\sqrt{3}}{9}a^{\frac{3}{2}}$, 即 $3 < a < 12$ 时, $|4x^3 - ax|_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{9}a^{\frac{3}{2}} > 1$.
 综上所述, 当 b 取得最小值 1 时, 实数 a 的值为 3.

小题 7 三角函数的图像与性质

1. D 【解析】函数 $y = \sin x^2$ 为偶函数, 排除 A, C; 又当 $x = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时, 函数取得最大值, 排除 B. 故选 D.
2. C 【解析】因为函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, 所以 $f(x)_{\max} = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\omega\pi}{3} = 1$. 又因为 $\frac{2\pi}{\omega} \geq 2 \times \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < \omega \leq 2$, 所以 $\frac{\omega\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 解得 $\omega = \frac{3}{2}$.
3. B 【解析】把函数 $y = \sin x$ 的图像上每个点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ (纵坐标保持不变), 得到 $y = \sin 2x$ 的图像, 再把所得图像向上平移 1 个单位长度, 得到 $y = \sin 2x + 1$ 的图像, 然后把所得图像向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin\left[2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right] + 1 = \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$ 的图像, 所以 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$. 故选 B.
4. A 【解析】 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left[2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right]$,
 故把函数 $y = \cos 2x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度可以得到函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图像. 故选 A.
5. C 【解析】将函数 $y = 2\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right) (\omega > 0)$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度后, 所得图像对应的函数解析式为 $y_1 = 2\sin\left[\omega\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4}\right] = 2\sin\left(\omega x + \frac{\omega-1}{4}\pi\right)$, 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度后, 所得图像对应的函数解析式为 $y_2 = 2\sin\left[\omega\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4}\right] = 2\sin\left(\omega x - \frac{\omega+1}{4}\pi\right)$. 因为所得的两个图像的对称轴重合, 所以 $\omega x + \frac{\omega-1}{4}\pi = \omega x - \frac{\omega+1}{4}\pi + k\pi, k \in \mathbf{Z}$,
 当 $k=0$ 时, $\omega=0$, 不符合题意, 所以 $k \neq 0$, 则 $\omega = 2k, k \in \mathbf{Z}$, 又 $\omega > 0$, 所以 ω 的最小值为 2. 故选 C.
6. C 【解析】因为函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 π , 所

- 以 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$, 即函数 $f(x) = A\sin(2x + \varphi)$,
 又因为函数 $f(x) = A\sin(2x + \varphi)$ 在 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时取得最大值, 所以当 $A > 0$ 时, $\frac{4}{3}\pi + \varphi = 2k_1\pi + \frac{\pi}{2} (k_1 \in \mathbf{Z})$, 即 $\varphi = 2k_1\pi - \frac{5}{6}\pi (k_1 \in \mathbf{Z})$;
 当 $A < 0$ 时, $\frac{4}{3}\pi + \varphi = 2k_2\pi - \frac{\pi}{2} (k_2 \in \mathbf{Z})$, 即 $\varphi = 2k_2\pi - \frac{11}{6}\pi (k_2 \in \mathbf{Z})$.
 又因为 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 所以 $f(x) = A\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 其中 $A < 0$.
 对于选项 A, 因为 $f(0) = A\sin \frac{\pi}{6} = \frac{A}{2} \neq \frac{1}{2}$, 所以选项 A 不正确;
 对于选项 B, 因为若函数 $f(x) = A\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 单调递增, 则 $\frac{\pi}{2} + 2m\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2m\pi (m \in \mathbf{Z})$,
 所以 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上是增函数, 所以选项 B 不正确;
 对于选项 C, 因为 $f\left(\frac{5\pi}{12}\right) = A\sin\left(2 \times \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right) = 0$, 所以 $f(x)$ 的图像的一个对称中心是 $\left(\frac{5\pi}{12}, 0\right)$, 所以选项 C 正确, 选项 D 不正确. 故选 C.

7. B 【解析】方法一: 设 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 由题图可知 $\frac{3}{4}T = \frac{3\pi}{4}$, 得 $T = \pi = \frac{2\pi}{\omega}$, $\therefore \omega = 2$.
 由 $f\left(-\frac{\pi}{8}\right) = 0$ 及函数 $f(x)$ 的单调性可知, $2 \times \left(-\frac{\pi}{8}\right) + \varphi = 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 得 $\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbf{Z})$, 又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{4}$,
 $\therefore f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.
 由 $f\left(\frac{A}{2}\right)f\left(-\frac{A}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + A\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - A\right) = \frac{1}{4}$, 且 $\frac{\pi}{4} + A + \frac{\pi}{4} - A = \frac{\pi}{2}$,
 得 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + A\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - A\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - A\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - A\right) = \frac{1}{4}$,
 即 $\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2A\right) = \cos 2A = \frac{1}{2}$.
 $\therefore A$ 为锐角, $\therefore 2A = \frac{\pi}{3}$, 即 $A = \frac{\pi}{6}$, 故 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
 方法二: 设 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 由题图可知 $\frac{3}{4}T = \frac{3}{4}\pi$, 得 $T = \pi = \frac{2\pi}{\omega}$, $\therefore \omega = 2$. $\therefore f(x) = \sin(2x + \varphi)$ 的图像可由 $y = \sin 2x$ 的图像至少向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到, 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{4}$,
 $\therefore f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.
 由 $f\left(\frac{A}{2}\right)f\left(-\frac{A}{2}\right) = \frac{1}{4}$, 得 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + A\right)\sin\left(\frac{\pi}{4} - A\right) = \frac{1}{2}(\cos^2 A - \sin^2 A) = \frac{1}{2}\cos 2A = \frac{1}{4}$, $\therefore \cos 2A = \frac{1}{2}$.
 $\therefore A$ 为锐角, $\therefore 2A = \frac{\pi}{3}$, 即 $A = \frac{\pi}{6}$, 故 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$.
8. C 【解析】因为 $y = \sin x + a\cos x, x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 的最小值为 a , 且当 $x=0$ 时, $y=a$,
 所以 $\sin x + a\cos x \geq a, x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 恒成立, 即 $a(1 - \cos x) \leq \sin x$,
 $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 恒成立. 当 $x=0$ 时, 有 $a \in \mathbf{R}$;
 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 时, 有 $a \leq \frac{\sin x}{1 - \cos x} = \frac{1}{\tan \frac{x}{2}}$, 故 $a \leq \sqrt{3}$. 故选 C.
9. $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$ 【解析】因为角 α 的终边经过点 $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$,
 所以 $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{2}$.

10. $\frac{5}{2}$ 【解析】因为 $\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha=-2$, 所以 $\tan\alpha=2$, 所以 $\frac{1}{\sin^2\alpha-2\cos^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha-2\cos^2\alpha}=\frac{\tan^2\alpha+1}{\tan^2\alpha-2}=\frac{4+1}{4-2}=\frac{5}{2}$.
11. $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{5}$ 【解析】因为 $\sin\left(-\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=-\cos\alpha$, $\cos\left(-\frac{7\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin\alpha$, 所以 $\cos\alpha\sin\alpha=\frac{12}{25}$, 又因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$, 所以 $\cos\alpha>\sin\alpha>0$.
- 因为 $(\cos\alpha-\sin\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{25}$, 所以 $\cos\alpha-\sin\alpha=\frac{1}{5}$ ①.
- 因为 $(\cos\alpha+\sin\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}$, 所以 $\cos\alpha+\sin\alpha=\frac{7}{5}$ ②.
- 由 ①② 得 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$, $\cos\alpha=\frac{4}{5}$.

12. ①② 【解析】 $f(x)=\sqrt{3}\cos 2x-\sin 2x=-2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$.
- 令 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi+\frac{\pi}{2}$, $k\in\mathbf{Z}$, 得 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{5\pi}{12}$, $k\in\mathbf{Z}$, 当 $k=1$ 时, 得函数 $f(x)$ 的图像的一条对称轴的方程为 $x=\frac{11\pi}{12}$, 所以 ① 正确;
- 令 $2x-\frac{\pi}{3}=m\pi$, $m\in\mathbf{Z}$, 得 $x=\frac{m\pi}{2}+\frac{\pi}{6}$, $m\in\mathbf{Z}$, 当 $k=1$ 时, 得函数 $f(x)$ 的图像的一个对称中心是 $\left(\frac{2\pi}{3}, 0\right)$, 所以 ② 正确;
- 由 $2n\pi-\frac{\pi}{2}\leq 2x-\frac{\pi}{3}\leq 2n\pi+\frac{\pi}{2}$, $n\in\mathbf{Z}$, 得 $n\pi-\frac{\pi}{12}\leq x\leq n\pi+\frac{5\pi}{12}$, $n\in\mathbf{Z}$, 当 $n=0$ 时, 得函数 $f(x)$ 的一个单调递减区间为 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$, 所以 ③ 错误;
- 将函数 $y=2\sin 2x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度可以得到函数 $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图像, 所以 ④ 错误. 所以正确的序号是 ①②.
13. $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right]$ 【解析】由 $\frac{\pi}{2}<x<\pi$, $\omega>0$, 得 $\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{4}<\omega x+\frac{\pi}{4}<\omega\pi+\frac{\pi}{4}$,
- 又 $y=\sin x$ 的单调递减区间为 $\left[2k\pi+\frac{\pi}{2}, 2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right]$, $k\in\mathbf{Z}$,
- 所以 $\begin{cases} \frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\geq\frac{\pi}{2}+2k\pi, k\in\mathbf{Z}, \\ \omega\pi+\frac{\pi}{4}\leq\frac{3\pi}{2}+2k\pi, k\in\mathbf{Z}, \end{cases}$ 解得 $4k+\frac{1}{2}\leq\omega\leq 2k+\frac{5}{4}$,
- $k\in\mathbf{Z}$.
- 由 $4k+\frac{1}{2}-\left(2k+\frac{5}{4}\right)\leq 0$, $k\in\mathbf{Z}$, 且 $2k+\frac{5}{4}>0$, $k\in\mathbf{Z}$, 得 $k=0$, 所以 $\omega\in\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right]$.

小题 8 三角恒等变换

1. D 【解析】 $\sin 5^\circ\cos 55^\circ-\cos 175^\circ\sin 55^\circ=\sin 5^\circ\cos 55^\circ+\cos 5^\circ\sin 55^\circ=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. A 【解析】因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, $\sin\alpha=\frac{3}{5}$, 所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$, 所以 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$, 所以 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{3}{4}+1}{1+\frac{3}{4}}=\frac{1}{7}$.
3. D 【解析】 $a=\sin 40^\circ\cos 127^\circ+\cos 40^\circ\sin 127^\circ=\sin(40^\circ+127^\circ)=\sin 167^\circ=\sin 13^\circ$,
- $b=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 56^\circ-\cos 56^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin 56^\circ-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos 56^\circ=\sin(56^\circ-45^\circ)=\sin 11^\circ$,


- $\sin 11^\circ$,
- $c=\frac{\cos^2 39^\circ-\sin^2 39^\circ}{\cos^2 39^\circ}=\cos^2 39^\circ-\sin^2 39^\circ=\cos 78^\circ=\sin 12^\circ$,
- $\therefore \sin 13^\circ>\sin 12^\circ>\sin 11^\circ$, $\therefore a>c>b$.
4. A 【解析】由 $\sin\alpha=\frac{1}{2}+\cos\alpha$ 可得 $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{1}{2}$,
- 即 $\sqrt{2}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$, 可得 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{4}>0$,
- 又 $\alpha\in\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\alpha-\frac{\pi}{4}\in\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$,
- 可得 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{1-\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{\sqrt{14}}{4}$,
- 则 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{-\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{-2\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=-2\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{14}}{2}$, 故选 A.
5. B 【解析】设 $x=\sqrt{2}\cos\theta$, $\theta\in[0, \pi]$, 则 $\sqrt{2-x^2}=\sqrt{2}\sin\theta$,
- 所以 $y=\sqrt{2}\cos\theta+\sqrt{2}\sin\theta-1=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)-1$.
- 因为 $\theta+\frac{\pi}{4}\in\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, 所以 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$, 所以 $y\in[-\sqrt{2}-1, 1]$, 所以 $\frac{M}{m}=\frac{1}{-\sqrt{2}-1}=1-\sqrt{2}$, 故选 B.
6. C 【解析】因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}<\beta<0$, 所以 $\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{4}+\alpha<\frac{3\pi}{4}$,
- $\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}<\frac{\pi}{2}$,
- 所以 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{\sqrt{6}}{3}$,
- 所以 $\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)=\cos\left[\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)-\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)\right]=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)+\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}\times\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$, 故选 C.
7. D 【解析】 $\because 3\pi\leq\theta\leq 4\pi$, $\therefore \frac{3\pi}{2}\leq\frac{\theta}{2}\leq 2\pi$, $\therefore \cos\frac{\theta}{2}>0$, $\sin\frac{\theta}{2}<0$, $\therefore \sqrt{\frac{1+\cos\theta}{2}}+\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}=\sqrt{\cos^2\frac{\theta}{2}}+\sqrt{\sin^2\frac{\theta}{2}}=\cos\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}=\sqrt{2}\cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{6}}{2}$,
- $\therefore \cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$,
- $\therefore \frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{6}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 或 $\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{6}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$,
- 即 $\theta=-\frac{\pi}{6}+4k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 或 $\theta=-\frac{5\pi}{6}+4k\pi(k\in\mathbf{Z})$,
- $\therefore 3\pi\leq\theta\leq 4\pi$, $\therefore \theta=\frac{19\pi}{6}$ 或 $\frac{23\pi}{6}$, 故选 D.
8. D 【解析】 $\because \sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\alpha=\frac{1}{2}\sin\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha+\sin\alpha=\frac{3}{2}\sin\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha=-\frac{4\sqrt{3}}{5}$,
- $\therefore \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha+\frac{1}{2}\cos\alpha=-\frac{4}{5}$, 即 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{4}{5}$,
- $\therefore \cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)=\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=-\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{4}{5}$.
9. $\frac{4}{9}$ 【解析】由 $\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan x+1}{1-\tan x}=2$, 解得 $\tan x=\frac{1}{3}$, 所以 $\frac{\tan x}{\tan 2x}=\frac{1-\tan^2 x}{2}=\frac{4}{9}$.
10. $-\frac{3\pi}{4}$ 【解析】由题意可得 $\tan A+\tan B=-3a<-6$, $\tan A\tan B=$

- 3a+1>7, 所以 $\tan A < 0, \tan B < 0$, 所以 $A, B \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$. 因为 $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \frac{-3a}{1 - (3a+1)} = 1$, 且 $A+B \in (-\pi, 0)$, 所以 $A+B = -\frac{3\pi}{4}$.
11. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 3 【解析】由题意得 $\cos \alpha = 2\sin \alpha - \sqrt{5}$, $\therefore \sin^2 \alpha + (2\sin \alpha - \sqrt{5})^2 = 1$, 解得 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\therefore \tan \alpha = -2$, $\therefore \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = 3$.
12. $\frac{\pi}{3}$ 【解析】由题意得 $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha - \beta) = \frac{3\sqrt{3}}{14}$, 又 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\therefore 0 < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \cos(\alpha - \beta) = \sqrt{1 - \sin^2(\alpha - \beta)} = \frac{13}{14}$, 而 $\cos \alpha = \frac{1}{7}$, $\therefore \sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, 故 $\sin \beta = \sin[\alpha - (\alpha - \beta)] = \sin \alpha \cos(\alpha - \beta) - \cos \alpha \sin(\alpha - \beta) = \frac{4\sqrt{3}}{7} \times \frac{13}{14} - \frac{1}{7} \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, $\therefore \beta = \frac{\pi}{3}$.
13. $\frac{4}{5} - \frac{7}{25}$ 【解析】因为 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. 因为 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 所以 $\left(\frac{3}{5} \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$, 即 $\cos^2 \alpha = \frac{16}{25}$, 又因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$. 因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$, 所以 $0 < \alpha - \beta < \pi$, 所以 $\sin(\alpha - \beta) = \sqrt{1 - \cos^2(\alpha - \beta)} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}$, 所以 $\sin \beta = \sin[\alpha - (\alpha - \beta)] = \sin \alpha \cos(\alpha - \beta) - \cos \alpha \sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} - \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = -\frac{7}{25}$.

小题9 解三角形

1. A 【解析】由题意知, $\cos C = -\frac{4}{5}$, 由余弦定理, 得 $-\frac{4}{5} = \frac{25+BC^2-45}{10BC}$, 解得 $BC=2$ (负值舍去).
2. B 【解析】由题意得, $S = \frac{1}{2} ab \sin C = 2\sqrt{5} \cos C$, 所以 $\tan C = 2$, 所以 $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 由余弦定理得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 17$, 所以 $c = \sqrt{17}$.
3. C 【解析】 $\because a \sin A = b \sin B + (c-b) \sin C$, \therefore 由正弦定理可得 $a^2 = b^2 + c^2 - bc$, \therefore 由余弦定理可得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$, 又 $A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$.
4. C 【解析】因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $A=2B$, 所以 $\frac{\pi}{6} < B < \frac{\pi}{4}$. 由正弦定理, 得 $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{\sin 2B}{\sin B} = 2 \cos B \in (\sqrt{2}, \sqrt{3})$.
5. B 【解析】因为 $\cos A = \frac{1}{3}$, 所以 $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 因为 $3 \sin B = 2 \sin C$, 所以 $3b = 2c$. 由 $S_{\triangle ABC} = 2\sqrt{2} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{3}{4} b^2 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 得 $b=2$, 所以 $c=3$. 由余弦定理, 得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{3} = 9$, 所以 $a=3$.

6. B 【解析】由题知在 $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = -\sin B \sin C$, 由正弦定理可得 $a^2 - b^2 - c^2 = -bc$, \therefore 由余弦定理可得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$. $\therefore \frac{c}{b} = \frac{1}{2} + \sqrt{3}$, \therefore 由正弦定理可得 $\sin C = \sin B \times \left(\frac{1}{2} + \sqrt{3}\right)$, 即 $\sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right) = \sin B \times \left(\frac{1}{2} + \sqrt{3}\right)$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B = \frac{1}{2} \sin B + \sqrt{3} \sin B$, $\therefore \tan B = \frac{1}{2}$. 故选 B.
7. D 【解析】如图所示, 设 D 为 AC 的中点. 在 $\triangle ABC$ 中, 设内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 则 $b=c$, 由余弦定理得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{2b^2 - a^2}{2b^2}$, 所以在 $\triangle ABD$ 中, $BD^2 = b^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 - 2 \times b \times \frac{b}{2} \times \frac{2b^2 - a^2}{2b^2}$, 可得 $2a^2 + b^2 = 144$. 设在 $\triangle ABC$ 中, BC 边上的高为 h , 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} ah = \frac{1}{2} a \sqrt{b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} a \sqrt{144 - \frac{9a^2}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 (144 - \frac{9a^2}{4})} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{-9}{4} (a^2 - 32)^2 + 2304}$, 所以, 当 $a^2 = 32$ 时, S 有最大值, 此时, $b^2 = 144 - 2a^2 = 80$, 得 $b = 4\sqrt{5}$, 所以 $c = 4\sqrt{5}$, 即 $AB = 4\sqrt{5}$. 故选 D.



8. C 【解析】由 $\sin^2 A - \cos^2 A = \frac{1}{2}$ 得 $\cos^2 A - \sin^2 A = -\frac{1}{2}$, 则 $\cos 2A = -\frac{1}{2}$, 又 $A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\therefore 2A = \frac{2\pi}{3}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$, $\therefore B+C = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore \sin B + \sin C = \sin B + \sin\left(\frac{2\pi}{3} - B\right) = \sin B + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos B + \frac{1}{2} \sin B = \sqrt{3} \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right)$. 又 $\because 0 < B < \frac{2\pi}{3}$, $\therefore \frac{\pi}{6} < B + \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6}$, $\therefore \frac{1}{2} < \sin\left(B + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin B + \sin C \leq \sqrt{3}$. 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$, $\therefore a = \frac{\sin A}{\sin B + \sin C} (b+c) \geq \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} (b+c) = \frac{b+c}{2}$, 即 $2a \geq b+c$. 故选 C.
9. $\frac{\pi}{3}$ 7 【解析】由正弦定理可得, $2 \cos A (\sin B \cos C + \sin C \cos B) = 2 \cos A \sin A = \sin A$, 因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $\cos A = \frac{1}{2}$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$. 因为 $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4} bc$, 所以 $bc = 12$. 又 $a = \sqrt{13}$, 所以由余弦定理可得, $13 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc = (b+c)^2 - 3bc$, 所以 $(b+c)^2 = 49$, 所以 $b+c=7$.
10. $\frac{5\pi}{12}$ $\frac{1}{4}$ 【解析】 $\because A = \frac{\pi}{6}, b = (4+2\sqrt{3})a \cos B$, $\therefore \sin B = (4+2\sqrt{3}) \sin \frac{\pi}{6} \cos B$, $\therefore \tan B = 2 + \sqrt{3}$. $\therefore \tan\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{6} + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \frac{\pi}{6} \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} + 1}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 + \sqrt{3}, B \in (0,$

$$\pi), \therefore B = \frac{5\pi}{12}, \therefore C = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{5\pi}{12} = \frac{5\pi}{12} = B,$$

$$\therefore c = b = 1, \therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

11. $\frac{1}{2}$ 【解析】由 $c \cos B + b \cos C = 4a \sin B \sin C$, 得 $\sin C \cos B + \sin B \cos C = 4 \sin A \sin B \sin C$, 即 $\sin A = 4 \sin A \sin B \sin C$, 又 $A \in (0, \pi)$, 所以 $\sin A \neq 0$, 所以 $4 \sin B \sin C = 1$,

$$\text{由正弦定理得 } c = \frac{b}{\sin B} \cdot \sin C = \frac{2}{\sin B} \cdot \frac{1}{4 \sin B} = \frac{1}{2 \sin^2 B},$$

所以当 $\sin B = 1, \sin C = \frac{1}{4}$ 时, c 取得最小值, 最小值为 $\frac{1}{2}$.

12. $\frac{\pi}{3} \quad \sqrt{3}$ 【解析】在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得 $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2AB \times BD \times \cos \frac{\pi}{6} = 3BD^2 + BD^2 - 2\sqrt{3}BD^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = BD^2$,

所以 $AD = BD$, 所以 $\angle DAB = \angle ABD = \frac{\pi}{6}$,

所以 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$,

又 D 为 BC 的中点, 所以 $AD = BD = CD$,

所以 $\triangle ADC$ 为等边三角形,

所以 $\angle CAD = \frac{\pi}{3}$.

因为 $AC = 2AD = 2$, 所以 $AC = 2, AD = 1$, 设 $AB = m, BD = CD = n$,

在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得 $1 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \frac{\pi}{6}$, 即 $1 = m^2 + n^2 - \sqrt{3}mn$ ①,

又在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得 $4 = m^2 + 4n^2 - 4mn \cos \frac{\pi}{6}$, 即 $4 = m^2 + 4n^2 - 2\sqrt{3}mn$ ②, 联立 ①②, 得 $m = \frac{2\sqrt{3}}{3}n$,

所以 $1 = \frac{4}{3}n^2 + n^2 - \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}n^2$,

解得 $n^2 = 3, mn = \frac{2\sqrt{3}}{3}n^2 = 2\sqrt{3}$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}m \times 2n \times \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}mn = \sqrt{3}$.

13. $-\frac{3}{3}$ 【解析】因为 $a^2 + 2b^2 = c^2 > a^2 + b^2$, 所以 C 为钝角,

$$\text{所以 } \frac{\tan C}{\tan A} = \frac{\sin C \cos A}{\cos C \sin A} = \frac{c \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}{a \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{a^2 + b^2 - c^2} = \frac{3b^2}{-b^2} = -3,$$

所以 $\tan C = -3 \tan A$, $\tan A > 0$, 则 $\tan B = -\tan(A + C) =$

$$\frac{\tan A + \tan C}{\tan A \tan C - 1} = \frac{2 \tan A}{1 + 3 \tan^2 A} = \frac{2}{\frac{1}{\tan A} + 3 \tan A} \leq \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 当且}$$

仅当 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号, 故 $\tan B$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

小题 10 平面向量与复数

1. C 【解析】因为 $\frac{2}{1+i} = 1-i$, 所以其共轭复数是 $1+i$, 故选 C.

2. B 【解析】 $\because z = \frac{2+i}{i} = \frac{(2+i) \cdot (-i)}{-i^2} = 1-2i$, $\therefore z$ 的虚部为 -2 . 故选 B.

3. C 【解析】 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = \left(\frac{\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}}{2} \right)^2 - \left(\frac{\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC}}{2} \right)^2 = \left(\frac{\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}}{2} \right)^2 - \frac{\overrightarrow{CA}^2}{4} = \left(\frac{\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}}{2} \right)^2 - 2$, 设 AC 的中点为 O , 则

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MO}^2 - 2$, 所以要使 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC}$ 最大, 只要使 $|\overrightarrow{MO}|$ 最大, 易知 $|\overrightarrow{MO}|$ 的最大值为 $\sqrt{2} + 1$, 所以 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC}$ 的最大值为 $1 + 2\sqrt{2}$.

4. D 【解析】设 $|b| = x$, 则 $|a| = 2x$, 因为 $|a-b| = 3$, 所以 $4x^2 - 2a \cdot b + x^2 = 9$, 可得 $a \cdot b = \frac{5x^2 - 9}{2}$.

因为 $\cos \langle a-b, a \rangle = \frac{a^2 - a \cdot b}{|a-b| \cdot |a|} = \frac{x^2 + 3}{4x} = \frac{x + \frac{3}{x}}{4} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 当且仅当 $x = \frac{3}{x}$, 即 $x = \sqrt{3}$ 时等号成立,

所以 $\langle a-b, a \rangle \in \left[0, \frac{\pi}{6} \right]$, 故 $a-b$ 与 a 夹角的最大值为 $\frac{\pi}{6}$. 故选 D.

5. A 【解析】连接 OC, OB , 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}) = \overrightarrow{OC}^2 - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}^2 + \frac{1}{2}[(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC})^2 - \overrightarrow{OA}^2 - \overrightarrow{OB}^2 - \overrightarrow{OC}^2] = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC})^2 - \frac{1}{8}$, $\therefore |\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{CB}| \in [0, 2]$, $\therefore |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}| \in \left[0, \frac{5}{2} \right]$, $\therefore \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$

的取值范围是 $\left[-\frac{1}{8}, 3 \right]$. 故选 A.

6. B 【解析】设向量 a, c 的夹角为 θ , 因为 $c \cdot (a-b) = 0$, 所以 $b \cdot c = a \cdot c = |a| \cdot |c| \cos \theta = \cos \theta$, 所以 $-1 \leq b \cdot c \leq 1$, 所以 $|b-c| = \sqrt{(b-c)^2} = \sqrt{5-2b \cdot c} \in [\sqrt{3}, \sqrt{7}]$, 故选 B.

7. B 【解析】由 $a \cdot b - e \cdot (a+b) + 1 = 0$, 得 $a \cdot b + 1 = e \cdot (a+b)$, 所以 $|a \cdot b + 1| = |e \cdot (a+b)| \leq |a+b|$, 两边平方可得 $(a \cdot b + 1)^2 \leq a^2 + b^2 + 2a \cdot b = 13 + 2a \cdot b$, 解不等式得 $-2\sqrt{3} \leq a \cdot b \leq 2\sqrt{3}$,

所以 $|a-b| = \sqrt{a^2 + b^2 - 2a \cdot b} = \sqrt{13 - 2a \cdot b} \in [\sqrt{13-4\sqrt{3}}, \sqrt{13+4\sqrt{3}}]$, 即 $|a-b|_{\min} = \sqrt{13-4\sqrt{3}}$, 故选 B.

8. A 【解析】设 $a = (1, 0), b = (0, 1), c = (x, y)$, 其中 $x^2 + y^2 = 1$, 因为 $|a+2c| + |3a+2b-c| = \sqrt{(1+2x)^2 + (2y)^2} + \sqrt{(3-x)^2 + (2-y)^2} = \sqrt{3(x^2+y^2) + x^2 + y^2 + 4x+1} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(x+2)^2 + y^2} + \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} \geq \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$ (验证知等号可以取到), 所以 $|a+2c| + |3a+2b-c|$ 的最小值为 $\sqrt{29}$.

9. $\frac{3}{4} + i$ 【解析】设 $z = a + bi (a, b \in \mathbf{R})$, 代入 $z + |z| = 2 + i$, 根据复数相等的定义得 $\begin{cases} a + \sqrt{a^2 + b^2} = 2, \\ b = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = \frac{3}{4}, \\ b = 1, \end{cases}$

$$z = \frac{3}{4} + i, \text{ 所以 } \frac{z(1+i)}{z-2i} = \frac{\left(\frac{3}{4} + i\right)(1+i)}{\frac{3}{4} - i} = \frac{-1+7i}{3-4i} = \frac{-31+17i}{25}.$$

10. $\sqrt{3}$ 【解析】设 $a = (4, 0), \overrightarrow{OM} = m = (x_1, y_1), \overrightarrow{ON} = n = (x_2, y_2)$, 其中 O 为坐标原点, 由 $\begin{cases} m^2 - a \cdot m + 1 = 0, \\ n^2 - a \cdot n + 1 = 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 - 4x_1 + 1 = 0, \\ x_2^2 + y_2^2 - 4x_2 + 1 = 0, \end{cases}$


即 $\begin{cases} (x_1 - 2)^2 + y_1^2 = 3, \\ (x_2 - 2)^2 + y_2^2 = 3, \end{cases}$

所以 $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$ 的终点 M, N 均在圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 上运动, 如图所示. 要使 m 与 n 的夹角最大, 只需 OM, ON 分别与圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相切,

此时 $|\overrightarrow{OM}| = 1, |\overrightarrow{ON}| = 1, \angle MON = 120^\circ$,

故 $|m-n| = |\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{ON}| =$

$$\sqrt{|\overrightarrow{OM}|^2 + |\overrightarrow{ON}|^2 - 2|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}| \cos \angle MON} = \sqrt{3}.$$



11. $[0, 4]$ 【解析】方法一: 因为 $|b| - |a| - |c-b| \leq |a+b| - |c-b| \leq |a+b+c-b| = |a+c| \leq |a+b| + |c-b| \leq |a| + |b| + |c-b|$, 所以 $0 \leq |a+c| \leq 4$.

方法二: 记 $-a = \overrightarrow{OA}, b = \overrightarrow{OB}, c = \overrightarrow{OC}$, 其中 O 为坐标原点, 则 $|a+c| = |c-(-a)| = |\overrightarrow{AC}|, |\overrightarrow{OA}| = 1, |\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{BC}| = 1$,

- 所以 A 在以 O 为圆心, 1 为半径的圆上运动, C 在以 B 为圆心, 1 为半径的圆上运动, 又 $|\vec{OB}|=2$, 所以圆 O 与圆 B 外切, 所以当 A, C 重合时, $|\vec{AC}|_{\min}=0$, 当 \vec{OA}, \vec{OB} 反向, \vec{OB}, \vec{BC} 同向时, $|\vec{AC}|_{\max}=4$, 所以 $|a+c|$ 的取值范围为 $[0, 4]$.
12. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 【解析】由 $a \cdot b=1, \langle a, b \rangle=\frac{\pi}{3}$, 得 $|a||b|=2$. 设 $a=(t, 0)(t>0), b=(\frac{1}{t}, \frac{\sqrt{3}}{t})$. 设 $c=(x, y)$. 由 $c \cdot a=1, c \cdot b=2$, 得 $\begin{cases} xt=1, \\ \frac{x}{t}+\frac{\sqrt{3}y}{t}=2, \end{cases}$ 消去 t 得 $x^2+\sqrt{3}xy=2$. 由此得 $y=\frac{2-x^2}{\sqrt{3}x}(x=\frac{1}{t}>0)$, 所以 $|c|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x^2+\frac{(2-x^2)^2}{3x^2}}=\sqrt{\frac{4}{3}\left(x^2+\frac{1}{x^2}-1\right)}\geq\sqrt{\frac{4}{3}\left(2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}}-1\right)}=\sqrt{\frac{4}{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 当且仅当 $x^2=\frac{1}{x^2}$, 即 $x=1$ 时等号成立, 故 $|c|_{\min}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.
13. $18+2\sqrt{3}$ 【解析】设 $a=\vec{OA}, b=\vec{OB}, c=\vec{OC}$, 则 $a-b=\vec{BA}, c-a=\vec{AC}, c-b=\vec{BC}$, 所以 $\angle AOB=\frac{\pi}{3}, \angle ACB=\frac{2\pi}{3}$. 当点 O, C 在 AB 两侧时, 由题可得 O, A, C, B 四点共圆, 在 $\triangle ABC$ 中, $BA=6, AC=2\sqrt{3}, \angle ACB=\frac{2\pi}{3}$, 由正弦定理得 $\frac{BA}{\sin \angle ACB}=\frac{AC}{\sin \angle CBA}$, 则 $\sin \angle CBA=\frac{1}{2}$, 故 $\angle CBA=\frac{\pi}{6}$, 由同弧所对的圆周角相等, 可得 $\angle CBA=\angle COA=\frac{\pi}{6}$, 可得 a 与 c 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$. 因为 $|c-a|=2\sqrt{3}$, 所以 $12=c^2+a^2-2a \cdot c \geq 2|a||c|-2a \cdot c$, 当且仅当 $|a|=|c|$ 时等号成立, 又由 $a \cdot c=|a||c|\cos \frac{\pi}{6}$ 得 $|a||c|=\frac{2}{\sqrt{3}}a \cdot c$, 所以 $12 \geq \frac{4}{\sqrt{3}}a \cdot c-2a \cdot c$, 所以 $a \cdot c \leq \frac{6\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=18+12\sqrt{3}$. 当点 O, C 在 AB 同侧时, 可得点 A, B, O 在以 C 为圆心, AC 为半径的圆上, 则当点 O, C, A 共线, 即 OA 为圆 C 的直径时, $a \cdot c=\vec{OA} \cdot \vec{OC}$ 取得最大值, $(a \cdot c)_{\max}=|\vec{OA}| \cdot |\vec{OC}|=4\sqrt{3} \times 2\sqrt{3}=24$. 综上所述, $a \cdot c$ 的最大值为 $18+12\sqrt{3}$.

小题 11 等差数列、等比数列

1. D 【解析】因为 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项, 所以 $(a_1-12)^2=(a_1-4)(a_1-16)$, 解得 $a_1=20$, 所以 $S_{10}=10a_1+45d=200-90=110$.
2. B 【解析】因为 $a_1=1, 3S_n=a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$, 所以 $S_{n+1}=4S_n$, 所以数列 $\{S_n\}$ 是首项为 $S_1=a_1=1$, 公比为 4 的等比数列, 所以 $S_5=4^5$.
3. B 【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q, q \neq 0$, 由 $a_1=b_1=1, a_5=b_5$, 可得 $1+4d=q^2$, 则 $a_9=1+8d=1+2(q^2-1)=2q^2-1>-1$, 所以 a_9 能取到的最小整数是 0. 故选 B.
4. D 【解析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 由题意知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比不为 -1, 故 $S_n, S_{2n}-S_n, S_{3n}-S_{2n}$ 依次成等比数列, 所以 $54(S_{3n}-60)=36$, 解得 $S_{3n}=\frac{182}{3}$.
5. B 【解析】当 $n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$ 时, 因为 $a_n=\sqrt{\frac{a_{n+1}^2+a_{n-1}^2}{2}}$, 所以 $2a_n^2=a_{n+1}^2+a_{n-1}^2$, 即 $a_{n+1}^2-a_n^2=a_n^2-a_{n-1}^2$, 所以数列 $\{a_n^2\}$ 是等差数列, 其首项 $a_1^2=1$, 公差 $d=a_2^2-a_1^2=4-1=3$, 所以 $a_n^2=1+3(n-1)=3n-2$, 又数列 $\{a_n\}$ 为正项数列, 所以 $a_n=\sqrt{3n-2}$, 所以 $a_6=\sqrt{18-2}=4$.
6. C 【解析】由题意知, $\frac{A_n}{B_n}=\frac{1}{2^n+1}$, 令 $A_n=k(2^n-1), k \neq 0$, 则 $B_n=A_n \cdot (2^n+1)=k(2^n-1)(2^n+1)=k(4^n-1)$, 所以 $a_7=A_7-A_6=k(2^7-1)-k(2^6-1)=64k, b_3=B_3-B_2=k(4^3-1)-k(4^2-1)=48k$, 所以 $\frac{a_7}{b_3}=\frac{64k}{48k}=\frac{4}{3}$.

7. B 【解析】 $2a_n < a_m < 1024a_n \Leftrightarrow 2 < 2^{m-n} < 1024 \Leftrightarrow 1 < m-n < 10$, 又因为 $m-n \in \mathbf{Z}$, 所以 $2 \leq m-n \leq 9$, 即 $m=n+t, t=2, 3, \dots, 9$, 所以 $(m-1)^2+n=(n+t-1)^2+n=n^2+(2t-1)n+(t-1)^2$, 因为 $-\frac{2t-1}{2} < 0$, 所以 $(m-1)^2+n \geq 1+(2t-1)+(t-1)^2=t^2+1 \geq 5$, 当且仅当 $t=2, n=1, m=3$ 时, 取得最小值 5, 故选 B.
8. B 【解析】 $\because S_n=\frac{a_n^2+a_n}{2}, \therefore S_{n+1}=\frac{a_{n+1}^2+a_{n+1}}{2}, \therefore a_{n+1}=\frac{a_{n+1}^2-a_n^2+a_{n+1}-a_n}{2}, \therefore a_{n+1}+a_n=a_{n+1}^2-a_n^2$, 又 $a_n > 0, \therefore a_{n+1}-a_n=1$, 由条件可得 $a_1=1, \therefore a_n=n$. 设 $b_m+b_{m+1}+\dots+b_{m+k-1}=3^t(m, t, k \in \mathbf{N}^*$ 且 $k>1$), $\therefore k(4m+2k-1)=3^t(m, k, t \in \mathbf{N}^*$ 且 $k>1$), 令 $k=3^a$, 不妨取 $t=3a(a \in \mathbf{N}^*)$, 则 $4m=\frac{3^t}{k}-2k+1=3^{2a}-2 \times 3^a+1=(8+1)^a-2 \times (4+1)^a+1$ 一定是 4 的倍数, $\therefore k$ 的取值集合是 $\{k|k=3^a, a \in \mathbf{N}^*\}$.
9. 5 - 9 【解析】设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 依题意得 $\begin{cases} 2a_1+8d=6, \\ 5a_1+10d=-5, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_1=-5, \\ d=2, \end{cases}$ 所以 $a_6=-5+10=5, S_n=-5n+\frac{n(n-1)}{2} \times 2=n^2-6n$, 当 $n=3$ 时, S_n 取得最小值, 最小值为 -9.
10. -12 $-n^2+21n$ 【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 因为 $\begin{cases} a_1+d=18, \\ a_2=18, S_{18}=54, \end{cases}$ 所以 $\begin{cases} a_1+d=18, \\ 18a_1+\frac{18 \times 17}{2}d=54, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a_1=20, \\ d=-2, \end{cases}$ 所以 $a_{17}=a_1+16d=20-32=-12, S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=-n^2+21n$.
11. $2^{2^{n-1}}$ 【解析】易知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正, 对 $a_{n+1}=a_n^2$ 两边取对数, 得 $\log_2 a_{n+1}=\log_2 a_n^2=2\log_2 a_n$, 所以数列 $\{\log_2 a_n\}$ 是以 $\log_2 a_1=1$ 为首项, 2 为公比的等比数列, 所以 $\log_2 a_n=2^{n-1}$, 所以 $a_n=2^{2^{n-1}}$.
12. 4 【解析】因为 a_1, a_3, a_{13} 依次成等比数列, 所以 $(1+2d)^2=1+12d$, 解得 $d=2$ 或 $d=0$ (舍去), 所以 $a_n=2n-1, S_n=n^2$, 所以 $\frac{2S_n+16}{a_n+3}=\frac{2n^2+16}{2n+2}=\frac{n^2+8}{n+1}$. 令 $t=n+1$, 则原式 $=\frac{t^2+9-2t}{t}=\frac{t^2-2t+9}{t}=t-\frac{2}{t}+2$, 因为 $t \geq 2$ 且 $t \in \mathbf{N}^*$, 所以当 $t=3$, 即 $n=2$ 时, $\frac{2S_n+16}{a_n+3}$ 取得最小值 4.
13. 9 【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d \neq 0)$, 因为 a_2, a_5, a_{11} 依次成等比数列, 所以 $a_5^2=a_2a_{11}$, 所以 $(a_1+4d)^2=(a_1+d)(a_1+10d)$, 得 $a_1=2d$, 又 $a_{11}=2(S_m-S_n)(m>n>0, m, n \in \mathbf{N}^*)$, 所以 $a_1+10d=2ma_1+m(m-1)d-2na_1-n(n-1)d$, 化简得 $(m+n+3)(m-n)=12$, 因为 $m>n>0, m, n \in \mathbf{N}^*$, 所以 $\begin{cases} m-n=1, \\ m+n+3=12 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m-n=2, \\ m+n+3=6, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} m=5, \\ n=4 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m=\frac{5}{2}, \\ n=\frac{1}{2} \end{cases}$ (舍去), 所以 $m+n=9$.

小题 12 数列的综合问题

1. C 【解析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q . 当 $q=1$ 时, $S_{n+2}=(n+2)a_1, S_n=na_1$, 由 $S_{n+2}=4S_n+3$, 得 $(n+2)a_1=4na_1+3$, 即 $3a_1n=2a_1-3$, 若对任意的正整数 $n, 3a_1n=2a_1-3$ 恒成立, 则 $a_1=0$ 且 $2a_1-3=0$, 矛盾, 所以 $q \neq 1$, 所以 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, S_{n+2}=\frac{a_1(1-q^{n+2})}{1-q}$, 代入 $S_{n+2}=4S_n+3$ 并化简, 得 $a_1(4-q^2)q^n=3+3a_1-3q$, 若对任意的正整数 n , 该等式恒成立, 则有 $\begin{cases} 4-q^2=0, \\ 3+3a_1-3q=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} q=1, \\ a_1=-3, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a_1=-3, \\ q=-2, \end{cases}$ 故 $a_1=1$ 或 $a_1=-3$, 故选 C.
2. B 【解析】由题知 $c_{n+1}=\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}=\frac{a_n+10b_n}{a_n+b_n}=\frac{c_n+10}{c_n+1}=1+\frac{9}{c_n+1}$, 所以 $c_3+c_4=c_3+1+\frac{9}{c_3+1} \geq 6$, 当且仅当 $c_3=2$ 时等号成立, 此时


- $c_4=4, c_5=1+\frac{9}{5}=\frac{14}{5}$.
3. C 【解析】由 $2a_n \leq a_{n-1} + a_{n+1} (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 得 $a_n - a_{n-1} \leq a_{n+1} - a_n (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 所以 $a_2 - a_1 \leq a_3 - a_2 \leq a_4 - a_3 \leq a_5 - a_4 \leq a_6 - a_5 \leq a_7 - a_6$, 所以 $3(a_7 - a_6) \geq a_6 - a_5 + a_5 - a_4 + a_4 - a_3 = a_6 - a_3$, 所以 C 正确, 故选 C.
4. A 【解析】因为 $a_{n+1} + a_n = 2n + 1$ ①, 所以 $a_{n+2} + a_{n+1} = 2(n+1) + 1 = 2n + 3$ ②, 由 ② - ① 得 $a_{n+2} - a_n = 2$, 所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项构成以 a_1 为首项, 2 为公差的等差数列, 数列 $\{a_n\}$ 的偶数项构成以 a_2 为首项, 2 为公差的等差数列, 又 $a_{2n-1} + a_{2n} = 2(2n-1) + 1 = 4n - 1$, 所以数列 $\{a_{2n-1} + a_{2n}\}$ 是以 4 为公差的等差数列, 所以 $S_n = \begin{cases} \frac{n(n+1)}{2} + (a_1 - 1), & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n(n+1)}{2}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$
- 当 n 为偶数时, $\frac{n(n+1)}{2} = 1350$ 无解 (因为 $51 \times 52 = 2652, 52 \times 53 = 2756$, 所以不存在相邻的两个自然数之积为 2700).
- 当 n 为奇数时, 由 $\frac{n(n+1)}{2} + (a_1 - 1) = 1350$, 得 $a_1 = 1351 - \frac{n(n+1)}{2}$, 因为 $a_2 < 2$, 所以 $3 - a_1 < 2$, 所以 $a_1 > 1$, 所以 $1351 - \frac{n(n+1)}{2} > 1$, 即 $n(n+1) < 2700$, 又 n 为奇数, 所以 $n \leq 51$. 故选 A.
5. D 【解析】设 $x \in \{a_2, a_3, \dots, a_8\}$, 即 $1 < x < 9$, 因为 $9 + x, 9x$ 不在该数列中, 所以 $\frac{a_9}{x} = \frac{9}{x} \in \{a_2, a_3, \dots, a_8\}$, 即 $x, \frac{9}{x}$ 均是 $\{a_2, a_3, \dots, a_8\}$ 中的元素, 由于 $\{a_2, a_3, \dots, a_8\}$ 中共有 7 个元素, 所以一定有 1 个元素满足 $x = \frac{9}{x}$, 得 $x = 3$. 当 $x \neq 3$ 时, x 与 $\frac{9}{x}$ 中一个比 3 大, 一个比 3 小, 所以 $a_5 = 3$, 可知 $a_6 > 3$. 构造满足条件的数列: $1, \sqrt[4]{3}, \sqrt{3}, \sqrt[4]{3^3}, 3, \sqrt[4]{3^5}, 3\sqrt{3}, \sqrt[4]{3^7}, 9$, 由于 $\sqrt[4]{3} < \frac{1+\sqrt{3}}{2}, \sqrt[4]{3^3} < \frac{3+\sqrt{3}}{2}, \sqrt[4]{3^5} < \frac{3+3\sqrt{3}}{2}, \sqrt[4]{3^7} < \frac{3\sqrt{3}+9}{2}$, 所以 $S_9 = 1 + \sqrt[4]{3} + \sqrt{3} + \sqrt[4]{3^3} + 3 + \sqrt[4]{3^5} + 3\sqrt{3} + \sqrt[4]{3^7} + 9 < 21 + 8\sqrt{3} < 36$. 故选 D.
6. B 【解析】设 a_1, a_2, a_3, a_4 所成等差数列的公差为 d , 由 $3a_1 - a_2 + a_3 + 1 = e^{a_1+a_2-a_3} \geq a_2 + a_3 - a_4 + 1$, 得 $2a_1 + d \geq 0$, 即 $a_1 + a_2 \geq 0$, 又 $a_2 < 0$, 所以 $a_1 > 0$, 所以公差 $d < 0$. 若 $a_1 = -a_2$, 则 $d = -2a_1$, 此时由 $3a_1 - a_2 + a_3 + 1 = e^{a_1+a_2-a_3}$ 得 $e^{a_1} = a_1 + 1$, 所以 $a_1 = 0, -a_2 = 0$, 这与 $a_2 < 0$ 矛盾, 故 $a_1 \neq -a_2$, 即 $a_1 + a_2 > 0$, 所以 $a_1 > -a_2 > 0$, 则 $|a_1| > |a_2|$, 又 $a_1 < a_3 < 0$, 则 $|a_3| < |a_1|$. 故选 B.
7. C 【解析】令 $a_n = 2018b_n$, 则由题意得 $b_{n+1} = b_n^2 + b_n$, 所以 $\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{1+b_n}$, 从而 $\frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{1+b_1} + \frac{1}{1+b_2} + \dots + \frac{1}{1+b_n}$, 又 $\frac{1}{b_1} = \frac{2018}{a_1} = 4036$, 所以 $\frac{1}{b_{n+1}} = 4036 - \left(\frac{1}{1+b_1} + \frac{1}{1+b_2} + \dots + \frac{1}{1+b_n}\right)$. 因为 $a_{n+1} = \frac{a_n^2}{2018} + a_n > a_n$, 所以数列 $\{a_n\}$ 为递增数列, 设当 $1 \leq n \leq m$ 时, $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$, 当 $n \geq m+1$ 时, $a_n > 1, m \in \mathbf{N}^*$, 所以当 $1 \leq n \leq m$ 时, $\frac{1}{4036} \leq b_n \leq \frac{1}{2018}$, 则 $\frac{4037}{4036} \leq 1 + b_n \leq \frac{2019}{2018}$, 则 $\frac{2018}{2019} \leq \frac{1}{1+b_n} \leq \frac{4036}{4037}$, 从而当 $n \geq 2$ 时, $\frac{2018n}{2019} < \frac{1}{1+b_1} + \frac{1}{1+b_2} + \dots + \frac{1}{1+b_n} < \frac{4036n}{4037}$, 故 $\frac{1}{b_{n+1}} \in \left(4036 - \frac{4036n}{4037}, 4036 - \frac{2018n}{2019}\right)$, 所以 $\frac{1}{b_{2019}} \in (2018, 2019), \frac{1}{b_{2020}} \in (2017, 2018)$, 所以 $a_{2019} < 1, a_{2020} > 1$, 故选 C.
8. A 【解析】因为 $x_{n+1} = \begin{cases} x_n + \sin x_n, & x_n \leq x_{n-1}, \\ x_n + \cos x_n, & x_n > x_{n-1} \end{cases} (n \geq 2), 0 < x_1 < x_2 < \pi$, 所以 $x_3 = x_2 + \cos x_2$, 所以 $x_3 - x_2 = \cos x_2$. 当 $x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $0 < \cos x_2 < 1$, 所以 $x_3 > x_2$, 则 $x_4 = x_3 + \cos x_3$, 因为 $y = x + \cos x$ 单调递增, $x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $x_3 \in \left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以

- $x_4 - x_3 = \cos x_3 > 0$, 即 $x_4 > x_3$; 当 $x_2 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, $-1 < \cos x_2 \leq 0$, 所以 $x_3 \leq x_2$, 则 $x_4 = x_3 + \sin x_3$, 因为 $y = x + \sin x$ 单调递增, $x_2 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $x_3 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi-1\right)$, 所以 $x_4 - x_3 = \sin x_3 > 0$, 即 $x_4 > x_3$. 综上可知 $x_4 > x_3, x_4 \in \left(1 + \cos 1, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{\pi}{2} + 1, \pi - 1 + \sin(\pi-1)\right)$. 当 $x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 易知 $x_n < \frac{\pi}{2}$; 当 $x_2 \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 时, $\frac{\pi}{2} \leq x_3 < x_4 < \pi$, 因为函数 $y = x + \sin x, y = x + \cos x$ 均单调递增, 所以当 $x < \pi$ 时, $x + \sin x < \pi, x + \cos x < \pi$, 所以 $x_n < \pi$. 故 $x_{2019} < \pi$. 故选 A.
9. $\frac{13}{16} \cdot 3^n - 1$ 【解析】因为 a_1, a_3, a_9 构成等比数列 $\{b_n\}$ 的前 3 项, 所以 $a_3^2 = a_1 a_9$, 即 $(a_1 + 2d)^2 = a_1(a_1 + 8d)$, 又 $d \neq 0$, 所以 $a_1 = d$, 则 $\frac{a_1 + a_3 + a_9}{a_2 + a_4 + a_{10}} = \frac{13d}{16d} = \frac{13}{16}$. 当 $d = 2$ 时, $b_1 = a_1 = 2, b_2 = a_3 = 6$, 则等比数列 $\{b_n\}$ 的首项为 2, 公比为 3, 所以数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{2 \times (1 - 3^n)}{1 - 3} = 3^n - 1$.
10. $6 \cdot 12$ 【解析】依题意得 $a_6 = S_5 - S_2 > 0, a_7 = S_7 - S_6 < 0, a_6 + a_7 = S_7 - S_5 > 0$, 则使 $a_n > 0$ 的最大正整数 $n = 6$. 因为 $S_{11} = \frac{11(a_1 + a_{11})}{2} = 11a_6 > 0, S_{12} = \frac{12(a_1 + a_{12})}{2} = \frac{12(a_6 + a_7)}{2} > 0, S_{13} = \frac{13(a_1 + a_{13})}{2} = 13a_7 < 0$, 所以 $S_{12} S_{13} < 0$, 即满足 $S_k S_{k+1} < 0$ 的正整数 $k = 12$.
11. $\frac{1}{49}$ 【解析】当 $n = 1$ 时, 由 $6a_1 = a_1^2 + 3a_1$, 解得 $a_1 = 3$ 或 $a_1 = 0$, 由 $a_n > 0$, 得 $a_1 = 3$. 由 $6S_n = a_n^2 + 3a_n$, 得 $6S_{n+1} = a_{n+1}^2 + 3a_{n+1}$. 两式相减得 $6a_{n+1} = a_{n+1}^2 - a_n^2 + 3a_{n+1} - 3a_n$, 所以 $(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n - 3) = 0$. 因为 $a_n > 0$, 所以 $a_{n+1} + a_n > 0$, 所以 $a_{n+1} - a_n = 3$, 即数列 $\{a_n\}$ 是以 3 为首项, 3 为公差的等差数列, 所以 $a_n = 3 + 3(n-1) = 3n$. 因为 $b_n = \frac{2^n}{(2^n - 1)(2^{n+1} - 1)} = \frac{8^n}{(8^n - 1)(8^{n+1} - 1)} = \frac{1}{7} \left(\frac{1}{8^n - 1} - \frac{1}{8^{n+1} - 1} \right)$, 所以 $T_n = \frac{1}{7} \times \left(\frac{1}{8-1} - \frac{1}{8^2-1} + \frac{1}{8^2-1} - \frac{1}{8^3-1} + \dots + \frac{1}{8^n-1} - \frac{1}{8^{n+1}-1} \right) = \frac{1}{7} \times \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{8^{n+1}-1} \right) < \frac{1}{49}$. 要使对任意 $n \in \mathbf{N}^*, k > T_n$ 恒成立, 只需 $k \geq \frac{1}{49}$, 所以 k 的最小值为 $\frac{1}{49}$.
12. 6 【解析】由 $a_1 = 0$, 且 $a_n - a_{n-1} - 1 = 2(n-1) (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 得 $a_n - a_{n-1} = 2n - 1 (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 则 $a_2 - a_1 = 2 \times 2 - 1, a_3 - a_2 = 2 \times 3 - 1, a_4 - a_3 = 2 \times 4 - 1, \dots, a_n - a_{n-1} = 2n - 1 (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 以上各式累加得 $a_n - a_1 = 2 \times (2 + 3 + \dots + n) - (n-1) = 2 \times \frac{(n+2)(n-1)}{2} - n + 1 = n^2 - 1 (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 即 $a_n = n^2 - 1 (n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2)$, 当 $n = 1$ 时, 上式仍成立, 所以 $b_n = n \cdot \sqrt{a_{n+1} + 1} \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^{n-1} = n \cdot \sqrt{(n+1)^2} \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^{n-1} = (n^2 + n) \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^{n-1} (n \in \mathbf{N}^*)$. 由 $\begin{cases} b_n \geq b_{n-1}, \\ b_n \geq b_{n+1}, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} (n^2 + n) \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^{n-1} \geq (n^2 - n) \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^{n-2}, \\ (n^2 + n) \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^{n-1} \geq (n^2 + 3n + 2) \cdot \left(\frac{8}{11}\right)^n, \end{cases}$ 解得 $\frac{16}{3} \leq n \leq \frac{19}{3}$. 因为 $n \in \mathbf{N}^*$, 所以 $n = 6$, 所以数列 $\{b_n\}$ 的最大项为第 6 项.

13. $\left[-4, \frac{5}{2}\right]$ [解析] 当 $t=4$ 时, $\{b_n\}$ 是首项为 2, 公差为 $\frac{3}{4}$ 的等差数列, 显然不合题意.
- 当 $t \neq 4, n \in \mathbf{N}^+$ 且 $n \geq 2$ 时, 由 $b_n = \frac{t}{4} b_{n-1} + \frac{3}{4}$, 得 $b_n - \frac{3}{4-t} = \frac{t}{4} \left(b_{n-1} - \frac{3}{4-t}\right)$,
- 且 $b_1 - \frac{3}{4-t} = 2 - \frac{3}{4-t} = \frac{5-2t}{4-t}$.
- 若 $t=0$, 则 $b_1=2, b_n = \frac{3}{4} (n \in \mathbf{N}^+ \text{ 且 } n \geq 2)$, 满足题意.
- 若 $t \neq 0$, 则 $b_n = \frac{5-2t}{4-t} \cdot \left(\frac{t}{4}\right)^{n-1} + \frac{3}{4-t}$,
- 所以由 $|b_n| \leq 2$, 得 $\frac{2t-11}{4-t} \leq \frac{5-2t}{4-t} \cdot \left(\frac{t}{4}\right)^{n-1} \leq \frac{5-2t}{4-t} (*)$.
- 当 $\frac{5-2t}{4-t} < 0$, 即 $\frac{5}{2} < t < 4$ 时, 由 $(*)$ 式可得 $1 \leq \left(\frac{t}{4}\right)^{n-1} \leq \frac{2t-11}{5-2t}$, 该式不可能恒成立.
- 当 $\frac{5-2t}{4-t} = 0$, 即 $t = \frac{5}{2}$ 时, 由 $(*)$ 式可得 $-4 \leq 0 \leq 0$, 该式恒成立.
- 当 $\frac{5-2t}{4-t} > 0$, 即 $t > 4$ 或 $0 < t < \frac{5}{2}$ 或 $t < 0$ 时, 由 $(*)$ 式可得 $\frac{2t-11}{5-2t} \leq \left(\frac{t}{4}\right)^{n-1} \leq 1$.
- 若 $t > 4$, 则右边不等式不可能恒成立; 若 $t < -4$, 则右边不等式不可能恒成立;
- 若 $-4 \leq t < 0$ 或 $0 < t < \frac{5}{2}$, 则 $\frac{2t-11}{5-2t} < -1$, $\left|\left(\frac{t}{4}\right)^{n-1}\right| \leq 1$, 可得 $\frac{2t-11}{5-2t} \leq \left(\frac{t}{4}\right)^{n-1} \leq 1$ 恒成立.
- 综上所述, $t \in \left[-4, \frac{5}{2}\right]$.

小题 13 不等式的性质与线性规划


1. D [解析] 若 $|a| < b$, 则 $a^2 < b^2$, 故 A 错误; 若 $a=b < 0$, 则 $|a| > b$, 而 $a^2 = b^2$, 故 B 错误; 若 $-a=b < 0$, 则 $a > b$, 而 $a^2 = b^2$, 故 C 错误; 若 $a > |b|$, 则 $a^2 > b^2$, 故 D 正确. 故选 D.
2. A [解析] $\because c < b < a$ 且 $ac < 0, \therefore c < 0 < a$.
由 $b > c, a > 0$, 得 $ab > ac$, 故 A 恒成立;
由 $c < 0, b-a < 0$, 得 $c(b-a) > 0$, 故 B 不成立;
当 $b=0$ 时, $cb^2 = ab^2$, 故 C 不恒成立;
由 $ac < 0, a-c > 0$, 得 $ac(a-c) < 0$, 故 D 不成立. 故选 A.
3. D [解析] 作出约束条件表示的可行域, 如图中阴影部分所示, 令 $z=x+3y$, 则当直线 $x+3y=z$ 过点 $A(-1, -1)$ 时, z 取得最小值 -4 , 当直线 $x+3y=z$ 过点 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 时, z 取得最大值 2 , 所以 $|x+3y|$ 的最大值是 4 , 故选 D.



4. A [解析] 由 $\Delta = a^2 + 8 > 0$, 知方程 $x^2 + ax - 2 = 0$ 恒有两个不等实根, 又由两根之积为 -2 , 知方程 $x^2 + ax - 2 = 0$ 必有一个正根和一个负根, 所以不等式 $x^2 + ax - 2 > 0$ 在区间 $[1, 5]$ 上有解的充要条件是 $5^2 + 5a - 2 > 0$, 解得 $a > -\frac{23}{5}$, 故 a 的取值范围为 $\left(-\frac{23}{5}, +\infty\right)$.

5. D [解析] 作出约束条件 $\begin{cases} x-2y \geq -2, \\ x-y \leq 0, \\ x \geq -4 \end{cases}$ 表示的可行域, 如图中阴影部分所示, 令 $z = -2x + y$, 则当直线 $-2x + y = z$ 经过点 $A(-4, -1)$ 时, z 取得最大值, 即 $z_{\max} = -2 \times (-4) + (-1) = 7$,

由题意可得 $m^2 \geq 7$, 解得 $m \leq -\sqrt{7}$ 或 $m \geq \sqrt{7}$, 所以实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -\sqrt{7}] \cup [\sqrt{7}, +\infty)$, 故选 D.



6. C [解析] 易知函数 $f(x) = x + \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 由 $\sqrt{a-1} - \sqrt{b-1} = 2b - a - 1$, 得 $\sqrt{a-1} + a - 1 = \sqrt{b-1} + 2(b-1) \geq \sqrt{b-1} + b - 1$, 所以 $a - 1 \geq b - 1 \geq 0$, 即 $a \geq b \geq 1$. 故选 C.

7. B [解析] 当 $m \geq 2$ 时, 显然不符合题意. 当 $m < 2$ 时, 作出不等式组 $\begin{cases} x+y \leq 2, \\ x \geq 0, \\ y \geq m \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图 1 中阴影部分所示, 其中

$A(2-m, m), B(0, 2), C(0, m)$, 由题可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |2-m|^2 = 2$, 解得 $m=0$ 或 $m=4$ (舍去).

作出不等式组 $\begin{cases} x+y \leq 2, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图 2 中阴影部分所示, 其中 $A'(2, 0), B(0, 2)$, $\frac{x+y+2}{x+1} = 1 + \frac{y+1}{x+1}$, $\frac{y+1}{x+1}$ 表示图 2 中的平面区域内任意一点与点 $P(-1, -1)$ 连线的斜率, 由图 2 可知 $\frac{y+1}{x+1}$ 的最小值为 $k_{AP} = \frac{0-(-1)}{2-(-1)} = \frac{1}{3}$, 所以 $\frac{x+y+2}{x+1}$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$.




图1




图2

8. D [解析] $|\sqrt{a}-b|^2 - |\sqrt{b}-a|^2 = (\sqrt{a}-b+\sqrt{b}-a)(\sqrt{a}-b-\sqrt{b}+a)$, 由题知 $\sqrt{a}-b-\sqrt{b}+a = a-b+\sqrt{a}-\sqrt{b} > 0$.
当 $0 < b < a \leq 1$ 时, $\sqrt{a} \geq a, \sqrt{b} > b$, 则 $\sqrt{a}-b+\sqrt{b}-a > 0$, 即 $|\sqrt{a}-b|^2 - |\sqrt{b}-a|^2 > 0$, 所以 $|\sqrt{a}-b| > |\sqrt{b}-a|$;
当 $a > b \geq 1$ 时, $\sqrt{a} < a, \sqrt{b} \leq b$, 则 $\sqrt{a}-b+\sqrt{b}-a < 0$, 即 $|\sqrt{a}-b|^2 - |\sqrt{b}-a|^2 < 0$, 所以 $|\sqrt{a}-b| < |\sqrt{b}-a|$. 故 A, B 均不恒成立.
 $|e^a-b|^2 - |e^b-a|^2 = (e^a-b+e^b-a)(e^a-b-e^b+a)$,
由题知 $e^a-b-e^b+a = e^a-e^b+a-b > 0$.
构造函数 $f(x) = e^x - x$, 则 $f'(x) = e^x - 1$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = e^x - 1 > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $a > b > 0, f(0) = 1$, 所以 $f(a) > f(b) > f(0)$, 即 $e^a - a > e^b - b > 1$, 所以 $e^a - b + e^b - a = e^a - a + e^b - b > 2$,
所以 $|e^a-b|^2 - |e^b-a|^2 > 0$, 即 $|e^a-b| > |e^b-a|$. 故 C 不成立, D 恒成立.

9. $12 \frac{2}{3}$ [解析] 作出不等式组 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x-3y+6 \geq 0, \\ 2x-y-3 \leq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图 1 中阴影部分所示,




图1

易得 $A(3, 3), B\left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right), C(0, 2)$,

令 $a = x + 5y - 6$, 则 $y = -\frac{1}{5}x + \frac{6}{5} + \frac{1}{5}a$,

由图可知,当直线 $y = -\frac{1}{5}x + \frac{6}{5} + \frac{1}{5}a$ 过点 $A(3,3)$ 时, a 取得最大值,且 $a_{\max} = 12$,

当直线 $y = -\frac{1}{5}x + \frac{6}{5} + \frac{1}{5}a$ 过点 $B(\frac{5}{3}, \frac{1}{3})$ 时, a 取得最小值,且 $a_{\min} = -\frac{8}{3}$,

又 $z = |a|$,所以 z 的最大值为 12.

作出不等式组 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x-3y+6 \geq 0, \\ mx-y-3 \leq 0 \end{cases} (m > \frac{1}{3})$ 表示的平面区域,如图 2

中阴影部分所示.




图2

由 $\begin{cases} x-3y+6=0, \\ mx-y-3=0, \end{cases}$ 得 $A'(\frac{15}{3m-1}, \frac{6m+3}{3m-1})$,

由 $\begin{cases} x+y-2=0, \\ mx-y-3=0, \end{cases}$ 得 $B'(\frac{5}{m+1}, \frac{2m-3}{m+1})$,


易得 $D(0, -3)$,

所以 $S_{\triangle A'B'C} = S_{\triangle A'CD} - S_{\triangle B'CD} = \frac{1}{2} \times 5 \times (\frac{15}{3m-1} - \frac{5}{m+1}) = 30$,

即 $9m^2 + 6m - 8 = 0$,解得 $m = \frac{2}{3}$ 或 $m = -\frac{4}{3}$ (舍去).

10. 24 8 [解析] 作出不等式组 $\begin{cases} y \geq x, \\ x+y \geq 4, \\ x-2y+8 \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域,

如图中阴影部分所示. 令 $z = 2x + y$, 则 $y = -2x + z$, 由图可知, 当直线 $y = -2x + z$ 过点 A 时, z 取得最大值. 由 $\begin{cases} x = y, \\ x-2y+8=0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=8, \\ y=8, \end{cases}$ 即点 A 的坐标为 $(8,8)$, 故 $z_{\max} = 2 \times 8 + 8 = 24$. $x^2 + y^2$ 表示平面区域内的点 (x,y) 到原点的距离的平方, 因为直线 $y = x$ 与直线 $x + y = 4$ 互相垂直, 所以 $x^2 + y^2$ 的最小值是点 B 到原点的距离的平方, 由 $\begin{cases} x+y=4, \\ y=x, \end{cases}$ 得 $B(2,2)$, 故 $(x^2 + y^2)_{\min} = 2^2 + 2^2 = 8$.



11. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ [解析] 由题知 $(a^2 - ab) + (b^2 - bc) + c^2 - 1 = 0$, 即 $(a - \frac{b}{2})^2 + (\frac{3b^2}{4} - bc) + c^2 - 1 = 0$,

即 $(a - \frac{b}{2})^2 + \frac{3}{4}(b - \frac{2}{3}c)^2 = 1 - \frac{2}{3}c^2$,

则 $1 - \frac{2}{3}c^2 \geq 0$, 得 $0 < c \leq \frac{\sqrt{6}}{2}$,

故 $c_{\max} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 此时 $a = \frac{\sqrt{6}}{6}$, $b = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

12. $\frac{2}{5}$ [解析] 由 $x^2 + 2y^2 - \sqrt{3}xy = 1 (x, y \in \mathbf{R})$, 得 $x^2 + y^2 = \frac{x^2 + 2y^2 - \sqrt{3}xy}{1 - \sqrt{3} \frac{xy}{x^2 + y^2}}$.

若 $y = 0$, 则 $x = \pm 1$, 得 $x^2 + y^2 = 1$.

若 $y \neq 0$, 则 $x^2 + y^2 = \frac{1 + (\frac{x}{y})^2}{(\frac{x}{y})^2 - \frac{\sqrt{3}x}{y} + 2}$, 设 $\frac{x}{y} = t$, 令 $z = x^2 + y^2 = \frac{1+t^2}{t^2 - \sqrt{3}t + 2}$, 得 $(z-1)t^2 - \sqrt{3}zt + 2z-1 = 0$.

若 $z = 1$, 则 $t = \frac{\sqrt{3}}{3}$;

若 $z \neq 1$, 则 $\Delta \geq 0$, 即 $3z^2 - 4(z-1)(2z-1) \geq 0$, 可得 $\frac{2}{5} \leq z < 1$

或 $1 < z \leq 2$, 即 z 的最小值为 $\frac{2}{5}$, 此时 $t = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

综上, $x^2 + y^2$ 的最小值为 $\frac{2}{5}$.

13. $[\frac{1}{3}, 2]$ [解析] 作出不等式组 $\begin{cases} 2x-y+2 \leq 0, \\ x+2y-4 \geq 0, \\ x-3y+11 \geq 0 \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图 1 中阴影部分所示, 作出直线 $x+y+1=0$,




图1

由图可知 $x+y+1 > 0$, 所以由 $(t+1)x + (t-1)y + t+1 = 0$, 可得 $t = \frac{-x+y-1}{x+y+1} = -1 + \frac{2y}{x+y+1}$.

令 $x+y+1 = m (m > 0)$, $y = n$, 则 $x = m-n-1$, $t = -1 + \frac{2n}{m}$.

由 $\begin{cases} 2x-y+2 \leq 0, \\ x+2y-4 \geq 0, \\ x-3y+11 \geq 0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} 2m-3n \leq 0, \\ m+n-5 \geq 0, \\ m-4n+10 \geq 0, \end{cases}$ 作出不等式组

$\begin{cases} 2m-3n \leq 0, \\ m+n-5 \geq 0, \\ m-4n+10 \geq 0, \\ m > 0 \end{cases}$ 表示的平面区域, 如图 2 中阴影部分所示, 其中 $A(3,2)$, $B(2,3)$, $\frac{n}{m}$ 表示图 2 中可行域内的点与原点连线的斜率, 又 $k_{OA} = \frac{2}{3}$, $k_{OB} = \frac{3}{2}$, 故 $\frac{n}{m} \in [\frac{2}{3}, \frac{3}{2}]$,

所以 $t = -1 + \frac{2n}{m} \in [\frac{1}{3}, 2]$.




图2

小题 14 基本不等式、绝对值不等式

1. B [解析] $|x-1| - |x-3| \leq |x-1-x+3| = 2$, 由题意知 $a^2 - 3a < 2$, 解得 $\frac{3-\sqrt{17}}{2} < a < \frac{3+\sqrt{17}}{2}$.

2. D [解析] 由 $x^2 + 2xy - 1 = 0$, 得 $y = \frac{1}{2x} - \frac{x}{2}$, 所以 $2x + y = 2x + \frac{1}{2x} - \frac{x}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2x} \geq \frac{1}{2} \times 2 \sqrt{3x \cdot \frac{1}{x}} = \sqrt{3}$,

- 当且仅当 $3x = \frac{1}{x}$, 即 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立, 此时 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 符合题意, 所以 $2x+y$ 的最小值为 $\sqrt{3}$, 故选 D.
3. C 【解析】当 $t \leq 0$ 时, 该不等式无解; 当 $t > 0$ 时, 因为 $|x+t^2-2| + |x+t^2+2t-1| \geq |x+t^2-2-(x+t^2+2t-1)| = 2t+1$, 所以要使原不等式无解, 只需 $3t \leq 2t+1$, 得 $0 < t \leq 1$. 综上所述, 实数 t 的取值范围为 $(-\infty, 1]$, 故选 C.
4. B 【解析】由题得 $0 = x+2y+2xy-8 \leq x+2y + \left(\frac{x+2y}{2}\right)^2 - 8$ (当且仅当 $x=2y$ 时取等号). 设 $x+2y=t(t>0)$, 则 $t + \frac{1}{4}t^2 - 8 \geq 0$, 所以 $t^2 + 4t - 32 \geq 0$, 即 $(t+8)(t-4) \geq 0$, 所以 $t \geq 4$, 故 $x+2y$ 的最小值为 4.
5. B 【解析】由 $x+y = \frac{1}{x} + \frac{4}{y} + 8$ 得 $x+y-8 = \frac{1}{x} + \frac{4}{y}$, 则 $(x+y-8)(x+y) = \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right)(x+y) = 5 + \frac{y}{x} + \frac{4x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{4x}{y}} = 9$, 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{4x}{y}$, 即 $y=2x$ 时, 等号成立. 令 $t = x+y(t>0)$, 可得 $(t-8) \cdot t \geq 9$, 解得 $t \leq -1$ (舍去) 或 $t \geq 9$, 所以 $x+y$ 的最小值为 9, 故选 B.
6. A 【解析】由 a, b 为正实数, 且 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$, 得 $b = \frac{2a}{a-1} > 0 (a \neq 1)$, 所以 $a-1 > 0$, 所以 $\frac{2}{a-1} + \frac{1}{b-2} = \frac{2}{a-1} + \frac{1}{\frac{2a}{a-1}-2} = \frac{2}{a-1} + \frac{a-1}{2a-2} = \frac{2}{a-1} + \frac{a-1}{2(a-1)} = \frac{5}{2} \cdot \frac{a-1}{a-1} = \frac{5}{2}$, 当且仅当 $\frac{2}{a-1} = \frac{a-1}{2}$ 时等号成立, 所以 $\frac{2}{a-1} + \frac{1}{b-2}$ 的最小值为 $\frac{5}{2}$, 故选 A.
7. B 【解析】 $\because a+b=1, c+d=1, \therefore ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号, $\therefore \frac{1}{ab} \geq 4$, 则 $\frac{1}{abc} + \frac{1}{d} \geq 4 \cdot \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = (c+d) \cdot \left(\frac{4}{c} + \frac{1}{d}\right) = 5 + \frac{4d}{c} + \frac{c}{d} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{4d}{c} \cdot \frac{c}{d}} = 9$, 当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}, c=\frac{2}{3}, d=\frac{1}{3}$ 时, 等号成立, $\therefore \frac{1}{abc} + \frac{1}{d}$ 的最小值为 9, 故选 B.
8. B 【解析】对于 A, 取 $x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$, 此时 $|x-y^2| + |x^2+y| \leq 1$, 但 $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 > \frac{3}{2}$, 故 A 中说法错误; 对于 B, 由 $(x^2-y) + (y^2-x) \leq |x^2-y| + |y^2-x| = |x-y^2| + |x^2-y| \leq 1$, 得 $x^2-x+y^2-y \leq 1$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2}$, 故 B 中说法正确; 对于 C, 取 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$, 此时 $|x+y^2| + |x^2-y| \leq 1$, 但 $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 > \frac{3}{2}$, 故 C 中说法错误; 对于 D, 取 $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$, 此时 $|x+y^2| + |x^2+y| \leq 1$, 但 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 > \frac{3}{2}$, 故 D 中说法错误. 故选 B.
9. 8 【解析】 $(x-2y)^2 + \frac{4}{y(x-3y)} \geq (x-2y)^2 + \frac{4}{\left[\frac{y+(x-3y)}{2}\right]^2} = (x-2y)^2 + \frac{16}{(x-2y)^2} \geq 8$, 当且仅当 $4y=x$ 且 $x-2y = \pm 2$, 即 $x=4, y=1$ 或 $x=-4, y=-1$ 时取等号.
10. $\sqrt{2} - \frac{1}{2}$ 【解析】设 $\frac{y}{x} = t(t>0)$, 则 $\frac{x}{x+2y} + \frac{y}{x} = \frac{1}{1+2t} + t = \frac{1}{1+2t} + \frac{1}{2}(2t+1) - \frac{1}{2} \geq 2\sqrt{\frac{1}{1+2t} \times \frac{1+2t}{2}} - \frac{1}{2} = \sqrt{2} - \frac{1}{2}$, 当且仅当 $t = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ 时取等号.
11. 4 16 【解析】 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = 4$, 当且仅当 $a=b=2$ 时取等号,

- 所以 ab 的最大值为 4.
 $(a^2+1)(b^2+1) = (ab)^2 + a^2 + b^2 + 1 = (ab)^2 + (a+b)^2 - 2ab + 1 = (ab)^2 - 2ab + 17 = (ab-1)^2 + 16$, 故当 $ab=1$ 时, $(a^2+1)(b^2+1)$ 取得最小值 16.
12. 2 【解析】由题意得 $\frac{1-2a+b}{\sqrt{b}(\sqrt{a}+3\sqrt{c})} = \frac{a+4b+3c}{\sqrt{ab}+3\sqrt{bc}} \geq \frac{\frac{a+4b+3c}{2} + \frac{3(b+c)}{2}}{\frac{a+b}{2} + \frac{3(b+c)}{2}} = 2$, 当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{9}$ 时取等号, 故 $\frac{1-2a+b}{\sqrt{b}(\sqrt{a}+3\sqrt{c})}$ 的最小值为 2.
13. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 【解析】 $1 = x^2 + 2y^2 + z^2 = \frac{2}{3}x^2 + \frac{4}{3}y^2 + \frac{2}{3}y^2 + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}z^2 \geq 2 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}xy + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}yz + 2 \times \frac{\sqrt{6}}{6}xz$, 当且仅当 $x = \sqrt{2}y = \frac{\sqrt{6}}{2}z$ 时等号成立, $\therefore \left(2 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}xy + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}yz + 2 \times \frac{\sqrt{6}}{6}xz\right) \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \leq 1 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$, 即 $t = \frac{4\sqrt{3}}{3}xy + \sqrt{2}yz + xz$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

小题 15 直线与圆

1. C 【解析】直线 $x-2y-2=0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 故所求直线的斜率为 -2 , 所以所求直线的方程为 $y-0 = -2(x-1)$, 即 $2x+y-2=0$, 故选 C.
2. C 【解析】由圆 C_1 与圆 C_2 相外切, 可得 $\sqrt{(a+b)^2 + (-2+2)^2} = 2+1=3$, 即 $(a+b)^2 = 9$, 又 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, 当且仅当 $a=b = \pm \frac{3}{2}$ 时等号成立, 故 ab 的最大值为 $\frac{9}{4}$.
3. B 【解析】圆 $C: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心为 $C(1,0)$, 半径为 1, 故 $|PC| = \sqrt{(1-1)^2 + (-2-0)^2} = 2$, 易得以 PC 为直径的圆的方程为 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$, 将两圆的方程相减, 得 AB 所在直线的方程为 $2y+1=0$, 即 $y = -\frac{1}{2}$.
4. B 【解析】由题意得 $\frac{|-2k|}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{k^2-2k+3}$, 且 $k^2-2k+3 > 0$, 解得 $-3 \leq k \leq 1$. 因为 $2ab = (a+b)^2 - (a^2+b^2) = 4k^2 - (k^2-2k+3) = 3k^2 + 2k - 3 = 3\left(k + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{10}{3}$, 所以当 $k = -3$ 时, $2ab$ 取得最大值 18, 即 ab 取得最大值 9.
5. D 【解析】圆 M 的标准方程为 $x^2 + (y-a)^2 = a^2 (a>0)$, 则圆心为 $M(0,a)$, 半径 $R=a$, 圆心到直线 $x+y=0$ 的距离 $d = \frac{a}{\sqrt{2}}$. \because 直线 $x+y=0$ 被圆 $M: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a>0)$ 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}, \therefore 2\sqrt{R^2-d^2} = 2\sqrt{a^2 - \frac{a^2}{2}} = 2\sqrt{\frac{a^2}{2}} = 2\sqrt{2}$, 即 $\sqrt{\frac{a^2}{2}} = \sqrt{2}$, 即 $a^2 = 4, \therefore a = 2$, 则圆 M 的圆心为 $M(0,2)$, 半径 $R=2$. \because 圆 $N: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心为 $N(1,1)$, 半径 $r=1, \therefore |MN| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$, 又 $R+r=3, R-r=1, \therefore R-r < |MN| < R+r$, 即圆 M 与圆 N 相交. 故选 D.
6. A 【解析】因为圆心 C 在直线 $y=2x-4$ 上, 所以 $C(a, 2a-4)$, 则圆 C 的方程为 $(x-a)^2 + [y-2(a-2)]^2 = 1$. 设点 $M(x, y)$, 因为 $|MA| = 2|MO|$, 所以 $\sqrt{x^2 + (y-3)^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, 化简得 $x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$, 即 $x^2 + (y+1)^2 = 4$, 设 $D(0, -1)$, 则点 M 在以 $D(0, -1)$ 为圆心, 2 为半径的圆上. 由题意, 点 $M(x, y)$ 在圆 C 上, 所以圆 C 与圆 D 有公共点, 则 $2-1 \leq |CD| \leq 2+1$, 即 $1 \leq \sqrt{a^2 + (2a-3)^2} \leq 3$, 由 $\sqrt{a^2 + (2a-3)^2} \geq 1$ 得 $5a^2 - 12a + 8 \geq 0$, 解得 $a \in \mathbf{R}$; 由 $\sqrt{a^2 + (2a-3)^2} \leq 3$ 得 $5a^2 - 12a \leq 0$, 解得 $0 \leq a \leq \frac{12}{5}$. 所以圆心 C 的横坐标 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{12}{5}\right]$. 故选 A.

7. B 【解析】设 $P(4-2m, m)$, $\because PA, PB$ 是圆 C 的两条切线,
 $\therefore CA \perp PA, CB \perp PB$,
 $\therefore AB$ 是圆 C 与以 PC 为直径的圆的公共弦.

易得 PC 为直径的圆的方程为 $[x-(2-m)]^2 + \left(y-\frac{m}{2}\right)^2 = (2-m)^2 + \frac{m^2}{4}$ ①,

又 $x^2 + y^2 = 1$ ②,

\therefore ①-②得 AB 所在直线的方程为 $2(2-m)x + my = 1$, 可化为 $4x - 1 + m(y - 2x) = 0$, 由 $\begin{cases} 4x - 1 = 0, \\ y - 2x = 0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = \frac{1}{4}, \\ y = \frac{1}{2}, \end{cases}$ 故直线 AB

经过定点 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$, 故选 B.

8. B 【解析】由题意得 $f(x_0) = \left|x_0^2 + \frac{1}{x_0}\right| + \left|x_0^2 - \frac{1}{x_0}\right| + ax_0 + b + 3 = 0$,

因为 $|x_0| \geq 1$, 所以 $f(x_0) = x_0^2 + \frac{1}{x_0} + x_0^2 - \frac{1}{x_0} + ax_0 + b + 3 = 2x_0^2 + ax_0 + b + 3 = 0$, 整理得 $x_0 a + b + 2x_0^2 + 3 = 0$, 即 (a, b) 可看成直线 $x_0 a + y + 2x_0^2 + 3 = 0$ 上一点.

原点到直线 $x_0 a + y + 2x_0^2 + 3 = 0$ 的距离 $d = \frac{|2x_0^2 + 3|}{\sqrt{x_0^2 + 1}}$,

所以 $a^2 + b^2 \geq d^2 = \frac{(2x_0^2 + 3)^2}{x_0^2 + 1}$.

设 $x_0^2 + 1 = t (t \geq 2)$, 则 $\frac{(2x_0^2 + 3)^2}{x_0^2 + 1} = \frac{4t^2 + 4t + 1}{t} = 4t + \frac{1}{t} + 4$. 因为 $y = 4t + \frac{1}{t} + 4 (t \geq 2)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $y_{\min} = 8 + \frac{1}{2} + 4 = \frac{25}{2}$, 即当 $|x_0| = 1$ 时, $a^2 + b^2$ 取得最小值 $\frac{25}{2}$, 故选 B.

9. $\left(x - \frac{10}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{64}{9}$ 【解析】设 $P(x, y)$, $\because |PA| = 2|PB|$,
 $\therefore \sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$, 即 $(x+2)^2 + y^2 = 4(x-2)^2 + 4y^2$, 化简可得 $\left(x - \frac{10}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{64}{9}$, 故点 P 的轨迹方程为 $\left(x - \frac{10}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{64}{9}$.

10. 5 【解析】由题易知 $A(0, 0)$, $mx = y + m - 3$ 可化为 $m(x-1) - (y-3) = 0$, 可得 $B(1, 3)$. 因为 $1 \times m + m \times (-1) = 0$, 所以 l_1 与 l_2 互相垂直, 所以 $|MA|^2 + |MB|^2 = |AB|^2 = 10$, 所以 $10 \geq 2|MA| \cdot |MB|$, 即 $|MA| \cdot |MB| \leq 5$, 当且仅当 $|MA| = |MB|$ 时取等号, 故 $|MA| \cdot |MB|$ 的最大值为 5.


11. -1 3 【解析】 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ 可化为 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$, 故圆心 $C(1, 2)$, 半径 $r = 2$.
 因为圆 C 上存在两点关于直线 $l: x + my + 1 = 0$ 对称, 所以直线 l 过圆心 $C(1, 2)$, 所以 $1 + 2m + 1 = 0$, 解得 $m = -1$.
 过点 $M(-1, -1)$ 作圆 C 的切线, 切点为 P , 则 $|MP| = \sqrt{(1+1)^2 + (2+1)^2} = 4 = 3$.

12. 1 0 或 6 【解析】圆 C 的方程可化为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 则圆心 $C(1, 0)$, 半径为 1, 直线 l 的方程可化为 $(k+1)x - y - 2k = 0$.
 易知当直线 l 经过圆心 C 时, $|AB|$ 取得最大值, 此时 $k = 1$.

设 $\angle ACB = \theta$, 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin \theta = \frac{1}{2} \sin \theta$, 故当 $\theta = 90^\circ$ 时, $\triangle ABC$ 的面积最大, 此时圆心 C 到直线 l 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 即

$\frac{|1-k|}{\sqrt{(k+1)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 解得 $k = 0$ 或 $k = 6$.

13. $[0, 3\sqrt{5} - 6]$ 【解析】如图, 过点 P 作射线 PC_2 , 交圆 C_2 于点 M, N , 可得 $\begin{cases} |PM| \cdot |PN| = |PA| \cdot |PB|, \\ |PM| = |PC_2| - 1, \\ |PN| = |PC_2| + 1. \end{cases}$
 设 $|AB| = x$, 因为 $|PA| = 2|AB|$, 所以 $|PC_2|^2 - 1 = 2|AB| \cdot 3|AB| = 2x \cdot 3x$, 则 $|PC_2|^2 = 6x^2 + 1$. 又 $x \in (0, 2]$, 所以 $|PC_2|^2 \in (1, 25]$, 由题知 $C_2(-4, 0)$, 故 $1 < (x_0 + 4)^2 + y_0^2 \leq 25$, 将 $y_0^2 = 4x_0$ 代入, 得 $1 < x_0^2 + 12x_0 + 16 \leq 25$, 又 $x_0 \geq 0$, 可得 $x_0 \in [0, 3\sqrt{5} - 6]$.



小题 16 椭圆及其标准方程

1. C 【解析】方法一: 设所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 半焦距为 c , 由椭圆 $\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1$ 的焦点为 $(0, -4), (0, 4)$, 知 $c = 4$.

由椭圆的定义知, $2a = \sqrt{(\sqrt{3}-0)^2 + (-\sqrt{5}+4)^2} + \sqrt{(\sqrt{3}-0)^2 + (-\sqrt{5}-4)^2}$, 解得 $a = 2\sqrt{5}$, 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $b^2 = 4$, 所以所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{20} + \frac{x^2}{4} = 1$, 故选 C.

方法二: 设所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{25-k} + \frac{x^2}{9-k} = 1 (k < 9)$, 则由题意得 $\frac{5}{25-k} + \frac{3}{9-k} = 1$, 解得 $k = 5$ 或 $k = 21$ (舍), 所以所求椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{20} + \frac{x^2}{4} = 1$, 故选 C.

2. D 【解析】由题意知 $F_2(1, 0)$, 将 $x = 1$ 代入方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 中, 可得 $y = \pm \frac{3}{2}$, 故 $|AB| = 3$, 则 $S_{\triangle ABF_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$. 因为 $\triangle ABF_1$ 的周长 $C = |AF_1| + |AF_2| + |BF_1| + |BF_2| = 8$, $S_{\triangle ABF_1} = \frac{1}{2} C \cdot r$, 所以 $\frac{1}{2} \times 8r = 3$, 解得 $r = \frac{3}{4}$, 故选 D.

3. A 【解析】由题可设椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 椭圆 C 的右焦点为 M , 连接 PM , 则 $|FM| = 2|OF| = 10$. 由 $|OP| = |OF| = |OM|$ 知 $FP \perp PM$, 又 $|PF| = 6$, 所以 $|PM| = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$, 所以 $2a = |PF| + |PM| = 14$, 所以 $a = 7$. 又 $c = 5$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 49 - 25 = 24$, 所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$.

4. A 【解析】因为圆 O 与直线 BF 相切, 所以圆 O 的半径为 $\frac{bc}{a}$, 即 $|OC| = \frac{bc}{a}$, 因为四边形 $FAMN$ 是平行四边形, 所以点 M 的坐标为 $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{bc}{a}\right)$, 代入椭圆方程得 $\frac{(a+c)^2}{4a^2} + \frac{c^2 b^2}{a^2 b^2} = 1$, 所以 $5e^2 + 2e - 3 = 0$, 又 $0 < e < 1$, 所以 $e = \frac{3}{5}$. 故选 A.

5. A 【解析】设椭圆 C_1 和双曲线 C_2 的离心率分别为 e_1, e_2 . 连接 AF_2, BF_2 , 由题易知四边形 AF_1BF_2 为矩形. 在 $Rt\triangle AF_1F_2$ 中, $|F_1F_2| = 2c$, $\angle AF_1F_2 = \frac{\pi}{3}$, 所以 $|AF_1| = c$, $|AF_2| = \sqrt{3}c$, 则 $e_1 = \frac{2c}{\sqrt{3}c + c} = \sqrt{3} - 1$, $e_2 = \frac{2c}{\sqrt{3}c - c} = \sqrt{3} + 1$, 所以 $e_1 + e_2 = 2\sqrt{3}$. 故选 A.

6. D 【解析】由 $\begin{cases} y = \sqrt{3}x, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 得 $(3a^2 + b^2)x^2 = a^2 b^2$, 解得 $x = \pm \frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}$, 可得 $y = \pm \frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}$.
 不妨令 $A\left(\frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}, \frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}\right)$, $B\left(-\frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}, -\frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}\right)$,
 则 $\overrightarrow{AF} = \left(-c - \frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}, -\frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}\right)$, $\overrightarrow{BF} = \left(-c + \frac{ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}, \frac{\sqrt{3}ab}{\sqrt{3a^2 + b^2}}\right)$.