



依据最新**浙江省**普通高中  
学业水平考试说明编写

# 全品学考 冲A方案

主编 肖德好

本册主编：高明山

编 者：高明山 沈联晖 吴旻玲

特约主审：叶利民 沈新权

## 高中数学

【知识清单】

## 序/PREFACE


这是一本教辅资料，愿意为其作序是由“全品”这个品牌的品质决定的。

在教育类图书中，教辅一直扮演着低调的角色。它不像教材那么高大上，能够引领教学的方向，但一本用心的教辅图书却能够真真实实地解决教学中的实际问题。我觉得“全品”这个品牌的教辅用书一直是众多教辅用书中的佼佼者，不仅能够帮助学生高效备考，也有助于辅助教师教学的开展。

浙江嘉兴市第一中学副校长、特级教师

沈新权

· 本书专为2018级学生备考学考而设计的教辅资料



分册1 · 知识清单



分册2 · 课时通关



分册3 · 备考大卷

**标准：**本书依据最新浙江省《普通高中学业水平考试说明》编写。严格落实标准的关键三方面：一是符合标准要求的内容范围；二是落实考点的层次要求，做到主次有别；三是围绕样题，关注不同考点、不同难易层度试题的命题要求，做到命题背景、问题层度、考查考点与能力、学科素养多维度的合理体现。

**结构：**学考过关不难，要冲A也不易。学考真题题量大、陷阱多、也有几道有区分度试题。本书含三个分册，实现冲A目标。分册1、2：依据标准，覆盖内容全面、易错针对性点拨、突出b、c层级要求，夯实到位；分册3：“单元卷”固根基，“仿真卷”知动态，“真题卷”熟考情。各学校也可以根据备考时间与备考目标的不同，自由选择组合各单本。

**选题：**浙江自主命制学考真题，试题特色明显，难点较明确。本书选用最新的浙江各地区、名校的学考模拟试题，以及浙江的典型题为主。打造真真正正的浙江专版学考备考资料。

**难度：**本书严格控制难度，保证全书难度不大，严格落实不同层次考点选题难度的差异性。

全心全意 品质为真

# 目 录 Contents

## 〈 知识清单 〉

### • 模块一 必修 1

第 1 讲 集合	知 001
第 2 讲 函数及其基本性质	知 002
第 3 讲 基本初等函数 I	知 004
第 4 讲 函数与方程	知 006
第 5 讲 函数模型及其应用	知 007

### • 模块二 必修 4

第 1 讲 任意角的三角函数和诱导公式	知 009
第 2 讲 三角函数的图像和性质	知 010
第 3 讲 平面向量的基本概念、线性运算及坐标表示	知 012
第 4 讲 平面向量的数量积	知 013
第 5 讲 三角恒等变换	知 015

### • 模块三 必修 5

第 1 讲 正弦定理和余弦定理	知 016
第 2 讲 数列的概念、等差数列	知 017
第 3 讲 等比数列及数列的综合应用	知 018
第 4 讲 不等式的基本性质及一元二次不等式的解法	知 019

第 5 讲 二元一次不等式（组）与简单线性规划问题	知 021
第 6 讲 基本不等式和绝对值不等式	知 022

### • 模块四 必修 2

第 1 讲 空间几何体	知 024
第 2 讲 空间点、直线、平面之间的位置关系	知 026
第 3 讲 直线、平面平行与垂直的判定及其性质	知 027
第 4 讲 直线的方程	知 030
第 5 讲 圆的方程	知 031

### • 模块五 选修 2-1

第 1 讲 命题及其关系、充要条件	知 033
第 2 讲 曲线与方程	知 034
第 3 讲 椭圆	知 035
第 4 讲 双曲线	知 036
第 5 讲 抛物线	知 037
第 6 讲 立体几何问题中的向量方法	知 039

参考答案	知 041
------	-------

## 〈 课时通关 | 独立成册 〉

课时训练（一）	集合	课 053
课时训练（二）	函数及其基本性质	课 054
课时训练（三）	基本初等函数 I	课 056
课时训练（四）	函数与方程	课 058
课时训练（五）	函数模型及其应用	课 060
<b>A+</b> 微专题 1	函数有关的学考难点	课 061
课时训练（六）	任意角的三角函数和诱导公式	课 063
课时训练（七）	三角函数的图像和性质	课 064
课时训练（八）	平面向量的基本概念、线性运算及坐标表示	课 066
课时训练（九）	平面向量的数量积	课 067
课时训练（十）	三角恒等变换	课 068
课时训练（十一）	正弦定理和余弦定理	课 070
课时训练（十二）	数列的概念、等差数列	课 072
课时训练（十三）	等比数列及数列的综合应用	课 073
课时训练（十四）	不等式的基本性质及一元二次不等式的解法	课 075
课时训练（十五）	二元一次不等式（组）与简单线性规划问题	课 076

课时训练（十六）	基本不等式和绝对值不等式	课 077
<b>A+</b> 微专题 2	不等式有关的学考难点	课 078
课时训练（十七）	空间几何体	课 079
课时训练（十八）	空间点、直线、平面之间的位置关系	课 081
课时训练（十九）	直线、平面平行与垂直的判定及其性质	课 082
课时训练（二十）	直线的方程	课 084
课时训练（二十一）	圆的方程	课 085
课时训练（二十二）	命题及其关系、充要条件	课 086
课时训练（二十三）	曲线与方程	课 087
课时训练（二十四）	椭圆	课 088
课时训练（二十五）	双曲线	课 090
课时训练（二十六）	抛物线	课 091
课时训练（二十七）	立体几何问题中的向量方法	课 093

参考答案	课 095
------	-------

## 〈 备考大卷 | 独立成册 〉

模块过关卷 + 仿真模拟卷 + 学考真题卷

模块过关卷（一）	必修 1	卷 01
模块过关卷（二）	必修 4	卷 03
模块过关卷（三）	必修 5	卷 05
模块过关卷（四）	必修 2	卷 07
模块过关卷（五）	选修 2-1	卷 09

仿真模拟卷（一）	卷 11
仿真模拟卷（二）	卷 13
仿真模拟卷（三）	卷 15

仿真模拟卷（四）	卷 17
仿真模拟卷（五）	卷 19
仿真模拟卷（六）	卷 21

2019 年 6 月浙江省普通高中学业水平考试	卷 23
2019 年 1 月浙江省普通高中学业水平考试	卷 25

参考答案	卷 27
------	------

## 模块一 必修1

## &lt; 第1讲 集合 &gt;

## ◎ 【条目梳理】

## 一、集合的含义与表示(a)

(1)集合的含义:研究对象叫作元素,一些元素组成的总体叫作集合.集合元素的性质:确定性、无序性、互异性.

(2)元素与集合的关系:①属于,记为 $\in$ ;②不属于,记为 $\notin$ .




(3)集合的表示法(b):列举法、描述法和图示法.

(4)常用数集的记法:自然数集 $\mathbf{N}$ ,正整数集 $\mathbf{N}^*$ 或 $\mathbf{N}_+$ ,整数集 $\mathbf{Z}$ ,有理数集 $\mathbf{Q}$ ,实数集 $\mathbf{R}$ ,复数集 $\mathbf{C}$ .

## 二、集合间的基本关系(b)

表示		文字语言	记法
关系			
基本关系	子集	集合A中的元素都是集合B中的元素	$A \subseteq B$ (或 $B \supseteq A$ )
	真子集	集合A是集合B的子集,但集合B中至少有一个元素不属于集合A	$A \subsetneq B$ (或 $B \supsetneq A$ )
	相等	集合A,B的元素完全相同	$A = B$
空集		<u>不含</u> 任何元素的集合	$\emptyset$

## 三、集合的基本运算(b)

表示		文字语言	符号语言	图形语言	记法
运算					
交集	属于集合 A <u>且</u> 属于集合 B 的元素组成的 集合	$\{x \mid x \in A, \text{且 } x \in B\}$		$A \cap B$	
	属于集合 A <u>或</u> 属于集合 B 的元素组成的 集合	$\{x \mid x \in A, \text{或 } x \in B\}$		$A \cup B$	
	全集 U 中 <u>不</u> 属于集合 A 的所有元素 组成的集合	$\{x \mid x \in U, \text{且 } x \notin A\}$		$\complement_U A$	

## ◎ 【题型示例】

## 【考点1】集合的基本概念

例1 (1)[2019·衢州四校高一期中] 下列说法正确的是 ( )

A.  $\sqrt{2} \in \mathbf{N}$  B.  $-1 \in \mathbf{N}$  C.  $\frac{1}{2} \in \mathbf{N}$  D.  $9 \in \mathbf{N}$

(2)设集合  $A = \{-4, 2a-1, a^2\}$ ,  $B = \{9, a-5, 1-a\}$ , 且A,B中有唯一的公共元素9,则实数a的值为\_\_\_\_\_.

## 【考点2】集合间的基本关系

例2 (1)已知集合  $P = \{x | y = \sqrt{x+1}\}$ , 集合  $Q = \{y | y = \sqrt{x-1}\}$ , 则P与Q的关系是 ( )

A.  $P=Q$  B.  $P \supsetneq Q$  C.  $P \subsetneq Q$  D.  $P \cap Q = \emptyset$

(2)[2019·学军中学高一期中] 设集合  $A = \{x | 2 \leq x \leq 4\}$ ,  $B = \{x | 2a \leq x \leq a+3\}$ , 若B真包含于A,则实数a的取值范围是 ( )

A.  $[1, 3]$  B.  $(3, +\infty) \cup \{1\}$   
C.  $\{1\}$  D.  $(3, +\infty)$

【要点总结】(1)集合A,B满足  $A \subseteq B$  时,不要忽略集合A为空集的情况;

(2)根据集合间的关系求参数时,可以先用数轴将相应集合表示出来,进而转化为研究区间端点间的关系,得出参数所满足的条件.

## 【考点3】集合的运算

例3 (1)已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4\}$ , 若  $A = \{1, 3\}$ , 则  $\complement_U A =$  ( )

A.  $\{1, 2\}$  B.  $\{1, 4\}$  C.  $\{2, 3\}$  D.  $\{2, 4\}$

(2)已知集合  $A = \{x | -2 \leq x \leq 3\}$ ,  $B = \{x | x^2 + 2x - 8 > 0\}$ , 则  $A \cup B$  等于 ( )

A.  $(2, 3]$  B.  $(-\infty, -4) \cup [-2, +\infty)$   
C.  $[-2, 2)$  D.  $(-\infty, 3] \cup (4, +\infty)$

(3)如图M1-1-1中的阴影部分,可用集合符号表示为 ( )

A.  $(\complement_U A) \cap (\complement_U B)$   
B.  $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$   
C.  $(\complement_U B) \cap A$   
D.  $(\complement_U A) \cap B$




图 M1-1-1

(4)[2019·浙江4月学考] 已知集合  $A = \{1, 2\}$ , 集合  $B = \{2, 3\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_;  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_.

【要点总结】集合运算问题的常见类型及解题策略:

(1)离散型数集或抽象集合间的运算,常借助图示法求解;  
(2)连续型数集的运算,常借助数轴求解.





## 〈第 2 讲 函数及其基本性质〉

### ◎【条目梳理】

#### 一、函数与映射

	函数 (b)	映射 (a)
两个集合 $A, B$	设 $A, B$ 是两个 非空的数集	设 $A, B$ 是两个 非空的集合
对应关系 $f: A \rightarrow B$	如果按照某种确定的 对应关系 $f$ , 使对于 集合 $A$ 中的 <u>任意</u> 一个数 $x$ , 在集合 $B$ 中 都有 <u>唯一</u> 确定的 数 $f(x)$ 和它对应	如果按某一个确定的 对应关系 $f$ , 使对于 集合 $A$ 中的 <u>任意</u> 一个元素 $x$ , 在集合 $B$ 中都有 <u>唯一</u> 确定的 元素 $y$ 与之对应
名称	称 $f: A \rightarrow B$ 为从 集合 $A$ 到集合 $B$ 的一 个函数	称对应 $f: A \rightarrow B$ 为从集合 $A$ 到集合 $B$ 的一个映射
记法	$y = f(x), x \in A$	对应 $f: A \rightarrow B$

#### 二、函数的有关概念 (b)

(1) 函数的定义域、值域: 在函数  $y = f(x), x \in A$  中,  $x$  叫作自变量, 其中所有  $x$  组成的集合  $A$  叫作函数  $y = f(x)$  的定义域, 与  $x$  的值相对应的  $y$  值叫作函数值, 所有  $y$  组成的集合叫作函数  $y = f(x)$  的值域.

(2) 函数的三要素: 定义域、对应关系 和 值域.

(3) 函数的表示方法: 解析法、列表法、图像法.

#### 三、分段函数 (b)

在定义域的不同范围内函数具有不同的对应关系, 这类函数称为分段函数. 分段函数是一个函数, 分段函数的定义域是各段上“定义域”的并集、值域是各段上“值域”的并集.

#### 四、常见函数的定义域 (b)

(1) 分式函数中分母 不等于零.

(2) 偶次根式函数的被开方式 大于或等于 0.

(3) 一次函数、二次函数的定义域为  $\mathbf{R}$ .

(4)  $y = a^x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1), y = \sin x, y = \cos x$  的定义域均为  $\mathbf{R}$ .

(5)  $y = \tan x$  的定义域为  $\left\{ x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right\}$ .

(6) 函数  $y = \lg x$  的定义域为  $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x > 0\}$ .

#### 五、函数的单调性 (c)

(1) 增函数、减函数: 设函数  $f(x)$  的定义域为  $I$ , 如果对于定义域  $I$  内某个区间  $D$  上的任意两个自变量的值  $x_1, x_2$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 都有  $f(x_1) < f(x_2)$ , 那么就说函数  $f(x)$  在区

间  $D$  上是增函数; 当  $x_1 < x_2$  时, 都有  $f(x_1) > f(x_2)$ , 那么就说函数  $f(x)$  在区间  $D$  上是减函数.

(2) 函数的单调性: 若函数  $y = f(x)$  在区间  $D$  上是增函数或减函数, 则称函数  $y = f(x)$  在这一区间上具有(严格的)单调性, 区间  $D$  叫作  $y = f(x)$  的单调区间.

#### 六、函数的最值 (c)

前提	设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $I$ , 如果存在实数 $M$ 满足	
条件	(1) 对于任意 $x \in I$ , 都有 $f(x) \leq M$ ; (2) 存在 $x_0 \in I$ , 使得 $f(x_0) = M$	(1) 对于任意 $x \in I$ , 都有 $f(x) \geq M$ ; (2) 存在 $x_0 \in I$ , 使得 $f(x_0) = M$
结论	$M$ 为函数 $f(x)$ 的最大值	$M$ 为函数 $f(x)$ 的最小值

#### 七、函数的奇偶性 (c)

	偶函数	奇函数
条件	对于函数 $f(x)$ 的定义域内任意一个 $x$ , 都有	
	<u><math>f(-x) = f(x)</math></u>	<u><math>f(-x) = -f(x)</math></u>
结论	函数 $f(x)$ 是偶函数	函数 $f(x)$ 是奇函数
图像 对称性	关于 <u><math>y</math> 轴</u> 对称	关于 <u>原点</u> 对称

### ◎【题型示例】

#### 【考点 1】函数的概念

例 1 (1) 下列图像中, 不可能成为函数  $y = f(x)$  的图像的是 ( )




图 M1-2-1

(2) 下列各组函数中, 表示同一函数的是 ( )

A.  $f(x) = x - 1, g(x) = \frac{x^2}{x} - 1$

B.  $f(x) = |x|, g(x) = (\sqrt{x})^2$

C.  $f(x) = x, g(x) = \sqrt[3]{x^3}$

D.  $f(x) = 2x, g(x) = \sqrt{4x^2}$

[要点总结] (1) 判断一个对应关系是否为函数, 关键是确定对应关系是否是“一对一”或“多对一”, 同时应注意数集  $B$  中的元素不一定有对应元素.

(2) 当且仅当定义域和对应关系均相同时两个函数才是同一函数.

## 【考点2】函数的定义域与值域

例2 (1)[2019·浙江4月学考] 函数  $y=\log_3(x-2)$  的定义域为 ( )

- A.  $\{x|x>2\}$  B.  $\{x|x>0\}$   
C.  $\{x|x<2\}$  D.  $\mathbf{R}$

(2)函数  $f(x)=\begin{cases} 2x^2, & 0\leq x\leq 1, \\ 2, & 1<x<2, \\ x+1, & x\geq 2 \end{cases}$  的值域是 ( )

- A.  $\mathbf{R}$  B.  $(0, +\infty)$   
C.  $(0, 2) \cup (2, +\infty)$  D.  $[0, 2] \cup [3, +\infty)$

【要点总结】(1)求函数的定义域,以使函数的解析式所含运算有意义为准则,一般从以下几方面考虑:①若解析式是分式,则其分母不为零;②若解析式是偶次根式,则其被开方式非负(即不小于零);③如果函数解析式是由一些数学式子通过四则运算组合而成的,那么它的定义域是使各个数学式子都有意义的实数组成的集合.

(2)求函数值域可能有如下几种情况:①直接考察基本初等函数的值域;②利用函数的性质来确定函数的值域;③分段函数的值域是各部分值域的并集;④根据函数的图像观察而得.

## 【考点3】函数的表示方法

例3 (1)若函数  $f(x)$  是单调递增的一次函数,且满足  $f[f(x)]=16x+5$ ,则  $f(x)=$  ( )

- A.  $-4x-\frac{5}{3}$  B.  $4x-\frac{5}{3}$   
C.  $4x-1$  D.  $4x+1$

(2)[2019·浙江4月学考] 已知函数  $f(x)=\begin{cases} x^2, & |x|\leq 1, \\ x+1, & |x|>1, \end{cases}$  若  $f(x)=4$ ,则  $x$  的值为 ( )

- A. 2 或 -2 B. 2 或 3  
C. 3 D. 5

【要点总结】(1)对于分段函数,首先要确定自变量的值属于哪个区间,再选定相应的对应关系求解.

(2)若已知函数的类型(如一次函数、二次函数),则可用待定系数法求函数解析式.

## 【考点4】函数的单调性与最值

例4 [2019·绍兴高一期末] 已知函数  $f(x)=x^2-ax$ ,  $a\in\mathbf{R}$ . 记  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上的最大值为  $M$ ,最小值为  $m$ .

(1)若  $M=f(2)$ ,求  $a$  的取值范围;

(2)证明:  $M-m\geq\frac{1}{4}$ .

【要点总结】(1)利用定义证明函数  $f(x)$  在给定的区间  $D$  上的单调性的一般步骤:

①任取两个实数  $x_1, x_2\in D$ ,且  $x_1<x_2$ ;②作差;③变形(通常是因式分解、通分、配方);④判断符号(即判断  $f(x_1)-f(x_2)$  的正负);⑤得出结论(即指出函数  $f(x)$  在区间  $D$  上的单调性).

(2)求函数最值的常用方法:

①先确定函数的单调性,再由单调性求最值.②图像法:先作出函数在给定区间上的图像,再观察其最高点、最低点,求出最值.③配方法:对于二次函数或可化为二次函数形式的函数,可用配方法求解.④换元法:对较复杂的函数可通过换元转化为熟悉的函数,再用相应的方法求值域或最值.

## 【考点5】函数奇偶性的判断及性质

例5 (1)[2019·衢州四校高一期中] 下列哪个函数是其定义域上的偶函数 ( )

- A.  $y=x^2+|x|, x\in(-1, 1]$  B.  $y=x+1$   
C.  $y=2^x+2^{-x}$  D.  $y=\sqrt{x}$

(2)已知函数  $f(x)=\frac{a}{2}-\frac{3}{2^x+1}$  是  $\mathbf{R}$  上的奇函数,则  $a=$  \_\_\_\_\_.

【要点总结】(1)已知函数  $f(x)$  为奇函数,则函数  $f(x)$  的图像关于原点对称,若在  $x=0$  处有意义,则  $f(0)=0$ . 已知函数  $f(x)$  为偶函数,则函数  $f(x)$  的图像关于  $y$  轴对称.  
(2)用定义判断函数奇偶性的步骤:①求定义域,看定义域是否关于原点对称;②判断  $f(-x)=f(x)$  或  $f(-x)=-f(x)$  是否恒成立.

## 【考点6】函数中的恒成立问题

例6 已知函数  $f(x)=ax^2+x$ ,  $f(3)<f(4)$ ,且当  $n\geq 8, n\in\mathbf{N}^*$  时,  $f(n)>f(n+1)$  恒成立,则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

例7 已知函数  $f(x)=|x|+a$ ,  $g(x)=2|x-1|$ .

(1)若  $a=0$ ,解不等式  $f(x)\geq g(x)$ ;

(2)若对任意  $x\in\mathbf{R}$ ,  $f(x)\leq g(x)$  恒成立,求实数  $a$  的取值范围.

【要点总结】函数中的恒成立问题,一般要综合使用函数的性质,如单调性、奇偶性等;若含有参数,一般分离参数,转化为  $a>f(x)$  或  $a<f(x)$  恒成立,即  $a>f(x)_{\max}$  或  $a<f(x)_{\min}$ .

〈第 3 讲 基本初等函数 I〉

◎【条目梳理】

一、有理数指数幂

(1) 幂的有关概念:(b)

① 正分数指数幂:  $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$  ( $a > 0, m, n \in \mathbf{N}^*,$  且  $n > 1$ ).

② 负分数指数幂:  $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$  ( $a > 0, m, n \in \mathbf{N}^*,$  且  $n > 1$ ).

(2) 有理数指数幂的性质:(c)

①  $a^r a^s = a^{r+s}$  ( $a > 0, r, s \in \mathbf{Q}$ );



②  $(a^r)^s = a^{rs}$  ( $a > 0, r, s \in \mathbf{Q}$ );

③  $(ab)^r = a^r b^r$  ( $a > 0, b > 0, r \in \mathbf{Q}$ ).

二、指数函数的概念 (b)

一般地, 函数  $y = a^x$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 叫作指数函数, 其中  $x$  是自变量, 函数的定义域为  $\mathbf{R}$ .

三、指数函数的图像与性质 (c)

$y = a^x$	$a > 1$	$0 < a < 1$
图像		
性质	定义域: $\mathbf{R}$	
	值域: $(0, +\infty)$	
	过定点 $(0, 1)$ , 即 $x = 0$ 时, $y = 1$	
	当 $x > 0$ 时, $y > 1$ ; 当 $x < 0$ 时, $0 < y < 1$	当 $x > 0$ 时, $0 < y < 1$ ; 当 $x < 0$ 时, $y > 1$
	在 $(-\infty, +\infty)$ 上是增函数	在 $(-\infty, +\infty)$ 上是减函数



四、对数

概念 (b)	一般地, 如果 $a^x = N$ ( $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ), 那么数 $x$ 叫作以 $a$ 为底 $N$ 的对数, 记作 $x = \log_a N$ . 其中 $a$ 叫作对数的底数, $N$ 叫作真数, $\log_a N$ 叫作对数式	
性质 (c)	对数式与指数式的互化: $a^x = N \Leftrightarrow \log_a N = x$	$a > 0$ 且 $a \neq 1$
	$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1, a^{\log_a N} = N$	
	$\log_a (M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$	$a > 0$ 且 $a \neq 1, M > 0, N > 0$
	$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$	
换底公式 (a)	$\log_a M^n = n \log_a M$ ( $n \in \mathbf{R}$ )	
	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ( $a > 0$ 且 $a \neq 1, c > 0$ 且 $c \neq 1, b > 0$ )	

五、对数函数的概念 (b)

一般地, 我们把函数  $y = \log_a x$  ( $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 叫作对数函数, 其中  $x$  是自变量, 函数的定义域是  $(0, +\infty)$ .






六、对数函数的图像与性质 (c)

$y = \log_a x$	$a > 1$	$0 < a < 1$
图像		
性质	定义域: $(0, +\infty)$	
	值域: $\mathbf{R}$	
	过定点 $(1, 0)$ , 即 $x = 1$ 时, $y = 0$	
	当 $x > 1$ 时, $y > 0$ ; 当 $0 < x < 1$ 时, $y < 0$	当 $x > 1$ 时, $y < 0$ ; 当 $0 < x < 1$ 时, $y > 0$
	在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

七、幂函数

(1) 定义(a): 形如  $y = x^\alpha$  ( $\alpha \in \mathbf{R}$ ) 的函数称为幂函数, 其中  $x$  是自变量,  $\alpha$  是常数.

(2) 常见的五种幂函数的图像与性质比较(c)

特征 \ 函数	$y = x$	$y = x^2$	$y = x^3$	$y = x^{\frac{1}{2}}$	$y = x^{-1}$
性质					
图像					
定义域	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$\mathbf{R}$	$\{x   x \geq 0\}$	$\{x   x \neq 0\}$
值域	$\mathbf{R}$	$\{y   y \geq 0\}$	$\mathbf{R}$	$\{y   y \geq 0\}$	$\{y   y \neq 0\}$
奇偶性	奇	偶	奇	非奇非偶	奇
单调性	增	$(-\infty, 0]$ 上减, $(0, +\infty)$ 上增	增	增	$(-\infty, 0)$ , $(0, +\infty)$ 上减
公共点	$(1, 1)$				

## ◎ 【题型示例】

## 【考点1】指数与指数幂的运算

例1 (1)对任意的正实数 $a(a \neq 1)$ 及 $m, n \in \mathbf{Q}$ , 下列运算正确的是 ( )

- A.  $(a^m)^n = a^{m+n}$   
 B.  $(a^m)^n = am^n$   
 C.  $(a^m)^n = a^{m-n}$   
 D.  $(a^m)^n = a^{mn}$

(2)[2018·浙江11月学考] 计算 $\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{2}} =$  ( )

- A.  $\frac{81}{16}$  B.  $\frac{3}{2}$   
 C.  $\frac{9}{8}$  D.  $\frac{2}{3}$

## 【考点2】指数函数及其性质

例2 (1)设函数 $f(x) = \left(\frac{2}{e}\right)^x$ ,  $g(x) = \left(\frac{e}{3}\right)^x$ , 其中 $e$ 为自然对数的底数, 则 ( )

- A. 对于任意实数 $x$ , 恒有 $f(x) \geq g(x)$   
 B. 存在正实数 $x_0$ , 使得 $f(x_0) > g(x_0)$   
 C. 对于任意实数 $x$ , 恒有 $f(x) \leq g(x)$   
 D. 存在正实数 $x_0$ , 使得 $f(x_0) < g(x_0)$

(2)[2019·浙江4月学考] 函数 $f(x) = (3^{ax} - b)^2$ 的图像如图M1-3-1所示, 则 ( )




图 M1-3-1

- A.  $a > 0$  且  $b > 1$   
 B.  $a > 0$  且  $0 < b < 1$   
 C.  $a < 0$  且  $b > 1$   
 D.  $a < 0$  且  $0 < b < 1$

例3 设 $a \in \mathbf{R}$ , 函数 $f(x) = \frac{e^x + a}{e^x + 1}$  ( $e$ 为自然对数的底数).

- (1)若 $f(x)$ 为奇函数, 求 $a$ 的值;  
 (2)若关于 $x$ 的方程 $f(x) = \frac{a+2}{2}$ 在 $(-\infty, 0]$ 上有解, 求 $a$ 的取值范围.

【要点总结】 在利用指数函数的性质解决相关综合问题时, 要特别注意底数 $a$ 的取值范围, 并在必要时进行分类讨论.

## 【考点3】对数与对数运算

例4 (1) $\log_2 \frac{1}{4} =$  ( )

- A.  $-2$  B.  $-\frac{1}{2}$   
 C.  $\frac{1}{2}$  D.  $2$

(2)设 $\lg 2 = a$ ,  $\lg 3 = b$ , 则 $\log_{12} 10 =$  ( )

- A.  $\frac{1}{2a+b}$  B.  $\frac{1}{a+2b}$   
 C.  $2a+b$  D.  $a+2b$

【要点总结】 在对数运算中, 要熟练掌握对数的定义, 灵活运用对数的运算性质、换底公式对式子进行恒等变形, 多个对数式要尽量先化成同底的形式再进行运算.

## 【考点4】对数函数及其性质

例5 (1)[2018·浙江6月学考] 函数 $y = \log_2(x+1)$ 的定义域是 ( )

- A.  $(-1, +\infty)$   
 B.  $[-1, +\infty)$   
 C.  $(0, +\infty)$   
 D.  $[0, +\infty)$

(2)设 $a = 3\log_{\frac{1}{3}} 2$ ,  $b = \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$ ,  $c = \sqrt{\frac{2}{3}}$ , 则下列结论正确的是 ( )

- A.  $a < b < c$   
 B.  $a < c < b$   
 C.  $b < a < c$   
 D.  $b < c < a$



例 6 [2019·湖州高一期中] 已知函数  $f(x) = \lg \frac{1-ax}{x-1}$  的

图像关于原点对称,其中  $a$  为常数.

(1)求  $a$  的值,并求出  $f(x)$  的定义域;

(2)关于  $x$  的方程  $f(2^x) + 2\lg(2^x - 1) = b$  在  $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$  上有实数解,求  $b$  的取值范围.

[要点总结] 要牢记对数函数  $y = \log_a x$  的定义域为  $\{x | x > 0\}$ . 在解对数型方程、不等式问题时常利用相应的函数的单调性、奇偶性、图像等性质综合来求解.

### 【考点 5】幂函数

例 7 (1)若幂函数  $f(x) = x^a$  的图像过点  $(4, 2)$ , 则  $f(9)$  的值为 ( )

- A. 1 B. -3  
C.  $\pm 3$  D. 3

(2)[2019·宁波高一期末] 若幂函数  $f(x) = x^m$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减, 则实数  $m$  的值可能为 ( )

- A. 1 B.  $\frac{1}{2}$   
C. -1 D. 2

## < 第 4 讲 函数与方程 >

### ◎ 【条目梳理】

#### 一、函数的零点 (a)

对于函数  $y = f(x)$ , 使  $f(x) = 0$  的实数  $x$  叫作函数  $y = f(x)$  的零点.

#### 二、函数的零点与方程的根的关系 (a)

方程  $f(x) = 0$  有实数根  $\Leftrightarrow$  函数  $y = f(x)$  的图像与  $x$  轴有交点  $\Leftrightarrow$  函数  $y = f(x)$  有零点.

#### 三、函数零点的判定 (b)

如果函数  $y = f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的图像是连续不断的曲线, 并且有  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , 那么函数  $y = f(x)$  在区间  $(a, b)$  内有零点, 即存在  $c \in (a, b)$ , 使得  $f(c) = 0$ , 这个  $c$  也就是方程  $f(x) = 0$  的根.

### ◎ 【题型示例】

#### 【考点 1】零点所在区间的判定

例 1 [2019·台州五校高一期中] 函数  $f(x) = e^x + 4x - 3$  的零点所在的区间为 ( )

- A.  $\left(-\frac{1}{4}, 0\right)$  B.  $\left(0, \frac{1}{4}\right)$   
C.  $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$  D.  $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$

[要点总结] 函数零点所在区间的判定方法:

(1)定义法: 使用零点存在性定理.

特别提醒: ①  $y = f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的图像必须是连续不断的一条曲线, 否则结论不一定成立.

② 当  $f(a) \cdot f(b) < 0$  时,  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内至少有一个零点 (也可能存在多个零点).

(2)图像法: 若一个函数由两个初等函数的和 (或差) 构成, 则可考虑利用图像法求解. 如  $f(x) = g(x) - h(x)$ , 则可画出  $y = g(x)$  和  $y = h(x)$  的图像, 其交点横坐标即为函数  $f(x)$  的零点.

### 【考点 2】函数零点个数的判断

例 2 (1)若函数  $f(x) = x^2 - |x| - 6$ , 则  $f(x)$  的零点个数为 ( )

- A. 4  
B. 3  
C. 2  
D. 1

(2)函数  $f(x) = x^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{2}\right)^x$  的零点个数为 ( )

- A. 0  
B. 1  
C. 2  
D. 3

【要点总结】函数零点个数的判断方法：

- (1)直接求零点.令  $f(x)=0$ ,若能求出方程的根,则有几个不同的根就有几个不同的零点.
- (2)零点存在性定理.利用该定理不仅要求函数图像在区间  $[a,b]$ 上是连续不断的曲线,且  $f(a) \cdot f(b)<0$ ,还必须结合函数的图像与性质(如单调性、奇偶性)才能确定零点的个数.
- (3)利用图像交点的个数.将函数分为两个简单函数,画出两个函数的图像,看其交点的个数,其中交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.

### 【考点3】函数零点的应用

例3 (1)已知1是函数  $f(x)=ax^2+bx+c(a>b>c)$ 的一个零点.若存在实数  $x_0$ ,使得  $f(x_0)<0$ ,则  $f(x)$ 的另一个零点可能是 ( )

- A.  $x_0-3$   
B.  $x_0-\frac{1}{2}$

C.  $x_0+\frac{3}{2}$

D.  $x_0+2$

(2)[2018·浙江4月学考] 设  $a$  为实数,若函数  $f(x)=2x^2-x+a$  有零点,则函数  $y=f[f(x)]$ 零点的个数是 ( )

- A. 1 或 3  
B. 2 或 3  
C. 2 或 4  
D. 3 或 4

【要点总结】函数零点的应用主要表现在利用零点求参数的取值范围.通常可将问题转化为构造函数,利用函数的图像或性质求解.这样会使问题变得直观、简单,这也体现了数形结合的思想.

## < 第5讲 函数模型及其应用 >

### ◎【条目梳理】

#### 一、三种不同增长型函数模型(b)

函数 性质	$y=a^x(a>1)$	$y=\log_a x(a>1)$	$y=x^n(n>0)$
在 $(0,+\infty)$ 上的单调性	单调 <u>递增</u>	单调 <u>递增</u>	单调递增
增长速度	越来越快	越来越慢	相对平稳
图像的变化	随 $x$ 的增大逐渐表现为与 <u><math>y</math> 轴</u> 平行	随 $x$ 的增大逐渐表现为与 <u><math>x</math> 轴</u> 平行	随 $n$ 值变化而各有不同
值的比较	存在一个 $x_0$ , 当 $x>x_0$ 时, 有 $\log_a x<x^n<a^x$		

#### 二、几类常见的函数模型(c)

- (1)一次函数模型:  $f(x)=kx+b(k,b$  为常数,  $k\neq 0)$ .
- (2)二次函数模型:  $f(x)=ax^2+bx+c(a,b,c$  为常数,  $a\neq 0)$ .
- (3)指数函数模型:  $f(x)=ab^x+c(a,b,c$  为常数,  $a\neq 0, b>0, b\neq 1)$ .
- (4)对数函数模型:  $f(x)=m\log_a x+n(m,n,a$  为常数,  $m\neq 0, a>0, a\neq 1)$ .
- (5)幂函数模型:  $f(x)=ax^n+b(a,b,n$  为常数,  $a\neq 0)$ .
- (6)分段函数模型.
- (7)“双勾”函数模型:  $y=ax+\frac{b}{x}(a>0, b>0)$ .

#### 三、应用已知函数模型解决实际问题的基本步骤(c)

第一步,审题,设出变量.

第二步,根据所给模型,列出函数关系式.

第三步,解函数模型.

第四步,将所得结论“还原”成具体问题的解答.

### ◎【题型示例】

#### 【考点1】一次、二次、“双勾”函数模型的应用

例1 某桶装水经营部每天的房租、人员工资等固定成本为200元,每桶水的进价是5元.当销售单价为6元时,日均销售量为480桶.根据数据分析,销售单价在进价基础上每增加1元,日均销售量就减少40桶.为了使日均销售利润最大,销售单价应定为 ( )

- A. 6.5 元  
B. 8.5 元  
C. 10.5 元  
D. 11.5 元

【要点总结】(1)有些问题的两个变量之间是二次函数关系,如面积问题、利润问题、产量问题等.解决这类问题时,一般构建二次函数模型,利用二次函数的图像与性质求解.  
(2)在解决函数的应用问题时,一定要注意其定义域.

#### 【考点2】指数、对数函数模型的应用

例2 某种细菌经过1h培养,可繁殖为原来的2倍,则10个该种细菌经过7h培养能达到的个数为 ( )

- A. 640  
B. 1280  
C. 2560  
D. 5120



**例 3** 某品牌汽车公司 2019 年的销量目标为 39.3 万辆. 2016 年, 该品牌汽车年销量为 8 万辆; 2017 年, 该品牌汽车年销量为 18 万辆; 2018 年, 该品牌汽车年销量为 30 万辆. 如果分别将 2016, 2017, 2018, 2019 年定义为第 1, 2, 3, 4 年, 现在有两个函数模型: 二次函数模型  $y_1 = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ , 指数函数模型  $y_2 = a \cdot b^x + c (a \neq 0, b \neq 1, b > 0)$ , 那么哪个模型能更好地反映该公司年销量  $y$  (万辆) 与第  $x$  年的关系?

**[要点总结]** (1) 指数函数模型常与增长率相结合进行考查, 在实际问题中有人口增长、银行利率、细胞分裂等增长问题可以利用指数函数模型来表示.

(2) 应用指数、对数函数模型时, 先设定模型, 再将已知数据代入求解, 确定参数, 从而确定函数模型.

### 【考点 3】分段函数模型的应用

**例 4** 国家规定个人稿费纳税方法为: 不超过 800 元的不纳税, 超过 800 元且不超过 4000 元的按超过 800 元的部分的 14% 纳税, 超过 4000 元的按全部稿费的 11.2% 纳税. 设某人所得稿费为  $x$  元, 纳税额为  $y$  元.

(1) 建立  $y$  与  $x$  的函数关系.

(2) 某人出了一本书, 获得 20 000 元的个人稿费, 则此人需要纳税多少元?

(3) 某人发表一篇文章共纳税 70 元, 则此人的稿费是多少元?

**例 5** 某市居民自来水收费标准如下: 每户每月用水不超过 4 吨时, 每吨为 2.1 元; 当用水超过 4 吨时, 超过部分每吨 3 元. 某月甲、乙两用户共交水费  $y$  元, 已知甲、乙两用户该月的用水量分别为  $5x$  吨、 $3x$  吨.

(1) 求  $y$  关于  $x$  的函数;

(2) 如果甲、乙两用户该月共交水费 40.8 元, 分别求出甲、乙两用户该月的用水量和水费.

**[要点总结]** (1) 分段函数在每一段上自变量变化所遵循的规律不同, 求解析式时可以先将其当作几个问题, 将各段的解析式分别求出来, 再将其合到一起. 要注意各段自变量的取值范围, 特别是端点值.

(2) 构造分段函数时, 要力求准确、简洁, 做到不重不漏.

(3) 分段函数的最值是各段的最大(最小)值中的最大(最小)者.



# 参考答案

## 模块一 必修1

### 第1讲 集合

#### 【题型示例】

##### 考点1 集合的基本概念

例1 (1)D (2)-3 [解析] (1)对于A,  $\sqrt{2}$ 是无理数,所以  $\sqrt{2} \in \mathbf{N}$  不正确;对于B,  $-1 < 0$ ,所以  $-1 \in \mathbf{N}$  不正确;对于C,  $\frac{1}{2}$

不是自然数,所以  $\frac{1}{2} \in \mathbf{N}$  不正确. 故选D.

(2)  $\because$  集合A, B中有唯一的公共元素9,  $\therefore 9 \in A$ . 若  $2a-1=9$ , 则  $a=5$ , 此时  $A=\{-4, 9, 25\}$ ,  $B=\{9, 0, -4\}$ , 则集合A, B中有两个公共元素-4, 9, 与题意矛盾, 舍去. 若  $a^2=9$ , 则  $a=\pm 3$ , 当  $a=3$  时,  $A=\{-4, 5, 9\}$ ,  $B=\{9, -2, -2\}$ , B中有两个元素均为-2, 与集合元素的互异性矛盾, 舍去; 当  $a=-3$  时,  $A=\{-4, -7, 9\}$ ,  $B=\{9, -8, 4\}$ , 符合题意. 综上所述,  $a=-3$ .

##### 考点2 集合间的基本关系

例2 (1)B (2)C [解析] (1)由  $x+1 \geq 0$ , 得  $x \geq -1$ , 所以  $P=[-1, +\infty)$ , 又由  $y=\sqrt{x-1} \geq 0$ , 得  $Q=[0, +\infty)$ , 所以  $P \supsetneq Q$ .

(2)由已知得集合B是集合A的真子集. 当  $B=\emptyset$  时,  $2a > a+3$ ,

解得  $a > 3$ ; 当  $B \neq \emptyset$  时,  $\begin{cases} 2a \leq a+3, \\ 2a \geq 2, \\ a+3 \leq 4, \end{cases}$  解得  $a=1$ , 此时  $A=B$ , 不符合题意. 故a的取值范围是  $\{a|a > 3\}$ , 故选C.

##### 考点3 集合的运算

例3 (1)D (2)B (3)C (4){2} {1, 2, 3} [解析] (1)由补集的定义知  $\complement_U A=\{2, 4\}$ .

(2)由  $x^2+2x-8 > 0$  得  $(x-2)(x+4) > 0$ , 解得  $x < -4$  或  $x > 2$ , 即  $B=(-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$ .  $\because A=[-2, 3]$ ,  $\therefore A \cup B=(-\infty, -4) \cup [-2, +\infty)$ . 故选B.

(3)根据补集、交集的定义, 应选C.

(4)根据集合交集、并集的定义, 得  $A \cap B=\{2\}$ ,  $A \cup B=\{1, 2, 3\}$ .

### 第2讲 函数及其基本性质

#### 【题型示例】

##### 考点1 函数的概念

例1 (1)A (2)C [解析] (1)当  $x=0$  时, 有两个y值与之对应, 故A不可能是函数  $y=f(x)$  的图像.

(2)对于A,  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $g(x)$  的定义域为  $\{x|x \neq 0\}$ , 则  $f(x)$  与  $g(x)$  不表示同一函数; 对于B,  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $g(x)$  的定义域为  $\{x|x \geq 0\}$ , 则  $f(x)$  与  $g(x)$  不表示同一函数; 对于C,  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $g(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ , 且  $g(x)=x=f(x)$ , 则  $f(x)$  与  $g(x)$  表示同一函数; 对于D,  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $g(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $g(x)=2|x|$ , 则  $f(x)$  与  $g(x)$  不表示同一函数. 故选C.

##### 考点2 函数的定义域与值域

例2 (1)A (2)D [解析] (1)根据对数函数的真数大于0知,  $x-2 > 0$ , 则  $x > 2$ , 故选A.

(2)当  $0 \leq x \leq 1$  时,  $f(x)=2x^2 \in [0, 2]$ ; 当  $1 < x < 2$  时,  $f(x)=2$ ; 当  $x \geq 2$  时,  $f(x)=x+1 \geq 3$ . 所以函数  $f(x)$  的值域是  $[0, 2] \cup [3, +\infty)$ .

##### 考点3 函数的表示方法

例3 (1)D (2)C [解析] (1)设  $f(x)=kx+b(k > 0)$ , 则  $f[f(x)]=k(kx+b)+b=k^2x+kb+b=16x+5$ ,

所以  $\begin{cases} k^2=16, \\ k > 0, \end{cases}$  解得  $\begin{cases} k=4, \\ b=1, \end{cases}$  所以  $f(x)=4x+1$ .

(2)当  $|x| \leq 1$  时,  $f(x)=x^2 \leq 1$ , 所以若  $f(x)=4$ , 则  $|x| > 1$  且  $x+1=4$ , 解得  $x=3$ , 故选C.

##### 考点4 函数的单调性与最值

例4 解: (1)由已知得  $f(x)$  的图像开口向上, 且  $f(1)=1-a$ ,  $f(2)=4-2a$ , 又  $f(2) \geq f(1)$ ,  $\therefore 4-2a \geq 1-a$ , 即  $a \leq 3$ ,  $\therefore a$  的取值范围为  $(-\infty, 3]$ .

(2)证明: 函数  $f(x)=x^2-ax$  的图像的对称轴方程为  $x=\frac{a}{2}$ .

①当  $\frac{a}{2} \geq 2$ , 即  $a \geq 4$  时,  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上单调递减,

$\therefore M=f(1)=1-a$ ,  $m=f(2)=4-2a$ ,

$\therefore M-m=1-a-4+2a=a-3 \geq 1 > \frac{1}{4}$ .

②当  $\frac{a}{2} \leq 1$ , 即  $a \leq 2$  时,  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上单调递增,

$\therefore M=f(2)=4-2a$ ,  $m=f(1)=1-a$ ,

$\therefore M-m=4-2a-1+a=3-a \geq 1 > \frac{1}{4}$ .

③当  $2 < a < 3$  时,  $M=f(2)=4-2a$ ,  $m=f\left(\frac{a}{2}\right)=-\frac{1}{4}a^2$ ,

$\therefore M-m=4-2a+\frac{1}{4}a^2$ , 又  $y=4-2a+\frac{1}{4}a^2$  在  $(2, 3)$  上为减函数,  $\therefore M-m > \frac{1}{4}$ .

④当  $3 \leq a < 4$  时,  $M=f(1)=1-a$ ,  $m=f\left(\frac{a}{2}\right)=-\frac{1}{4}a^2$ ,

$\therefore M-m=1-a+\frac{1}{4}a^2$ , 又  $y=1-a+\frac{1}{4}a^2$  在  $[3, 4)$  上为增函数,

$\therefore M-m \geq \frac{1}{4}$ .

综上所述,  $M-m \geq \frac{1}{4}$ .

##### 考点5 函数奇偶性的判断及性质

例5 (1)C (2)3 [解析] (1)对于A, 函数  $y=x^2+|x|$ ,  $x \in (-1, 1]$  的定义域不关于原点对称, 所以函数是非奇非偶函数; 对于B, 显然函数  $y=x+1$  是非奇非偶函数; 对于C, 设函数  $f(x)=2^x+2^{-x}$ , 则其定义域为  $\mathbf{R}$ , 且  $f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$ , 所以函数  $y=2^x+2^{-x}$  是定义域上的偶函数; 对于D, 函数  $y=\sqrt{x}$  的定义域为  $[0, +\infty)$ , 其定义域不关于原点对称, 所以函数  $y=\sqrt{x}$  为非奇非偶函数. 故选C.

(2)方法一:  $\because$  函数  $f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的奇函数,

$\therefore f(0)=0$ , 即  $f(0)=\frac{a}{2}-\frac{3}{2}=0$ , 解得  $a=3$ .

经检验当  $a=3$  时,  $f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的奇函数.

方法二:  $f(-x)=\frac{a}{2}-\frac{3}{2^{-x}+1}=\frac{a}{2}-\frac{3 \times 2^x}{2^x+1}$ ,  $\therefore$  函数  $f(x)$  是定义

在  $\mathbf{R}$  上的奇函数,  $\therefore f(-x)+f(x)=0$ , 即  $\frac{a}{2}-\frac{3}{2^x+1}+\frac{a}{2}-$



$$\frac{3 \times 2^x}{2^x + 1} = a - \frac{3(2^x + 1)}{2^x + 1} = a - 3 = 0, \text{ 解得 } a = 3.$$

#### 考点 6 函数中的恒成立问题

**例 6**  $\left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{17}\right)$  **[解析]** 当  $n \geq 8, n \in \mathbf{N}^+$  时,  $f(n) > f(n+1)$  恒成立,  $\therefore a < 0$ , 且  $-\frac{1}{2a} < \frac{17}{2}$ , 解得  $a < -\frac{1}{17}$ , 又  $f(3) < f(4)$ ,  $\therefore 9a + 3 < 16a + 4$ , 解得  $a > -\frac{1}{7}$ ,  $\therefore a \in \left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{17}\right)$ .

**例 7 解:** (1) 若  $a = 0$ , 则由  $f(x) \geq g(x)$ , 得  $|x| \geq 2|x-1|$ , 即  $3x^2 - 8x + 4 \leq 0$ , 解得  $\frac{2}{3} \leq x \leq 2$ ,

所以不等式  $f(x) \geq g(x)$  的解集为  $\left[\frac{2}{3}, 2\right]$ .

(2) 若对任意  $x \in \mathbf{R}, f(x) \leq g(x)$  恒成立, 即  $|x| + a \leq 2|x-1|$  恒成立. 令  $h(x) = 2|x-1| - |x|$ , 则  $a \leq h(x)_{\min}$ .

$$\text{因为 } h(x) = 2|x-1| - |x| = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0, \\ 2-3x, & 0 < x < 1, \\ x-2, & x \geq 1. \end{cases}$$

当  $x \leq 0$  时,  $h(x) = 2-x \geq 2$ ;

当  $0 < x < 1$  时,  $h(x) = 2-3x \in (-1, 2)$ ;

当  $x \geq 1$  时,  $h(x) = x-2 \geq -1$ .

所以  $h(x)_{\min} = -1$ ,

故  $a \leq -1$ , 即实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -1]$ .

### 第 3 讲 基本初等函数 I

#### 【题型示例】

##### 考点 1 指数与指数幂的运算

**例 1** (1) D (2) B **[解析]** (1) 由指数幂的运算性质, 易知选 D.

$$(2) \left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}.$$

##### 考点 2 指数函数及其性质

**例 2** (1) D (2) C **[解析]** (1) 因为  $\frac{f(x)}{g(x)} = \left(\frac{6}{e^x}\right)^x$ , 而  $0 <$

$\frac{6}{e^x} < 1$ , 所以当  $x > 0$  时,  $\left(\frac{6}{e^x}\right)^x < 1$ , 故选 D.

(2) 若  $a > 0$ , 则当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x) \rightarrow +\infty$ , 不符合题意; 若  $a = 0$ , 则  $3^{ax} = 1, f(x) = (1-b)^2$ , 不符合题意, 所以  $a < 0$ . 由图可知,  $f(x)$  的零点  $x_0 < 0$ , 又  $3^{ax_0} - b = 0$ , 所以  $b = 3^{ax_0}$ , 因为  $a < 0$ , 所以  $b > 1$ , 故选 C.

**例 3 解:** (1) 由  $f(x) = \frac{e^x + a}{e^x + 1}$  为  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 得  $f(0) = 0$ , 即

$$\frac{1+a}{1+1} = 0, \text{ 解得 } a = -1. \text{ 此时 } f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1},$$

所以  $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$ , 因此  $a = -1$  满足题意.

(2) 令  $\frac{e^x + a}{e^x + 1} = \frac{a+2}{2}$ , 化简得  $ae^x = a - 2$  (\*), 易知  $a \neq 0$ .

① 当  $x = 0$  时, (\*) 不成立;

② 当  $x < 0$  时,  $e^x = \frac{a-2}{a}$ , 此时  $e^x \in (0, 1)$ , 则  $0 < \frac{a-2}{a} < 1$ , 解得  $a > 2$ .

综上所述,  $a$  的取值范围为  $(2, +\infty)$ .

##### 考点 3 对数与对数运算

**例 4** (1) A (2) A **[解析]** (1)  $\log_2 \frac{1}{4} = -2 \log_2 2 = -2$ .

(2) 因为  $\lg 2 = a, \lg 3 = b$ , 所以  $\log_{10} 10 = \frac{1}{\lg(2^2 \times 3)} = \frac{1}{2\lg 2 + \lg 3} = \frac{1}{2a + b}$ .

##### 考点 4 对数函数及其性质

**例 5** (1) A (2) B **[解析]** (1) 由对数函数的定义知  $x+1 > 0$ ,

解得  $x > -1$ , 故选 A.

(2)  $\because a = 3 \log_{\frac{1}{3}} 2 < 3 \log_{\frac{1}{3}} 1 = 0, b = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} > \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2} = 1, 0 < c =$

$\sqrt{\frac{2}{3}} < \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 1, \therefore a < c < b$ . 故选 B.

**例 6 解:** (1)  $\because$  函数  $f(x) = \lg \frac{1-ax}{x-1}$  的图像关于原点对称,  $\therefore$  函数  $f(x) = \lg \frac{1-ax}{x-1}$  为奇函数, 即  $f(-x) + f(x) = 0$ ,

$$\therefore \lg \frac{1+ax}{-x-1} + \lg \frac{1-ax}{x-1} = 0, \text{ 且 } a \neq 1, \therefore \lg \frac{(1+ax)(1-ax)}{(1-x)(1+x)} = 0,$$

$$\therefore \frac{(1+ax)(1-ax)}{(1-x)(1+x)} = 1, \text{ 整理可得, } (a^2 - 1)x^2 = 0 \text{ 恒成立,}$$

解得  $a = 1$  (舍) 或  $a = -1$ ,  $\therefore f(x) = \lg \frac{1+x}{x-1}$ , 由  $\frac{1+x}{x-1} > 0$  可得,  $x < -1$  或  $x > 1$ ,

即函数  $f(x)$  的定义域为  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ .

(2)  $\because$  关于  $x$  的方程  $f(2^x) + 2 \lg(2^x - 1) = b$  在  $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$  上有实

数解,  $\therefore \lg \frac{2^x + 1}{2^x - 1} + 2 \lg(2^x - 1) = \lg[(2^x + 1)(2^x - 1)] = \lg(2^{2x} -$

$1) = b$  在  $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$  上有实数解.

设  $u(x) = 2^{2x} - 1$ , 则  $u(x)$  为增函数, 又  $y = \lg x$  为增函数,

$\therefore$  函数  $y = \lg(2^{2x} - 1)$  在  $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$  上为增函数,

$\therefore 0 \leq y \leq \lg 7$ , 则  $b \in [0, \lg 7]$ .

##### 考点 5 幂函数

**例 7** (1) D (2) C **[解析]** (1) 由题意可得  $4^x = 2$ ,  $\therefore \alpha = \frac{1}{2}$ , 则

幂函数的解析式为  $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$ ,  $\therefore f(9) = 9^{\frac{1}{2}} = 3$ .

(2)  $\because$  幂函数  $f(x) = x^m$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递减,  $\therefore m < 0$ , 由选项可知, 实数  $m$  的值可能为  $-1$ . 故选 C.

### 第 4 讲 函数与方程

#### 【题型示例】

##### 考点 1 零点所在区间的判定

**例 1** C **[解析]** 易知函数  $f(x) = e^x + 4x - 3$  在  $(-\infty, +\infty)$  上为增函数,  $\therefore f\left(\frac{1}{4}\right) = e^{\frac{1}{4}} + 1 - 3 < 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e} + 2 - 3 = \sqrt{e} -$

$1 > 0, \therefore f\left(\frac{1}{4}\right) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, \therefore$  函数  $f(x) = e^x + 4x - 3$  的零点

所在的区间为  $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ . 故选 C.

##### 考点 2 函数零点个数的判断


**例 2** (1) C (2) B **[解析]** (1) 当  $x \geq 0$  时, 令  $f(x) = x^2 - x - 6 = 0$ , 得  $x = -2$  或  $3, \therefore x = 3$ ;

当  $x < 0$  时, 令  $f(x) = x^2 + x - 6 = 0$ , 得  $x = 2$  或  $-3, \therefore x = -3$ .  $\therefore f(x)$  的零点个数为 2.

(2) 令  $f(x) = x^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0$ , 得  $x^{\frac{1}{2}} =$

$\left(\frac{1}{2}\right)^x$ , 求  $f(x)$  的零点个数可转化为求函数

$y = x^{\frac{1}{2}}$  与  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  的图像的交点个数. 由



图可知, 两函数图像有 1 个交点, 故选 B.

##### 考点 3 函数零点的应用

**例 3** (1) B (2) C **[解析]** (1) 易知  $f(1) = a + b + c = 0$ , 又  $a > b > c$ , 所以  $a > 0, c < 0$ , 则  $b^2 - 4ac > 0$ , 故函数  $f(x)$  有两个零点. 设另一个零点为  $m$ , 则  $f(x) = a(x-1)(x-m) = a[x^2 + (-1-m)x + m]$ , 所以  $b = a(-1-m), c = am$ , 则  $a > a(-1-m) > am$ ,

即  $1 > -1 - m > m$ , 故  $-2 < m < -\frac{1}{2}$ . 又  $m < x_0 < 1$ , 所以  $x_0 - 3 < m < x_0$ . 结合选项知只有  $x_0 - \frac{1}{2}$  可能为  $f(x)$  的另一个零点. 故选 B.

(2) 因为  $f(x)$  有零点, 所以  $\Delta_1 = (-1)^2 - 8a \geq 0$ , 即  $a \leq \frac{1}{8}$ . 令  $f(x) = t$ , 则  $f[f(x)] = 0$  可化为  $2t^2 - t + a = 0$ . 当  $a = \frac{1}{8}$  时,  $2t^2 - t + \frac{1}{8} = 0$ , 即  $t = \frac{1}{4}$ , 所以  $f(x) = 2x^2 - x + \frac{1}{8} = t = \frac{1}{4}$ , 即  $2x^2 - x - \frac{1}{8} = 0$ , 则  $\Delta_2 = 1 + 1 = 2 > 0$ , 所以方程  $2x^2 - x - \frac{1}{8} = 0$  有 2 个根, 所以函数  $y = f[f(x)]$  有 2 个零点. 当  $a < \frac{1}{8}$  时,  $2t^2 - t + a = 0$  的根为  $t = \frac{1 \pm \sqrt{1-8a}}{4}$ , 函数  $f(x) = 2x^2 - x + a = 2\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{8} + a$  的最小值为  $-\frac{1}{8} + a$ ,  $\frac{1 - \sqrt{1-8a}}{4} - \left(-\frac{1}{8} + a\right) = \frac{3-8a-2\sqrt{1-8a}}{8}$ , 因为  $(3-8a)^2 - (2\sqrt{1-8a})^2 = 64\left(a - \frac{1}{8}\right)^2 + 4 > 0$ , 所以  $2t^2 - t + a = 0$  的 2 个根都大于函数  $f(x)$  的最小值, 故  $y = f[f(x)]$  有 4 个零点. 故选 C.

## 第 5 讲 函数模型及其应用

### 【题型示例】

#### 考点 1 一次、二次、“双勾”函数模型的应用

例 1 D [解析] 设销售单价在进价的基础上增加  $x$  元时, 日均销售利润为  $y$  元, 则  $y = x[480 - 40(x-1)] - 200 = x(520 - 40x) - 200$ , 由于  $x > 0$ , 且  $520 - 40x > 0$ , 所以  $0 < x < 13$ , 所以  $y = -40x^2 + 520x - 200$ ,  $0 < x < 13$ , 所以当  $x = \frac{520}{80} = 6.5$  时,  $y$  取得最大值, 所以销售单价应定为  $5 + 6.5 = 11.5$  (元). 故选 D.

#### 考点 2 指数、对数函数模型的应用

例 2 B [解析] 设  $t$  表示经过的时间(单位: h),  $a$  表示原来细菌的个数,  $y$  表示繁殖后细菌的个数, 则  $y = a \cdot 2^t$ . 当  $a = 10$ ,  $t = 7$  时,  $y = 10 \times 2^7 = 1280$ . 故选 B.

例 3 解: 由题可知函数图像过点  $(1, 8)$ ,  $(2, 18)$ ,  $(3, 30)$ .

① 设二次函数模型  $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ,

将点的坐标代入, 可得  $\begin{cases} a+b+c=8, \\ 4a+2b+c=18, \\ 9a+3b+c=30, \end{cases}$  解得  $\begin{cases} a=1, \\ b=7, \\ c=0, \end{cases}$

则  $f(x) = x^2 + 7x$ , 故  $f(4) = 4^2 + 7 \times 4 = 44$ , 与 2019 年的目标误差为 4.7.

② 设指数函数模型  $g(x) = a \cdot b^x + c (a \neq 0, b \neq 1, b > 0)$ ,

将点的坐标代入, 可得  $\begin{cases} ab+c=8, \\ ab^2+c=18, \\ ab^3+c=30, \end{cases}$  解得  $\begin{cases} a=\frac{125}{3}, \\ b=\frac{6}{5}, \\ c=-42, \end{cases}$

则  $g(x) = \frac{125}{3} \times \left(\frac{6}{5}\right)^x - 42$ , 故  $g(4) = \frac{125}{3} \times \left(\frac{6}{5}\right)^4 - 42 = 44.4$ , 与 2019 年的目标误差为 5.1.

综上可得, 二次函数模型  $y_1 = x^2 + 7x$  能更好地反映该公司年销量  $y$  (万辆) 与第  $x$  年的关系.

#### 考点 3 分段函数模型的应用

例 4 解: (1) 根据题意, 得  $y = \begin{cases} 0 (0 < x \leq 800), \\ \frac{7}{50}(x-800) (800 < x \leq 4000), \\ \frac{14}{125}x (x > 4000). \end{cases}$

(2) 因为  $20\ 000 > 4000$ , 所以  $y = \frac{14}{125} \times 20\ 000 = 2240$ , 故此人需要纳税 2240 元.

(3) 显然  $x \in (800, 4000]$ , 则有  $\frac{7}{50}(x-800) = 70$ , 解得  $x = 1300$ , 所以此人的稿费是 1300 元.

例 5 解: (1) 当甲用户的用水量不超过 4 吨, 即  $5x \leq 4$  时,  $y = (5x+3x) \times 2.1 = 16.8x$ .

当甲用户的用水量超过 4 吨, 乙用户的用水量不超过 4 吨, 即  $3x \leq 4$  且  $5x > 4$  时,

$y = 4 \times 2.1 + 3x \times 2.1 + 3 \times (5x-4) = 21.3x - 3.6$ .

当乙用户的用水量超过 4 吨, 即  $3x > 4$  时,

$y = 8 \times 2.1 + 3 \times (8x-8) = 24x - 7.2$ .

所以  $y = \begin{cases} 16.8x (0 \leq x \leq \frac{4}{5}), \\ 21.3x - 3.6 (\frac{4}{5} < x \leq \frac{4}{3}), \\ 24x - 7.2 (x > \frac{4}{3}). \end{cases}$

(2) 由 (1) 知  $y = f(x)$  在各段区间上均为增函数.

当  $x \in [0, \frac{4}{5}]$  时,  $y \leq 16.8 \times \frac{4}{5} < 40.8$ ;

当  $x \in (\frac{4}{5}, \frac{4}{3}]$  时,  $y \leq 21.3 \times \frac{4}{3} - 3.6 < 40.8$ ;

当  $x \in (\frac{4}{3}, +\infty)$  时, 令  $24x - 7.2 = 40.8$ , 得  $x = 2$ .

所以甲用户的用水量为  $5x = 10$  (吨), 应交水费  $y_1 = 4 \times 2.1 + 6 \times 3 = 26.4$  (元);

乙用户的用水量为  $3x = 6$  (吨), 应交水费  $y_2 = 4 \times 2.1 + 2 \times 3 = 14.4$  (元).

## 模块二 必修 4

### 第 1 讲 任意角的三角函数和诱导公式

#### 【题型示例】

##### 考点 1 任意角

例 1 (1) B (2) B [解析] (1) 由题知,  $A = \{\text{第一象限角}\} = \left\{ \theta \mid 2k\pi < \theta < 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z} \right\}$ ,  $C = \left\{ \text{小于 } \frac{\pi}{2} \text{ 的角} \right\} = \left\{ \theta \mid \theta < \frac{\pi}{2} \right\}$ ,

$B = \{\text{锐角}\} = \left\{ \theta \mid 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right\}$ , 结合选项可知 B 正确.

(2)  $\because -2017^\circ = -360^\circ \times 6 + 143^\circ$ , 且  $90^\circ < 143^\circ < 180^\circ$ ,  $\therefore -2017^\circ$  角的终边所在的象限为第二象限.

##### 考点 2 弧度制

例 2 (1) 1 (2)  $-\frac{5\pi}{3}$  rad  $108^\circ$  [解析] (1) 设圆心角的弧度数为  $\alpha$ , 弧长为  $l$ , 则由弧长公式知  $l = r\alpha$ , 则  $r = \frac{l}{\alpha} = \frac{2}{2} = 1$ .

(2)  $-300^\circ = -300 \times \frac{\pi}{180}$  rad  $= -\frac{5\pi}{3}$  rad.

$\because \pi$  rad  $= 180^\circ$ ,  $\therefore \frac{3\pi}{5}$  rad  $= \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$ .

##### 考点 3 任意角的三角函数

例 3 (1) C (2)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$   $\frac{1}{2}$  [解析] (1) 由  $\sin \alpha < 0$ , 得角  $\alpha$  的终边在第三、第四象限或  $y$  轴的负半轴上; 由  $\tan \alpha > 0$ , 得角  $\alpha$  的终边在第一或第三象限. 所以角  $\alpha$  的终边在第三象限.

(2) 由任意角的三角函数定义可得  $\sin \alpha = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}} =$